

হোমিওপ্যাথি-প্রচার]

[তৃতীয় সংখ্যা।

হোমিওপ্যাথিমতে
জ্বর-চিকিৎসা।

বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

তিনভাগ-একত্র

নূতন সংস্করণ।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

ঢাকা।

মহেশ্বর-যন্ত্রে শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী

কর্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১

১০ই ভাদ্র।

All Rights Reserved.

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তীকৃত

হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ।

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা ।

পঞ্চম সংস্করণ ।

ইহাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া, অধিকার, আয়মিক প্রমোদ, লক্ষণাদি সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়; ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহৃতত্ব; এবং সকল রোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, কারণ ও চিকিৎসাদি সন্নিবিষ্ট আছে। সংক্ষেপতঃ একখানি পুস্তক অবলম্বনে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ও চিকিৎসার জ্ঞানই এই পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা গৃহস্থ, ছাত্র, ও চিকিৎসক সকলের পক্ষেই উপযোগী। আকার বয়েল আটপেজি ১০৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৥০ টাকা, ডাকমাণ্ডলাদি ৮০ আনা। পুস্তকের প্রাপ্তিতে সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

—*—

ওলাউঠার চিকিৎসা ।

ডিমাই ১২ পেজি ১৩২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০ আনা, ডাক মাণ্ডল ২০০ আনা। এই পুস্তকে ওলাউঠার নিদানাদি ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। ভৈষজ্যতত্ত্বের প্রথমে সমালোচনা দ্রষ্টব্য। ২০১. কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

—*—

প্রায়ই আশ্রয়নিষ্ঠ এবং অনেক সময় উপচয়, উপশয়, পর্যায ও দেশকলাদিব সহিত সংশ্লিষ্ট। বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত ঔষধেব বিশেষত্ব নিরূপিত হয় না, এবং ঔষধেব বিশেষত্ব নিরূপণ ব্যতীত প্রকৃত ঔষধ নির্বাচন করা যায় না। বিশেষ লক্ষণগুলি প্রায়ই অগ্র লক্ষণেব আলম্বয়ঙ্গিক। সুতরাং মূল লক্ষণ পবিত্রতাগ কবিবা কেবল আলম্বয়ঙ্গিক বিশেষ লক্ষণেব বলে ঔষধ ব্যাখ্যা কবা বিহিত নহে। ঔষধেব সাধাবণ ও বিশেষ উভয় প্রকাব লক্ষণেব সমষ্টি বোগীব লক্ষণেব সহিত একা কবিমাই ঔষধ ব্যবস্থা কবা উচিত। কিন্তু কোন কোন বোগে ও কোন কোন ঔষধে এই প্রকাব সম্যক সাদৃশ্য নিরূপণ করা সম্ভবপব নহে। সে সকল তলে কেবল বিশেষ লক্ষণ দেখিমাই ঔষধ নির্বাচন কবা কর্তব্য। বোগেব বিশেষ লক্ষণে ও ঔষধেব বিশেষ লক্ষণে ঠিক সাদৃশ্য থাকিলেও বোগ আবোগ্য হয়। একান্ত বিশেষ লক্ষণগুলি বড়ই প্রয়োজনীয়।

৪। ব্যাদি একাক্ষীণ বোগ নহে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ বোগ। প্রত্যেক ব্যক্তিৰ শারীরিক ক্রিয়ায় ও বিবানে এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একাক্ষীণ পীড়িত হইলে অন্তর্জগৎ পীড়িত হব। অতএব বোগীব প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণগুলিব প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত ঔষধ নির্বাচন কবিত্তে পাবিলে একাক্ষীণ লক্ষণে ঔষধ ব্যবস্থা কবিত্তেও সর্বাঙ্গীণ লক্ষণ দূরীকৃত হয়।

৫। সমষ্টিগত লক্ষণবাণি বোগেব বাহ্যপ্রতিবিম্ব, অভ্যন্তরগত শারীরিক পরিবর্তন বোগেব প্রকৃত মূর্তি। এই উভয়েব সম্বন্ধ, বোগেব নিদান, রূপ, সম্প্রাপ্তি (পাথলজি), গতি ও বিশেষ পদ্ধতি এবং ভিন্ন ভিন্ন বোগীব বাহ্য, জীবনমুখি ও কুনদোষ প্রভৃতি প্রণিবান পূর্ণত ঔষধ নির্বাচন ও প্রয়োগ কবা কর্তব্য। বোগীব লক্ষণ সকলেব সমষ্টি একবোণ মনে কবিয়া ঠিক তাহার সদৃশ ঔষধ নিরূপণ কবিয়া দাওয়া উচিত। লক্ষণ সমষ্টি পৃথক পৃথক পুঞ্জ বিভক্ত কবিয়া প্রত্যেক লক্ষণ পুঞ্জেব ঔষধ স্থাপন কবা বিহিত নহে। কোন ঔষধেব লক্ষণে যখন বোগীব প্রত্যেক লক্ষণেব যুগল প্রাপ্ত হইবদয় আশা করা যায় না, তখন বিশেষ বিশেষ বোগীব প্রকৃতিগত বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ ও বিশেষণ (ম্যানালিসিস) কবিয়া তাহাব সম ঔষধ নির্বাচন কবা প্রেষণ। লক্ষণ বিশেষণেই চিকিৎসকেব নৈপুণ্য প্রকাশ পায় এবং

ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে বোগারোগ্যেও অকৃতকার্য্য হইতে হয়। (বিশেষণ-প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্থানান্তরে দেওয়া হইল)।

৬। প্রকৃত সদৃশ ঔষধ প্রয়োজিত হইলে বোগের নিয়মিত বৃদ্ধির সময় রোগ বিবর্তিত হয় না। অতএব কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগের পরেও রোগের উপচয় (এগ্রাভেশন) উপস্থিত হইলে অথবা একেবারেই উপচয় উপস্থিত না হইয়া বোগ ক্রমে ক্রমে কঠিনতর হইয়া উঠিলে ঠিক সদৃশ ঔষধ যে নির্বাচিত ও প্রয়োজিত হয় নাই ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ঔষধ প্রয়োগে যেমন বোগের লক্ষণেব তীব্রতাব হ্রাস হয়, সেইরূপ সময়ে সময়ে উহা বৃদ্ধিও পাইতে পাবে। এপ্রকার ঘটিলে এবং সম্প্রাপ্তি-গত কোন বৈলক্ষণ্য না জন্মিয়া থাকিলে ঔষধ পরিবর্তন না করিয়া পূর্ববৎ চিকিৎসা করা কর্তব্য। বোগীক কতকগুলি লক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ও কতকগুলি পূর্ববৎ তীব্রাভাবে অবশিষ্ট থাকিলে যে ঔষধে এই প্রকার পরিবর্তন জন্মে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু চিকিৎসাকালে কখন কখন এরূপ নূতন ও স্বতন্ত্র লক্ষণরাশি প্রকাশিত হওয়া পড়ে যে পূর্বের লক্ষণ সকলের সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না, এরূপ অবস্থায় ঔষধ পরিবর্তন করা আবশ্যিক।

৭। সাধাবশতঃ তৎকাল রোগে ঔষধেব নিয়ন্ত্রণ ও পুৰাতন বোগে উচ্চ-ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বোগীক ধাতু, প্রকৃতি ও ঔষধ-গ্রাহিতা-শক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন মাত্রা ও ক্রম সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভবপর নহে। পুৰাতন বোগে নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা উচ্চক্রম অধিকতর ফলপ্রদ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারে পুৰাতন বোগে অনেক সময় বোগের লক্ষণ বিবর্তিত হয়।

৮। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পুনঃপ্রয়োগেব সাধারণ নিয়ম এই যে প্রয়োজিত ঔষধে নিশ্চিত উপকার দাশলে ঔষধ প্রয়োগে বিরত থাকিয়া শরীরের স্বাভাবিক আবেগা-শক্তিব কায়া হইতে দেওয়া উচিত। অনন্তর কৃত উপকার স্থগিত হইলে তৎকালীয় লক্ষণস্বরূপ সেই ঔষধ বা অত্র ঔষধ পুনরায় ব্যবহার করা কর্তব্য। (মংকৃত ভৈষজ্যতত্ত্বে মাত্রা ও ক্রম বিচার দ্রষ্টব্য)।

৯। এলোপ্যাথি, কবিবাজী বা অত্র কোন মতে চিকিৎসিত কোন বোগীকে হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসা কবিত্তে হইলে পূর্ব ঔষধেব ক্রিয়া

নষ্ট করিবার নিমিত্ত চিকিৎসাব প্রারম্ভে এক দুই মাত্রা ক্যাফা, নল্লভমিকা বা সলফাব ব্যবহৃত হয়। একপ অবস্থায় অনেক সময় তরুণ বোলে নল্লভমিকা ও পুরাতন বোলে সলফাব সমধিক উপযোগী।

১০। রক্তস্ফাবস্থা ও গর্ভাবস্থায়ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহাব করা যায়।


১১। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেৱন কালে অল্প কোন প্রকাব ঔষধাদি, ঔষধ-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য, ও কপূর্ব সেৱন করা নিষিদ্ধ। ঔষধ সেৱনের অন্তান এক ঘটিকা পূর্বে বা পরে পান, তামাক ও জল খাওয়া কর্তব্য নহে।

১২। চিকিৎসক বোগ-পৰীক্ষাকালে রিপাৰ্টিব পৰিচ্ছেদানুক্রম রোগীর আত্মপূৰ্ণিক সমগ্র ইতিবৃত্ত জানিয়া বা লিখিয়া লইবেন, অর্থাৎ (১) জীবন নিদান বা গৌণ ও মুখ্য কারণ; (২) গাত্র-তাপ; (৩) নাড়ীর অবস্থা; (৪) জরের অবস্থা, (ক) পূৰ্ণ লক্ষণ, (খ) শীতের আরম্ভ-স্থান, (গ) শীতের অবস্থান, (ঘ) শীতাবস্থায় প্রকাশিত সবিস্তার লক্ষণ; (ঙ) শীতের ভ্রাস-বৃদ্ধি; (চ) শীতের ছায় উত্তাপের সবিশেষ, অবস্থা ৫ উত্তাপাবস্থায় প্রকাশিত লক্ষণাদি; (ছ) ঘর্মাবস্থার বিবরণ, অর্থাৎ ঘর্ম শীতল কি উষ্ণ, অধিক কি অল্প, শরীরের কোন স্থানে প্রকাশিত প্রভৃতি লক্ষণ, (জ) জরের অবস্থাত্তরেব কোন অবস্থাব সমধিক প্রাবল্য বা একেবারে অভাব; (ঝ) বিরামকালীন লক্ষণ; (ঞ) বোগীর মানসিক লক্ষণ; (এ) রোগীর ধাতু; (৬) বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ অল্প কোন বোগীতে সচবাচব প্রকাশিত হয় না এমন কোন লক্ষণ, (৭) জ্বের প্রকৃতি, (৮) জ্বের উপস্থিতির সময়; ইত্যাদি বিবরণ গুলি লিখিয়া লইয়া বোগীর লক্ষণ বিশ্লেষণ পূৰ্ণক প্রকৃত ঔষধ নির্ধাচন করিবেন। (বিশ্লেষণ-প্রাক্রয়া দৃষ্টব্য)।

১৩। সবিবান জ্বের চিকিৎসায় শীতের আবস্থ স্থান ও জ্বের সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য পাখা কর্তব্য। কোন কোন প্রধান চিকিৎসক শীতের আবস্থস্থান ঔষধ নির্ধাচন অতিশয় পাবাধনীয় মান করেন।

উপক্রমণিকা ।

গাত্রতাপ ।—তাপমান যন্ত্রদ্বারা শরীরের তাপের পরিমাণ সহজে নিকপিত হইয়া থাকে । চিকিৎসায় তাপমান যন্ত্রের নিত্যসুই আবশ্যক । একটি সেলফ রেজিষ্টারিং ক্লিনিক্যাল থার্মোমেটার রাখাই ভাল । তাপমান একটি পারদ পূর্ণ কাচের নল । ঐ নলের গায়ে কতকগুলি বেধা ও সংখ্যা আছে । উহার আকৃতি এইরূপ :—



ইহার এক একটা বড় রেখা এক ডিগ্রী (অংশ) এবং ছোট বড় বেধার মধ্যে যে ক্ষুদ্র রেখা আছে উহার এক একটি এক ডিগ্রীর পঞ্চমাংশ জ্ঞাপক । ৯৮.৪ ডিগ্রীতে যে ক্ষুদ্র বানচিক আছে উহাকে ইণ্ডেক্স বা নির্দেশক চিহ্ন বলে । উহা শরীরের স্বাভাবিক তাপ জ্ঞাপক । তাপমানের ইনডেক্সস্থিত পারদ (ক) পর্য্যন্ত উখিত হইলে শরীর-তাপ ১০০°৪, (খ) পর্য্যন্ত উখিত হইলে ১০৩°৮, এবং (গ) পর্য্যন্ত উখিত হইলে ১১০ ডিগ্রী হয় । ক, খ, গ, অক্ষর গুলি তাপমানে নাই । কেবল সুবিধার্থে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে । শরীরের তাপ গ্রহণ করিবার পূর্বে ইনডেক্স হইতে পারদ নাগাইয়া ৯৮.

ডিগ্রীতে আনিতে হয়। দক্ষিণ হস্তে তাপমানমাত্র ধারণ করিয়া আস্তে আস্তে বাম হস্ত-তলে আঘাত করিলেই পারদ নামিয়া আইসে। অমন্তব্য তাপমানেব কন্দদেশ বা পারদকুণ্ড বোগীর কক্ষতলে স্থাপন করিয়া ৫—১০ মিনিট রাখিতে হয়, পরে বাহির করিয়া দেখা যায় পারদ কত ডিগ্রী উঠিয়াছে। যত উঠে বা নামে শরীরেব তাপ তত ডিগ্রী। তাপমান যত্ন রোগীর গাত্রে সংলগ্ন করিবার পবে উহা ধৌত করিয়া বাখা উচিত।

অস্থাবস্থার যথেষ্ট শরীরেব তাপ গড়ে ৯৮.৪ ; মুখগহ্বরেব তাপ ৯৯.৫ ; রক্তের তাপ ১০০ অংশ। শরীরেব তাপ ৯৯.৫ অংশেব উল্কে উঠিলে অথবা ৯৭.৩ অংশেব নিম্নে নামিলে কোন প্রকাব বোগ আছে বলিয়া বুঝা যায়। পারদ নিম্নে নামিলে দ্রুত অবসন্নকব রোগ, অথবা দীর্ঘকালব্যাপী বোগজনিত জীবনীশক্তিব ক্ষীণতা ; এবং উল্কে উঠিলে অব ক্রিয়া তৎসংস্থত অন্ত কোন ব্যাধিব বিদ্যমানতা বুঝায়। ১০০ হইতে ১০১ সামান্ত জ্বর ; ১০৩২ অসুংকট জ্বর ; ১০৫ উৎকট জ্বর ; ১০৬—১০৭ সঙ্কটস্থচক বা সাংঘাতিক জ্বর জ্ঞাপক। প্রতিদিন এক সময়ে বোগীর গাত্রতাপ পরীক্ষা করা কর্তব্য। পূর্ক্বে ও অপরাহ্ন ৮ ঘটিকা তাপ পরীক্ষাব প্রশস্ত সময়। উৎকট বোগে প্রতিদিন ৪:৫ বার গাত্র-তাপ পরীক্ষা করা কর্তব্য।

গাত্রতাপ আড়াই ডিগ্রী অধিক হওয়া অপেক্ষা এক ডিগ্রী কম হওয়া অধিক আশঙ্কার কাবণ। মস্তিষ্কেব আবরণ-ঝিল্লীবি প্রদাহ, ও ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি বোগে গাত্রতাপ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। গাত্রতাপ ১০৮-৫ হইলে বোগীর নিশ্চয় মৃত্যু হয়। ১০৯ বা ১১০ ডিগ্রী আসন্ন মৃত্যু-জ্ঞাপক। পক্ষান্তরে অবিবাম জ্বর, সবিবাম জ্বর, অন্তবিধ জ্বর, পতনাবস্থা, ও ক্ষয়কর পুরাতন বোগে স্বাভাবিক শাবীবিদ উত্তাপের অধিক পরিমাণে ক্রমাগত হ্রাসও মৃত্যুব আসন্নতা ব্যঞ্জক।

বালকের শরীরেব উত্তাপ যুবকেব শরীরেব উত্তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কখন কখন পাকশয়ের পীড়া বশতঃ বালকের গাত্রতাপ দীর্ঘ ক্ষীণ বর্দ্ধিত হয়। অতএব কেবল তাপাংশ দৃষ্টে বালকদিগের উৎকট বোগ হইয়াছে সহসা এক্ষণ মনে করা বিহিত নহে।

• “টাইফয়েড জবে দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণ তাপাংশ ১০২ বা ১০৩ হইলে

সামান্য অব. এবং ১০৫ বা তদুর্দ্ধ হইলে উৎকট অবস্থা যায়। দ্বিতীয় সম্ভাষে সন্ধ্যাকালে গাত্রতাপ কমিয়া যাইতে থাকিলে উহা টাইফয়েড অবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সন্নিপাত ও অন্ত্রান্ত্র জ্বরে রক্তপ্রাবাদি উপসর্গ উপস্থিত হইবার পূর্বে গাত্রতাপ বৃদ্ধি পায়। কম্পজ্বরে জ্বর প্রকাশিত হইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্বে হইতেই গাত্রতাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উদ্ভাপেব অতিশয় আধিক্যে রোগের গাঢ়মূলতা বুঝায়। হামজ্বরে পীড়কা বিনির্গত হইবার পরেও পুনরায় গাত্রতাপের বৃদ্ধি ফুসফুসের প্রদাহাদি উৎকট উপসর্গ সূচক। আমবাতে তাপাংশ ১০৪ হৃদেষ্ট প্রদাহ, এবং হৃদিকাজ্বরে ১০৫ পেলভিক সেলুলাইটিস উপস্থিতির সন্দেহ সূচক। ফুসফুস-প্রদাহে ১০৪ ভয়ব্যঞ্জক। বোগের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় গাত্রতাপের বৃদ্ধি পুনরাক্রমণ জ্ঞাপক। গাত্রতাপের আধিক্য প্রদাহের আত্মবঙ্গিক। অতএব প্রদাহের লাঘবের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রতাপেরও লাঘব হয়। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ বৃদ্ধি না পাইবা হ্রাস পড়িলে স্নলক্ষণ মনে করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গাত্র-তাপ বাড়িলে, আত্মা স্নলক্ষণ থাকিলেও কোন উপসর্গ উপস্থিত হইতেছে বা পুণ্য জন্মিতেছে বুঝা যায়।”

নাড়ী, শ্বাস ও গাত্র তাপের সম্বন্ধ।—শরীরের উত্তাপ এক অংশ বর্দ্ধিত হইলে প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বাব ও শ্বাসের গতি ২।৩ বার বর্দ্ধিত হয়, যথা,—স্বভাবতঃ গাত্রতাপ ৯৮°৪ অংশ, এবং প্রতি-মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ৭৫ ও শ্বাসের গতি ১৮ বার থাকিয়া যদি শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া ১০০ ডিগ্রী হয় তবে নাড়ীর স্পন্দন ৯০।৯৫ এবং শ্বাসের গতি প্রায় ২৩ হইবে। সামান্যতঃ স্নহাবস্থায় এক একবার শ্বাসে ৪ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

নাড়ী।—শরীরের যে সকল শ্রোত (নালী) দ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে সর্বশরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে ধমনী বা নাড়ী কহে। সাধারণতঃ মণিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন অল্পভূত হইয়া থাকে। গ্রীবা ও জাহ্নদেশেও নাড়ীর বেগ অল্পভব করা যাইতে পারে। স্নহাবস্থায় সাধারণতঃ প্রতি-মিনিটে বয়ঃক্রমানুসারে যেরূপ নাড়ীর স্পন্দন হয় নিম্নে তাহার সংখ্যা উল্লিখিত হইল :—

জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত	প্রতিমিনিটে	১৪০ বার
দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত	"	১২০ বার
চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত	"	১০০ বার
সপ্তম হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত	"	৯০ বার
অষ্টাদশ হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত	"	৭৫ বার
বৃদ্ধ বয়সে	"	৭০ বার

কোন কোন ব্যক্তির নাড়ী স্ভাব্যতঃই মৃদু বা দ্রুত থাকে। তাহা দেখিয়া রোগ মনে করা উচিত নহে। স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা ৮।১০ বার নূন স্পন্দন হইলে জীবনী-শক্তি হ্রাস পড়িয়াছে অনুমান করা কর্তব্য।

বিচক্ষণ চিকিৎসক অঙ্গুলী দ্বাৰাই নাড়ীর গতি নিকূর্ণ করিতে পারেন। কুল, কোমল ও দ্রুত নাড়ী অব্যবহাৰে পূৰ্ণাবস্থা জ্ঞাপক। দ্রুত, কঠিন ও পূৰ্ণ নাড়ী প্রদাহশূচক। আহাৰান্তে বা শয়নাকালে নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি বিলোপী জরবে লক্ষণ। নাড়ীর বিষম গতি, পর্য্যায়শীলতা ও উৎক্ষেপণ ছদ্মোগেব পৰিচায়ক। ক্ষীণ স্ত্রীৰূপে নাড়ী, দ্রুত অবসাদকর রোগ অর্থাৎ বিষচিকা ও রক্তস্রাবাদি হইতে উৎপন্ন হয়।

হৃৎপিণ্ডের আকৃষ্ণনের নানাদিক্য অনুসারে নাড়ীর মন্দ বা দ্রুতগতি জন্মে। নাড়ীর দ্রুতগতি দ্বাৰা স্নায়বীয় বোগ এবং দুৰ্জলতা সহকারে উত্তেজনা বুঝা যায়। এক আকৃষ্ণন হইতে অল্প আকৃষ্ণনের মধ্যবর্তী সময় প্রতিনিয়ত সমান হইলে নাড়ীর সমগতি এবং মধ্যে মধ্যে দ্রুত ও মধ্যে মধ্যে মন্দ হইলে বিষমগতি বলে। সময়ে সময়ে নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত হইলে উহাকে ক্ষণ-বিলুপ্ত বা পর্য্যায়শীল নাড়ী কহে। নাড়ীর সমগতি স্বলক্ষণ। রক্ত-সঞ্চলন, নিশ্বাস ও স্নায়ুশক্তির ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য। নাড়ীর বিষমগতি জন্মিবার কাৰণ। সাধাবণতঃ হৃৎপিণ্ড বা হৃৎসূত্রে রক্তসঞ্চলনের ব্যাঘাত বশতঃ নাড়ী পর্য্যায়শীল হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাব পৰিমাণানুসারে নাড়ীর স্থলত্ব বা হৃদয় জন্মে। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতাব হ্রাস হইলে নাড়ী কোমল ও দুৰ্জল হয়।

শ্বাস।—সাধাবণতঃ প্রতিমিনিটে ১৬ বার নিশ্বাস গ্রহীত ও ১৫ বার প্রশ্বাস পৰিত্যক্ত হইয়া থাকে। শবীরেব বক্তব্য ভাগ কম হইলে শ্বাস শীঘ্র

হয়। শীতল শ্বাস মূত্ৰাব লক্ষণ। ফুসকুসেব বোগে শ্বাসেব বুদ্ধি এবং দুৰ্ব্বলতা হইলে উহার ন্যূনতা জন্মে। শিশুর শ্বাসের সংখ্যা স্বভাবতঃ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

পিপাসা।—অব ও প্রদাহে মুখগহ্বরে বক্তাবিকা বশতঃ মুখ-শোষ জন্মে। শরীরে বক্তেব স্বল্পতা অথবা রক্তেব জলীয়াংশেব স্বল্পতা হইলেই পিপাসাব উৎপত্তি হয়।

ক্ষুধা।—পুষ্টিতন পীড়ায় ও বোগেব পৰিণামাবস্থায় ক্ষুধামান্দ্য স্ফলক্ষণ নহে। পাকাশয়্যেব উত্তেজনা, ক্রামদোষ বা মধ্যান্ত্রগতিব পীড়ায় অতি ক্ষুধা জন্মে।

মুখাকৃতি।—“মুখমণ্ডল সমস্ত শরীরেব দপণ স্বরূপ।” বোগে প্রশান্ত ও প্রসন্ন বদন শুভ লক্ষণ। কিন্তু অদ্রোণে অনেক বস্ত্রণাব পৰ বোগীব প্রশান্ত ও প্রসন্ন মুখাকৃতি স্ফলক্ষণ নহে। মুখাকৃতিব চিত্তাকুলতা তৰণবোগেব প্রাবৃত্ত্যশ্বাসকাস, যান্ত্রিক-প্রদাহ ও জননেন্দ্রিয়েব বোগেব পরিচায়ক। আতঙ্ক-চিহ্ন জ্বালাতক্ষ, শ্বেদিতস্রাব, উন্মত্ততা ও দুৰ্ব্বটনা, নিষ্পন্দভাব দুৰ্ব্বলতা, সংক্ৰান্ত-শূন্যতা ও মুচ্ছাবানু; সন্ধিকৃত পানাতাস, কোপনভাব উন্মত্ততা, জ্বালাতক্ষ, ও মস্তিষ্ক-প্রদাহ; সলজ্জতা ও অবশীৰ্ষতা কৃত্রিম মৈথুন ও ধ্বজভঙ্গ, নবনে অনিচ্ছা ও উৎসাহশূন্যতা, মূৰ্খমণ্ডলেব মলিনতা বা আবল্লাবণ, ওষ্ঠাদেব ও দন্তে কৃষ্ণবর্ণ মলসঞ্চয় অব, মুখমণ্ডলেব অস্বাভাবিক পৰিপূর্ণতা ও বক্তাবিকা সংপিণ্ডেব বিবুদ্ধি, স্ববাসক্ততা, সন্ন্যাস বোগ ও টাইফয়েড অব; এবং “নাসাগ্রেব স্ফুটতা, নথনের নিমগ্নতা, শয্যা বা ললাট-প্রান্তেব অবনতি, ললাট-স্থকেব কুঞ্চিততা ও বিস্তৃকতা, কণ্ঠেব শীত-স্পর্শ ও সঙ্কুচিততা, কণ-স্ফিক্তাব উৎপত্তিতা, মুখমণ্ডলেব হবিং, কৃষ্ণ, নীল বা সাদ্যং, শ’ মূত্ৰাব আশ্রয়তা জ্ঞাপক।

চক্ষু।—চক্ষেব রক্তবর্ণ স্থানিক প্রদাহ, অথবা মাস্তিক ও মাস্তিক-কোষেব রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ জ্ঞাপক। কুঞ্চিত কনানিকা মস্তিষ্কেব উত্তেজনা বশতঃ, জন্মে, এবং অপস্মার, মস্তিষ্ক-প্রদাহ, সংক্ৰান্ত, মস্তিষ্কোদ্যক প্রভৃতি বোগে বিদ্যমান থাকে। প্রসারিত কনানিকা চক্ষে আগোক প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা, মস্তিষ্কেব জলসঞ্চয় বা প্রচাপন, সংক্ৰান্ত রোগ, মস্তিষ্কোদ্যকেব শেষাবস্থা, এবং আমাশয় বা অস্ত্রের উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক-বোগের প্রথমাব-

হায় কুক্ষিত কনীনিকা শীঘ্র প্রসাবিত হইয়া পড়িলে মস্তিষ্কে মল-ক্ষয় বা অত্রাবিধ পরিবর্তন বুঝা যায়। আলোকাতক মস্তিষ্কের প্রদাহ ও উত্তেজনার এবং চক্ষুর বিধান-তত্ত্ব প্রদাহের লক্ষণ। মস্তিষ্ক ও দর্শন-স্বায়ুর বোগের প্রাকালে ক্ষীণ দৃষ্টি, যুগল-দৃষ্টি, অন্ধদৃষ্টি ও মন্দিদৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে। তির্ধ্যাকদৃষ্টি সংশ্রায় বা মস্তিষ্ক-রোগের লক্ষণ।

জিহ্বা।—(১) জিহ্বার শুষ্কতা তখন অব, (২) অত্যন্ত আরক্ততা ফোটজব, (৩) প্রান্ত ও অগ্রভাগেব আরক্ততা পিত্তজব, (৪) বিদ্যাবিত জিহ্বা সমিপাতজব, (৫) লেপাবৃত জিহ্বা মর্দপ্রকাব অব, (৬) লঙ্কামরিচের গুড়িকা বিক্ষিপ্তবং জিহ্বা আবক্তজব; (৭) মধ্যভাগ লেপাবৃত ও প্রান্তদেশে আবক্ত জিহ্বা বিলেপী অব জাপক, (৮) প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ জিহ্বা পবিষ্কার হইতে থাকিলে আবোপ্যোগুথ্যাব সূচনা ও জিহ্বা উত্তরোত্তর অধিকতর কপিষবর্ণ, মলিন ও শুষ্ক হইতে থাকিলে বিপদেব আশঙ্কা কমে; (৯) গাণ্ড, শুভ্র, লোহিত, প্রসাবিত ও প্রকাম্পিত জিহ্বা দুর্বলতা ও-রক্তের জলীয়তা, (১০) উজ্জ্বল আরক্ততা শব্দেব বক্তপ্রবানতা; (১১) জিহ্বার কাল এবং বেত্তণ বং ফুসফুসে বক্তসঞ্চননেব প্রতিবন্ধকতা জাপক। (১২) জিহ্বাব প্রান্তে আবক্ততা ও মধ্যভাগে বিশেষতঃ মূলদেশে লেপ অগ্নিমান্দা; (১৩) জিহ্বাব তবিদ্রাবর্ণ পাণ্ডুরোগ সূচক। (১৪) জিহ্বাসঞ্চলনে অসম-র্থতা, অথবা বাহির করিলে একপার্শ্বে বক্ত হইয়া পড়া অব ও অত্যাগ তখন বোগে কুলক্ষণ, পক্ষাদাতেও জিহ্বাব এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ঘর্ম্ম।—প্রাতঃকাল প্রব স্পন্দ, কক্ষ, দাহযুক্ত ও উত্তপ্ত থাকিলে অব বুঝা যায়। এই অবস্থাব পবে ঘর্ম্ম সুলক্ষণ বটে। পিষমজব ও প্রাদাহিক অবাদির পবে ঘর্ম্মপ্রাব হইলে অনেকটা উপশম বোধ হয়। কিন্তু ঘর্ম্ম হইলেও যদি অবের অত্যাগ লক্ষণ হাস না পড়ে তবে অল্প কোন উপশম আছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে। সামান্য শ্রমে ঘর্ম্ম হইলে দুর্বলতা এবং শীত ও অবের পরে রাত্রিতে অধিক ঘর্ম্ম হইলে বিলেপী অব বুঝা যায়।

কম্প।—বিষমজব, স্পতিকাজব, ও অত্যাগ-তীর অবের প্রথম অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রবল গাত্রকম্প হয়।

বমন ।—আমাশয়ের উপদাহ এবং মস্তিস্ক, হৃৎপিণ্ড, কুসকুস ও জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য বশতঃ বমন হয় ।

হিকা ।—বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক-পেশীর কণ্ঠ্যগামী আকৃঞ্চন বশতঃ হিকা জন্মে । কৃসি, আমাশয় বা যকৃতের প্রদাহ, জরায়ুর উপদাহ প্রভৃতি নানা কারণে হিকা হয় ।

বেদনা ।—প্রদাহেব বেদনা চাপিলে ও পেশীব বেদনা সঞ্চালনে বদ্ধিত হয় । শ্বাসশুলের বেদনায়, চাপনে ও সঞ্চালনে কোন পরিবর্তন ঘটে না । যকৃতে প্রদাহ হইলে দক্ষিণ স্বক্কে এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে বেদনা অনুভূত হয় ।

মল ।—পাণ্ডু বা কৰ্দমবর্ণ মলে পিত্তের অভাব; কৃষ্ণবর্ণ মলে পিত্তাধিক্য, সবুজবর্ণ মলে পাকস্থলীর অন্নদ্ব, এবং মলে আমরক্ত অস্ত্রের প্রদাহ সূচক । তুলাশূন্য মলে ওলাউঠা, আমময় মলে অস্ত্রের শ্লেষ্মিক কিলীর উপদাহ ও কঠিন শুষ্ক মলে উহার শুষ্কতা বা শিথিলতা বুঝা যায় ।

মূত্র ।—স্বস্থকায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টায় প্রায় এক সেব হইতে এক সের দশ ছটাক পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হয় । (১) লোহিত ও স্বচ্ছমূত্র প্রদাহ; (২) প্রচুব পাবিমাণ পবিকাব মূত্র, শ্বাসবীৰ্য বোগ; (৩) মূত্রের দুগ্ধবৎ স্বেতবর্ণ, কৃমি; (৪) ধূস্রবর্ণ, বক্তের বিদ্যমানতা; (৫) গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ, পিত্তের অবস্থিতি, (৬) লোহিতবর্ণ, অন্নহ, (৭) আবিলতা, শ্লেষ্মা বা পুয়ের বর্তমানতা, (৮) মলিন কপিশ বা মূত্রের স্বেত কৃষ্ণবর্ণ বক্তের বিগলিত অবস্থা, (৯) মূত্রের ফোঁস অদৃশ্যতার অভাব, অণ্ডলাল, (১০) মূত্রে অধঃপতিত পদার্থ সাধারণতঃ যকৃদ্ভোগ; এবং (১১) মূত্রে রক্ত, বৃক্কের প্রদাহ, বৃক্ক হইতে মূত্রাশয়ে অশ্মির গতি, ঝীকচাব ও সন্নিপাত অগাদি জ্ঞাপক । (১২) মূত্রে শর্করা মধুমেহ; শুক্র, শুক্রমেহ, অণ্ডলাল, বৃক্কপ্রদাহ বা ট্রাইটস ডিজিজ; শ্লেষ্মা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ; ও প্রস্তরবেগু, অশ্মি বুঝায় । মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১" হইতে ১০২৫ ।

প্রতিহারক ।—এই পুস্তকে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে যদি তাহার অতিমাত্রা বশতঃ কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ উপস্থিত হয় তবে ছই বিম্ব কৰ্পুরের উগ্র অরিষ্ট অথবা কাকির উগ্রফান্ট পান করিলেই তাহা নিবারিত

হইবে। কিন্তু কর্পূর সেবনে হাইড্রাষ্টিস ও সিমিসিফুগার ক্রিয়া বিবর্তিত হইয়া থাকে। লক্ষণালুসাবে বিষম-গুণ ঔষধ গুলিও ব্যবহৃত হয়।

পথ্য।—অধিকাংশ তরুণ রোগেই অদ্রব পথ্য ব্যবস্থেয় নহে। বিণ্ডুক জল, এবোক্রট ও সাস্তব মণ্ড, যবেব মণ্ড, লাজমণ্ড, আজুব, বেদনা, কমলা-লেবু ও ইক্ষুবস এবং মাংসেব কাথ ইত্যাদি পথ্য প্রদান করা উচিত। পুরাতন বোগে নিম্নমিত ও অভাষ আহাব পবিসৰ্ত্তন কবাব বিশেষ আবশ্যক কবে না। তবে বোগীব যাহা সজ্জ হয় না অথবা যাহাতে তাহাব শাবীরিক ক্রিয়াব বৈলক্ষণ্য জন্মে এ প্রকার কোন কোন দ্রব্য বৰ্জন কবা বিহিত।

জ্বরের লক্ষণ-বিশ্লেষণ।

প্রথমতঃ চিকিৎসক রোগীব লক্ষণগুলি লিখিয়া লইবেন; তৎপরে এই বিপাটরি লেখা নিম্নোক্ত প্রণালীতে সেই সকল লক্ষণেব ঔষধ নির্দ্ধাবণ করিবেন এবং যে ঔষধেব সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ দেখিবেন তাহাই নির্দ্ধাচন ও ব্যবস্থা কবিবেন। ব্যবস্থাকালে পুত্ৰকেব শেষভাগে ব্যবস্থেয় ঔষধেব বিববণ ও লক্ষণ ভাল কবিয়া পড়িয়া লইবেন। দৃষ্টান্ত যথা :—

জ্বরের প্রকৃতি।

দ্ব্যাহিক,—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শীতের পূর্বে,—

অঙ্গে বেদনা,—কার্কোভে, * ইউপ-পার্কো, * নম্ব, আট-মিউ, বস।

জ্বন্তু,—এট-টাট, আর্গ, * আর্স, 'ইলাট, * ইউপ-পার্কো, ইগ্নে, ইপিকাক, নিক, * আট-মিউ, নম্ব, বস।

শীত।

সময়, পূর্বাহ্ন ১১টা :—* ক্যাক্ট, কার্কোভেজি, ক্যাম, চিন-সল, হাইওস, ইপিকাক, লোব, * * আট-মিউ, * * নকস্, ওপি, পলিপ, পলস, * সিপি, সিলি. সগফ।

কম্পকর :—একন, এগাব, এম কা, এনাক, এণ্ট-ক্রড, * এণ্ট-টার্ট, আস', বেল, বার্ক, * ব্রাই, ক্যাক, * ক্যাম্ফ, ক্যাহ, ক্যাপ্স, কষ্ট, * চেলিড, * * চিন, চিন-সল, কক, কুপ, ডলক, * ইলাপ্স, * ইউপ-পার্পু, জেলস, গ্রাক, * হিপ, * * ইগ্নে, ইপি, * কালী-আইওড, ক্রিয়োস, * লরো, লোব, লাইকো, ম্যান্স, মেনি, মার্ক, * * মিউব-এসি, * * টাট-মিউ, * * নকস্, * ওপি, * পেট্রো, * ফস, * কস-এসি, * পডো, পলস, * বস, সাবড, স্নাষু, * সিকেল, * সিপি, * * সিলি * ষ্ট্রাক, ব্রাম, সলফ, * * থুজা, তিরিট।

অগ্রগামী :—* আস', * ব্রাই, চিন, চিন-সল, ইগ্নে, টাট-মিউ, * নকস্।

অঙ্গ-বেদনা :—একন, আস', বেল, ব্রাই, ডলক, ইলাট, * ইউপ-পার্কো, ইউপ পার্পু, গ্রাক, হেল, ল্যাক, লাইকো, মারকিউরিয়াল, মেজ, টাট-মিউ, * * নকস্, ওপি, * পলস, * বস, * সাবড, সিপি, সলফ।

নথের নীলবর্ণ :—আস', * এসাক, এপিস, আর্গ, আস', * কার্কো-ভেজি, * চিন-সল, কক, কোন, * ড্রোস, * ইউপ-পার্কো, ইপি, মেজ, * * টাট-মিউ, * নক্স, * পেট্রো, ফস-এসি, সলফ, * থুজা।

ভ্রকের নীলবর্ণ ও চিহ্ন :—* * নক্স।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা :—আর্গ, ক্যাম্ফ, * ইউপ-পার্কো, ফস, টাট-মিউ, * নক্স, * ব্রাম।

জলপানান্তে বমন :—আর্গ, * আস', * ইউপ-পার্কো, নক্স।

শিরোবেদনা :—২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জলপানে শীতের বৃদ্ধি :—এলম, * আস', এগাব, ক্যান, * * ক্যাপ্স, * চিন, কক, * ইলাপ্স, ইউপ-পার্কো, * লোব, লাইকো, মেজ, * * নক্স, * রস, সিলি, টার, * তিরিট।

নিদ্রা :—এণ্ট-ক্রড, এণ্ট-টার্ট, এপিস, জেলস, * কালী-আইওড, লাইকো, মার্ক, মেজ, * টাট-মিউ, * নক্স-ম, নক্স, ওপি, পডো, সো'ব, সিলি।

নিদ্রা, শীতান্তে :—* এপিস, আস', ক্যাম্ফ, লাইকো, মেজ, নক্স-ম, * নক্স, স্নাবিন।

উত্তাপ ।

শিরোবেদনা :—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

পিপাসা :—৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

বদন এববার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর :—একন, বেল, বোভ, ক্যাম্প, ক্রোক, ইপিকাক, নক্স, ওপি, ফস, পলস ।

নড়িলে চড়িলে কম্প :—এপিস, * আর্গ, ** নক্স, পডো, ট্রামো ।

গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা :—কার্কো-এ, চেলিড, * সিনা, কক, ডিক্সি, * ইউপ-পার্কো, ফেরি, কালী-কা, ল্যাক, লাইকো, * মেনি, মার্ক, নক্স, রস, রোব, * তিরটি ।

অঙ্গবেদনা :—আর্স, ব্রাই, ক্যাক, ক্যাম্প, কার্কো-ভেজি, চিন, * ইউপ-পার্কো, ইউপ-পার্কু, লাইকো, পলস, রস, সিকেল, সিপি, সলফ ।

ঘর্ম ।

প্রভূত :—৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

ঘর্মে বেদনার শাস্তি :—* আর্গ, বেল, ক্যালড, চেলিড, * ল্যাক, ** ভাট মিউ, * নক্স, সিকেল ।

বিরাম ।

মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ :—* আর্গ, * আর্স, ক্যাম্প, চিন, * ইউপ-পার্কো, ফেরি, * ভাট-মিউ, * নক্স, পেট্রা, রস, সিপি ।

এহ্নে লক্ষণের সমষ্টি ২৪ । এবং লক্ষণে ঔষধের অধিক উল্লেখের সংখ্যা,—
নক্স ২৩, ভাটমিউ ১৬, ইউপ-পার্কো ১৪, আর্স ১৪, চিন ১০ ।
অতবাং এই নোগীব পক্ষে নক্স-ভমিকা ব্যবহৃত ।

(২) দৃষ্টান্ত যথা:—ত্রিশবৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক চারিঘাস যাবৎ পৈত্তিক সবিরাম জরে ভোগিতেছিলেন । কুইনাইম ও ক্যালোমেণ সেবন করা হইয়াছিল । কুইনাইম সেবনে অবের প্রকৃতি চাপা পড়িয়াছিল

ঘটে কিন্তু তাহার অস্থিতে অবিরাম ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, অন্তরে অতিশয় উত্তাপ, পিপাসার আধিক্য, শ্রান্তি, শিরোঘূর্ণন, দুর্বলতা, ক্লান্ত্য করিতে অশক্তি, রাত্রিতে স্ননিদ্রার অভাব, ক্ষুধাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ অবশিষ্ট ছিল। অনন্তর একদিন অপরাহ্নে সহসা শিরোঘূর্ণন ও শীত উপস্থিত হইয়া পূর্ববৎ প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইল। বমন হইতে লাগিল। বিদীর্ণ ও আকৃষ্টবৎ অস্থি-বেদনা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রোগিণী বলিতে লাগিলেন যে তাহার মস্তকে ও শিবার অভ্যন্তরে যেন অগ্নি স্থাপিত রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব; উৎকর্ষা; চক্ষুর জ্বালা ও আরক্ততা; অবিরত বমন; অত্যন্ত পিপাসা; দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শীতল, দুর্বলকর, আঠা আঠা ঘর্ম্মের উদ্ভেক; প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। অস্থি-বেদনা অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতে অবকালীন ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করাতে তখনই বেদনার শান্তি জন্মিয়াছিল। অনন্তর জ্বরের বিরাম হইবার একটু পরেই আর্সেনিক ব্যবস্থা করাতে আর জ্বর ফিরিল না এবং তিনি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। বিশ্লেষণ যথা,—

(১) শীত ও আন্তরিক উত্তাপ :—এনাক, আর্স, ক্যাঙ্ক, কার্বো, হেলি, কালি, নক্স ভম, ফস, ফস-এসি, পলস, স্ত্রাব, ষ্টান, সলফ, ভিবাট &c। (২) অপরাহ্নে জ্বর :—আর্স, নক্স-ভম, ফস, ফস-এসি, পলস, ষ্টান, সলফ, ভিরাট &c। (৩) শীতল, আঠা আঠা, দুর্বলকর, ঘর্ম্ম :—আর্স, নক্স, ফস, ফস-এসি, ষ্টান &c। (৪) উত্তাপাবস্থায় পিপাসা :—আর্স, নক্স, ফস &c। (৫) অস্থিতে বিদীর্ণকর বেদনা :—আর্স। সুতরাং সকল লক্ষণ গুলিই আর্সেনিকে উৎপন্ন হয় বলিয়া আর্সেনিকই এস্থলে ঠিক ব্যবস্থের ঔষধ।

নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ অব-চিকিৎসা গ্রন্থ ও অত্যাশ্চর্য চিকিৎসা গ্রন্থ অব-লম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকেব নূতন সংস্করণ সঙ্কলিত হইল। এ সংস্করণে প্রথম সংস্করণেব কক্ষালমাত্র অবশিষ্ট বহিষাছে। বহুল পরিমাণে নূতন উপাদান সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার কলেবর সমধিক পবিপুষ্ট ও পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণ, আয়তনেব সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকেব কার্য্যকাৰিতা পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া অর-জ্জ্বলিত বঙ্গদেশের কিকিৎ উপকারে আসিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। আষাঢ়। ১৩০১।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

এইক্ষণ অববোধে এদেশে ঘেরূপ জৰ্জ্বলিত, বিশেষতঃ সুচিকিৎসক বিহীন পল্লোগ্রাম গুলি এই বোগ দ্বারা যে অকাব প্রাণীড়িত তাহাতে অর-চিকিৎসা সম্বন্ধে ভ্রমলোক মাত্রেরই কপক্ষিৎ জান পাকা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই মতেব ঔষধ গুলি অতিশয় সূখ-সেবা ও স্বল্প মূল্য। বোগের প্রথম উপক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে এবং পুরাতন রোগেও প্রকৃত ঔষধ নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় বিষমী-লোকদিগের হস্তেও এতদ্দ্বারা আশ্চর্য্য উপকার দণে। এই সকল কারণে আগার পুরন সূহৃৎ পরহৃৎ-কৃত্তর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ঘোষ আমাকে একখানি অব-চিকিৎসা লিখিতে অহুবোধ ববেন। তাঁহাবই অনুরোধে ও উপদেশে কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি এই অব-চিকিৎসা সঙ্কলন করিয়াছি। এই পুস্তকে এতদ্দেশে সচবাচব যে সকল অর হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ও চিকিৎসা, অববোধে ব্যবহেয় ঔষধ সকলের পিষ্টারিত লক্ষণ, এবং নাকী ও গাত্রতাপাদির পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি অব চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণ, এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা অরাকান্ত ব্যক্তিদিগের কিঞ্চৎপরিমাণে উপকার দণিবেই পরিশ্রম সকল মনে করিব। আগষ্ট, ১৮৮০।

জ্বর-চিকিৎসার সূচীপত্র ।

জ্বর সন্নিবাহ	২	ফিবার ইন্টারমিটেন্ট	২
” প্রচ্ছন্ন	২১	” মাল্‌ডু ...	২১
” দূষিত বিষম	২২	” প্যাণিশম্ ইন্টার মিটেন্ট	২২
” স্বল্পবিবাহ ...	২৫	” নিমিটেন্ট ...	২৫
” (শিশু)	৩৮	” (ইনফ্যান্টাইল)	৩৮
” অবিরাম	৩৯	” কণ্টিনিউড ...	৩৯
” সামান্য	৩৯	” সিম্পল	৩৯
” সামান্য সম্ভব	৪১	” ” কণ্টিনিউড	৪১
” সন্নিপাত ...	৪৩	” টাইফয়েড	৪৩
” মোহ	৫৫	” টাইফস	৫৫
” অভিভ্রাস	৬৭	” আর্ডেন্ট ...	৬৭
” স্মৃতিকা	৬৭	” পিউরার পাবল	৬৭
” চক্ষু	৬৯	” মিক্স	৬৯
” পৌনঃপুনিক	৬৯	” বিল্যাপ্সিং ...	৬৯
” পীত	৭২	” ইয়ালো	৭২
” স্ফোট	৭৪	” ইবাপ্টিব ...	৭৪
” বসন্ত	৭৪	” অলপক্স ...	৭৪
” পানিবসন্ত	৮৪	” চিকেন পক্স ...	৮৪
” হাম	৮৫	” মিজলস ...	৮৫
” আরক্ত	৮৯	” স্কাল্‌লেট ...	৮৯
” ডেঙ্গু	৯০	” ডেঙ্গু ...	৯০
” বিলেপা	৯১	” হেস্তিক	৯১

শুদ্ধিপত্র ।

জ্বর-চিকিৎসা ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৮	১২	১০৩২	১০৩	৩৭	১৮	টিউক্রিয়	টিউক্রিয়ম।
২	১৮	০২	২	৩৮	৬	দিগেয	দিগের।
৫	১৮	অর্জ	অর্জ	৩৮	১০	এব	এবং।
৬	৩	জীবানু	জীবানু।	৪০	১৩	ধাকিলে	ধাকিলে।
৬	৪	কুসকুস	কুসকুসে।	৫২	৭	আউওড	আইওড।
৯	১৪	বোগেব	বোগেব লক্ষণ।	৬১	৭	তাপে	তাপ।
১১	১০	প্রত্যাহ	প্রত্যাহ।	৬২	৪	লোকদিগকে	লোক- দিগের।
২১	১৩	মানি	মানি।	৬২	২১	অণুজালিক	অণুজা- লিক।
২২	৮	ডেণ	গ্রেণ।	৬৩	৪	শোণিত	শোণিতে।
২৫	১৭	আবেশকীয়	আবশ্যক।	৬৩	২৪	অত্যন্ত	অত্যন্ত।
২৮	১৮	আমণয়িক	আমাশয়িক	৬৪	২৪	বাক	বাক্য।
২৮	২১	নারীর	নারীয়া।	৬৯	১৩	ব্যবস্থা	ব্যবস্থা করা।
৩৩	২৪	মসিননার	মসিনার।	৮৪	১৩	দিলে	দিলেও।
৩৪	২০	{১১৪হইতে ১৪০	{১৪৪হইতে ১৪০।				

জ্বর-চিকিৎসা ।

সর্বপ্রকার অবৈধ অস্বাভাবিক গাত্রোত্তাপ, জ্বতনাড়ী, লেপাকৃত ত্বিহা, আমাশয়ের ক্রিয়াবিকার, স্বপ্ন ও আরক্ত মূত্র এবং অতিশয় শিপাসা প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে । অধিকাংশ প্রাদাহিক রোগে এবং উপঘাত প্রাপ্তির পরে জ্বর লক্ষণ অবস্থিতি করে । কিন্তু অত্যন্ত ব্যাধির সহিত সংসৃষ্ট না থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র রোগ স্বরূপ জ্বর প্রকাশ পায় । প্রতিশ্রুয় বা অজীর্ণ অথবা ম্যালেরিয়া বা অন্ত কোন প্রকার বিষবৎ শব্দার্থ দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া এইরূপ জ্বর উৎপন্ন হয় । এই শ্রেণীকৃত প্রকারের জ্বর প্রধানতঃ দুই ভাগে * বিভক্ত যথা,—সবিরাম ও অবিরাম । তন্মধ্যে এতদেশে যেগুলি সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহারই বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লিখিত হইল ।

জ্বর সহকারে পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে বসন্তজ্বর বা মোহজ্বর ; শিরঃ-পীড়া ও অতিশয় থাকিলে সন্নিপাত জ্বর ; মস্তকে সর্দি থাকিলে হামজ্বর ; এবং অতিশয় শিরঃপীড়া থাকিলে মোহজ্বর সন্দেহ করা যাইতে পারে ।

জ্বরে গাত্রোত্তাপ ১০৩ তাপাংশ হইলে ঈষৎ উগ্র ; ১০৪ তাপাংশ হইলে উগ্র ; ১০৫ তাপাংশ হইলে অতিশয় উগ্র ; ১০৬ তাপাংশ হইলে সঙ্কটজনক ; এবং ১০৭ তাপাংশ হইলে সাধারণতঃ মাংসাতিক জ্বর বলিয়া অবধারণিত হইয়া থাকে ।

লিঙ্গ, বয়ঃক্রম, ধাতু, প্রকৃতি ও জাতি অনুসারে জ্বরের প্রকৃতির ভিন্নতম্য জন্মে ।

*কেহ কেহ পুতিবাস্পজ বা ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর, সন্তত জ্বর, (একজ্বর) ও ফেটিজ্বর এই তিন ভাগে জ্বরের শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন ।

সবিরামজ্বর ।

(ক) পুতিবাস্পজ-জ্বর-ম্যালেরিয়াস ফিভারস ।

(১) বিষমজ্বর পাই-ইন্টারমিটেন্ট ফিভার ।

যে দেশে অধিক পরিমাণ অনুপভূমি ও পয়ঃপ্রণালীবিহীন পলিভূমি আছে সেই দেশেই বিষমজ্বর ও স্বল্প বিরামজ্বর বহুল পবিমাণে হইয়া থাকে । ভূমি শুভ্র কর্তিত ও পরিশুদ্ধ হয় এবং পয়ঃপ্রণালীর যতই আধিক্য জন্মে ততই এই সকল বোগ হ্রাস প্রাপ্ত হয় ।

বিষমজ্বর পর্যায়ক্রমে শীত, উষ্ণ ও ঘর্ম্মাবস্থাবিশিষ্ট এক প্রকার মুক্তাঙ্ক-বন্দী জ্বর । এই অব শীত হইয়া আরম্ভ হয় ও ঘর্ম্ম হইয়া বিরাম পায় এবং ক্রিয়াকলাপ বিরামের পরে পুনর্বার প্রকাশিত হয় । কিছুকাল সম্যক বিব্রামের পরে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে বিষমজ্বর, সবিরামজ্বর, বা সপর্যায় জ্বর বলে । জ্বরের উচ্চাবস্থাকে প্রকোপকাল এবং বিচ্ছেদ অবস্থাকে বিরামকাল কহা যায় ।

সকল প্রকার বিষমজ্বরেরই এই বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হয় যে জ্বরের প্রারম্ভাবস্থায় যখন রোগী শীতানুভব করিতে থাকে, তখন সহসা ফ্রতরেনে শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় এবং জ্বরের শেষ অবস্থায় বিরামকাল যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই শারীরিক উত্তাপ শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় । বিষমজ্বরে গাত্রতাপ ১০৫।১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় ; এবং সময়ে সময়ে ১০ মিনিটে ১২ ডিগ্রী করিয়া বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ।

প্রকারভেদ ।—বিষমজ্বর অত্যাধিক (ঐক্যিক), তৃতীয়ক (ত্যাহিক) ও চতুর্থক (ত্যাহিক) প্রধানতঃ এই তিন প্রকারে বিভক্ত । ঐক্যিক (কোটিডিয়ান) ২৪ ঘণ্টা অন্তর প্রতিদিন একবার প্রকাশ পায় এবং উষ্ণ-

† নিদানোক্ত বিষমজ্বর ভাষায় সবিরামজ্বর, সপর্যায়জ্বর, পালাজ্বর, ও কম্পজ্বর নামে সচবাচর অভিহিত হইয়া থাকে ।

প্রধান দেশে বসন্তকালেই অধিক উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে এই জ্বরের আক্রমণ প্রকাশ পায়। ইহাতে শীত কম ও তাপ অধিক থাকে। তৃতীয়ক (টার্শিয়ান) জ্বর ৪৮ ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ এক দিবস পরে এক দিবস মধ্যাহ্নকালে প্রকাশ পায়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে এবং শিশু, যুবক, ও শৌণিত-প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে বসন্ত ও বর্ষাকালে ইহার আধিক্য দৃষ্ট হয়। চতুর্থক (কোয়ার্ট্যান) জ্বর ৭২ ঘণ্টা অন্তর প্রায়ই শরৎ ও হেমন্তকালে অপ-
রাহ্নে উপস্থিত হয়। বিষমজ্বর প্রত্যহ দুইবার প্রকাশ পাইলে উহাকে দ্বৌক-
লীনজ্বর বলে। প্রতিদিন জ্বরান্তের সময় আঁগুরাইরা আসিলে অগ্রগামী বা এন্টিসিপেটিং এবং পিছাইরা পড়িলে পশ্চাদামী বা রিটার্ডিং জ্বর বলে। জ্বরের পশ্চাদামী হ্রাসক্ষণ, ইহাতে জ্বর নীচ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা; অগ্র-
গামী হ্রাসক্ষণ, ইহাতে সবিরামজ্বরের এক-জরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল জ্বরের শীতাবস্থা যতই দীর্ঘ থাকে, জ্বরের ভোগকাল ততই সংক্ষিপ্ত হয়।

যে সকল ব্যক্তি পুতিবাস্প (ম্যালেরিয়া) প্রধান স্থানে বাস করে তাহা-
দের শারীরিক উত্তাপ-উত্তাবনী শক্তির ক্ষীণতা জন্মে এবং অনায়াসে ক্ষু-
ধপরিবর্তন সহ্য হয় না; সুতরাং যে সকল শারীরিক ক্রিয়াদ্বারা শরীর-গুণ্ড
পুতিবাস্প নিঃসারিত হয়, তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে এবং পুনঃ পুনঃ জ্বরের
আক্রমণ প্রকাশ পায়। জ্বরের শীতাবস্থায় আত্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয়
বশতঃ গ্লীহা, যকৃৎ, অস্ত্র ও সময়ে সময়ে বৃক্কের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্মে।
রোগীর বর্ণ মলিন, অঙ্গ ক্লান্ত, উদর দ্বীত ও কোষ্ঠ রুদ্ধ হয়। গ্লীহা সবিশেষ
বিস্তৃদ্ধিত হইয়া থাকে। গ্লীহা আরোপ্য না হইলে প্রায়ই জ্বর আরোপিত
হয় না। যত দিন গ্লীহা বিবর্তিত থাকে, ততদিন বারংবার জ্বর প্রকাশ পায়।
বিষমজ্বরের পর কিছুকাল পর্যন্ত শরীর একপ হ্রাস থাকে, যে সামান্য কারণে
পুনরায় জ্বর হইতে পারে। বিষমজ্বর স্থান বিশেষে বা দেশ বিশেষে উৎপন্ন
হয় বলিয়া ইহাকে স্থানিক (এণ্ডেমিক) রোগ কহে।

কারণ।—ম্যালেরিয়া বা পুতিবাস্প অর্থাৎ একপ্রকার অদৃশ্য হুজু
বিশেষ পদার্থ এই রোগের উদ্দীপক কারণ। শ্রান্তি, অবসন্নতা, মানসিক
অবসাদ, অপব্যাপ্ত বা অমুপযুক্ত আহার, অমিতাচার, নিশা-বায়ু এবং বিষম-

জ্বরের পূর্বাভাস ইহার পূর্ববর্তী কারণ । কিন্তু এই ম্যালেরিয়া যে কি, আজিও তাহার সর্বসম্মত স্থানিষ্ঠিত মীমাংসা স্থিরীকৃত হয় নাই । তবে স্থান বিশেষে কতকগুলি পর্য্যায়শীল বোগের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সেই সকল স্থান হইতে একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প উদ্ভূত হইয়া এই সমস্ত রোগ জন্মে । এই বাষ্পই ম্যালেরিয়া বা পুতিবাষ্প নামে অভিহিত হইয়াছে । নদীর আর্দ্র কূল-ভূমি, পর্বত শ্রেণীর নিম্নস্থ নিবিড় বন, সাময়িক জলপ্লাবনাদীন স্থান, অনুপ-ভূমি এবং জল-সিক্ত নিম্নস্তব বিশিষ্ট শুষ্ক বালুকাময় অল্পক্ষর প্রদেশ ম্যালেরিয়ার আবাস ভূমি । গলিত উদ্ভিদ হইতেই যে কেবল ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হয় ইহা সত্য নহে । সিক্ত ভূমি শুষ্ক হইবার সময় উহা হইতেও ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । সুতরাং যে সকল স্থান বৎসরের কোন সময় কেবল জলসিক্ত হয় সম্ভাব্যে তাহা স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতে পারে । কিন্তু যে স্থানের নিম্নস্তব নিরন্তর আর্দ্র, সেই স্থান কখনই সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় না বলিয়া সর্বদাই অস্বাস্থ্যকর থাকে ।

মোস্‌মি বায়ুর (মনসুন) অব্যবহিত পবে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের প্রথম সূর্য্যোত্তাপে যখন আর্দ্রভূমি শুষ্ক হইতে থাকে, তখনই অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয় । এই অদ্ভুত পদার্থ বায়ুতে ভাসমান থাকিয়া বিচরণ করে । ভূ-পৃষ্ঠে বাস বা শয়ন করিলে যত ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর উৎপন্ন হয় একটু উচ্চস্থানে বা গৃহের উপরি তলে থাকিলে তত হয় না বলিয়া ম্যালেরিয়া বায়ু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শুষ্ক বলিয়া বোধ হয় । রাত্রিকালেই ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাচুর্য্য । যেহেতু নিশাবায়ু সেবনেই পুতি বাষ্পজ রোগ অধিক জন্মে । বায়ু কর্তৃক এই বাষ্প এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হয় ; সুতরাং অনুপভূমি বা পুতি বাষ্পময় স্থানের সন্ধ্যাদিনা যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যাহারা সেই বায়ু বিপরীত দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করে তাহার নিশ্বাস দ্বারা অধিক পরিমাণে ঐ বাষ্প গ্রহণ করে সুতরাং সন্ধ্যার অরাক্রান্ত হইয়া পড়ে । কিন্তু বায়ুর পশ্চাৎ দিকে ম্যালেরিয়া দ্বারা বিশেষ জ্বনিষ্ট জন্মে না । যে স্থান হইতে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয় সেই স্থান ও মনুষ্যের আবাস ভূমির মধ্যে বৃক্ষ শ্রেণী থাকিলে তদ্বারা ম্যালেরিয়া বিনষ্ট অথবা উৎসার গতি প্রতিক্রম হয় । অগ্নির উত্তাপেও ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়, অতএব

ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে রাত্রিতে প্রবল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিলে উপকার দর্শে । কেহ কেহ বলেন, ইউক্যালিপ্টস বৃক্ষ, সূর্যমুখী ফুল ও তুলসী ম্যালেরিয়া নাশক । বাতীতে উহাদের বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া দ্বারা অপকার জন্মে না ।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দ্ধারিত নিয়ম দৃষ্ট হয়, যথাঃ—(১) নিয়ম ও অর্ধ স্থানেই ম্যালেরিয়ার সমধিক প্রাবল্য দেখা যায় । (২) ৬০ তাপাংশের নীচে ইহা প্রায় বিকসিত হয় না । (৩) ৩২ তাপাংশ উত্তাপে ইহার প্রবল কার্যকারিতা প্রতিকল্প হয় । (৪) বিষুবরেখা ও সমুদ্রকূলের নিকটেই ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য দেখা যায় । (৫) নিবিড় বৃক্ষ-পঞ্জ্রে ম্যালেরিয়া সংগৃহীত ও উহার গতি সংরুদ্ধ হয় । (৬) বায়ু সহকারে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রবাহিত হইতে পারে । (৭) যেখানে ম্যালেরিয়া নাই সে স্থানেও পতিত ভূমি কর্ষণ, রেলওয়ের রাস্তা নির্মাণ ও খণাদি খনন করাতে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইতে পারে । (৮) অভিজ্ঞতা দ্বারাই কেবল ম্যালেরিয়ার বিদ্যমানতা জানা যায় । (৯) জলরাশি ম্যালেরিয়া আকর্ষণ ও পরিশোধন করে । (১০) ম্যালেরিয়া-প্রধান প্রদেশ সকল যতই পরিষ্কৃত ও অধ্যুষিত হয় ততই ম্যালেরিয়া জনিত পর্য্যায় অব বিলুপ্ত হইতে থাকে । কেবল যে গলিত উদ্ভিদ ও অনাবৃত সজল ভূমি হইতেই ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়, এমন নহে । গৃহের অভ্যন্তর ভাগ অর্ধ থাকিলে অথবা গৃহের নিম্নদেশ বা নিকট দিয়া পথঃ প্রণালী থাকিলেও বায়ু দূষিত হইয়া বিবিধ প্রকার পুতিবাস্পজ রোগ উৎপন্ন করে ।

ম্যালেরিয়া-জরের কারণ সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে এক প্রকার কীটাণু হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয় । পুতিবাস্পাদিতে এই কীটাণু বাস করে । চক্ষুর অগোচর অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট এক জাতীয় জীবাণুকে ব্যাকটেরিয়া বলে । এই জীবাণু পরাস্পপৃষ্ট অর্থাৎ অপর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । বিস্থিকাদি ব্যাপক ও সংক্রামক রোগ সকল এই সকল পরাস্পপৃষ্ট জীবাণু হইতেই সমুৎপন্ন হয় । এই জীবাণুর ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে । এই ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সংক্রামক রোগ সম্ভূত হয় । প্রথমে জল বায়ু বাস্পাদি সহযোগে এই সকল জীবাণুর বিজ প্রসার

দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং তথ্য কিছু কাল পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শরীরের বিকার জন্মায় ও রোগ উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস এই জাতীয় একপ্রকার জীবাণু রক্তে ইহাদের অবস্থিতি বশতই ম্যালেরিয়াজ্বর উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণু বা কীটোণু নিম্নাস দ্বাৰা কুসকুল অথবা পানাহার সহযোগে উদবে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প কাল মধ্যে বিবৰ্দ্ধিত ও সংখ্যাভীত হইয়া পড়ে এবং রক্তে ও লীহাদি-বস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। অল্পবিক্ষেপ বস্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে অব-কথ ব্যক্তির মূত্রে ও ঘর্শে ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস নামক জীবাণু দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের মৃত্তিকা ও বায়ুতেও এই সকল জীবাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জীবাণুপূর্ণ মৃত্তিকা জলেব সহিত মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম ব্যক্তিব শোণিতে প্রবিষ্ট করিলে ম্যালেরিয়া বিষ-দূষিত বোগীর জ্বর লক্ষণ এবং পর্য্যায় জ্বর ও লীহার বিরুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়।

গৃহীত ম্যালেরিয়ার পরিমাণ এবং বোগীর স্বাস্থ্য ও বলাহুমানের রোগের উৎপত্তার তারতম্য জন্মে। অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিলেই প্রবল বহ্ন-বিরাম জ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন সংঘত আকাবে অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর প্রকাশ না পাইয়া হিমাসের জ্বায় এক প্রকার অবস্থা জন্মে এবং উহাতে কতিপয় ঘটিকার মধ্যেই বোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রভাব বশতঃ সহসা কুৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া একরূপ ঘটে। ইহাকেই দূষিত বিষজ্বর বলে। পক্ষান্তরে সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরস্থ হয়, যে শিবে পীড়া, শানি বা উদরায়ন ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াই উহাব বিবক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতদ্বারা রক্তাতিসার বা শিরঃশূল জন্মিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বিষ গ্রহণ সময়ে শরীরের যে বস্ত্রের ক্ষীণতা থাকে তাহাতেই উহার ক্রিয়া সহজে প্রকাশ পায়। অমিতাচারী, ক্ষীণবল ও গণ্ডালাগন্ত ব্যক্তিবা যে পরিমাণ ম্যালেরিয়া দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে, বলিষ্ঠ ও সুস্থকার ব্যক্তিদিগের তাহাতে তত অপকাবে জন্মে না।

এই বিষ একবার মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে এতদ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে পুনর্বার ম্যালেরিয়া গ্রহণ ব্যতীতও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া জনিত রোগ আরোগ্য হইবার পরেও কয়েক মাস ক

কণ্ঠের বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের এমন একপ্রকার অবস্থা থাকিয়া যায়, যে সামান্য কারণে অর্থাৎ সর্দি বা রৌত্র লাগাইলে, আহারের অভ্যাচায়ে বা অত্র যন্ত্র ধারণ করিলে কিম্বা সিক্তপদে অধিকক্ষণ থাকিলে পুনর্বার জ্বর উৎপন্ন হয় ।

লক্ষণ ।—প্রথমতঃ পূর্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ সাধারণতঃ বিষগ্রাহকের চতুর্দশ দিবসের মধ্যে অবসন্নতা, দুর্বলতা, অস্থিরতা, জ্বত্তণ (হাইভোলা) ; অঙ্গ-মর্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা), এবং আমাশয়ে একপ্রকার যাতনা ; কখন কখন বা জজ্বা, পৃষ্ঠ বা কটিদেশে বেদনা বা গ্লানি, অথবা চক্ষু ও করতলে দাহ, কর্ণে শব্দ, কিম্বা সামান্য শিরঃপীড়া প্রকাশ পায় । অনন্তর (১) সর্বদা বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে শীতানুভব ; মুখমণ্ডল ও অঙ্গুলী সমুচিত এবং স্বচ্ছ রোমাঞ্চিত হয় । তৎপরে কম্প ও দন্ত-বর্ষ জন্মে । সময়ে সময়ে পূর্ববর্ণিত পূর্ব রূপাবস্থার লক্ষণ গুলি উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই শীত ও কম্প প্রকাশিত হয় । কম্প সহকারে নাসাগ্র ও ওষ্ঠ নীল বর্ণ, নিখাস ক্ষত, নাকী বেগবতী, জিহ্বা শুভ্র ও শুষ্ক হয় । এবং পৃষ্ঠ, কটি ও অঙ্গে প্রবল বেদনা থাকে । ইহাকেই বিবন্ধু জ্বরের শীতাবস্থা বলে । এক্ষণ রোগীর শীতানুভব সত্ত্বেও ক্ষতলে তাপমান-প্রয়োগে তাহার গাত্র-তাপ বিমর্দিত ও হস্তপাদির তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত দৃষ্ট হয় । ম্যালেরয়ার বিবক্রিয়া বশতঃ জ্বৎপিণ্ডের ক্রিয়া সূচক-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না । এই জন্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-মঞ্চন হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হইলেই অত্যন্ত অবস্থা অপেক্ষা শীতাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং যে যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হয়, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকার জনিত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায় । অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে শিরঃপীড়া, শিরোগোড়ব, নিদ্রাবেশ, প্রলাপ ও কর্ণনাদ ; হৃদযন্ত্র ও জ্বৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য হইলে বক্ষঃস্থল ভার, ঘনশ্বাস ও নাড়ীর ক্ষীণতা ; এবং আমাশয়, বক্লং বা অস্ত্রে রক্তসঞ্চিত হইলে বমন, বিবমিষা, পিত্তের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, উদরায়ম প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয় । শীতাবস্থা : অবসানের প্রাকালে শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা ও বহির্ভাগে শীতলতা অনুভূত হয় । অনন্তর অর্ধ ঘটিকা হইতে তিন চারি ঘটিকার মধ্যে শীত ও কম্প হ্রাস পড়ে এবং দ্বিতীয় বা উচ্চাবস্থা আরম্ভ হয় । কাহার কাহার একেবারেই শীতাবস্থা প্রকাশ পায়না । শীতের পরিবর্তে অত্যন্ত দায়বীর্যতা, আমাশয়ে বেদনা,

দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় কিছু কাল পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শরীরের বিকার জন্মায় ও রোগ উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস এই জাতীয় একপ্রকার জীবাণু রক্তে ইহাদের অবস্থিতি বশতই ম্যালেরিয়াজ্বর উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণু বা কীটাদি নিশ্বাস দ্বাৰা ফুলফুল অথবা পানাহার সহযোগে উদরে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প কাল মধ্যে বিখণ্ডিত, বিবর্দ্ধিত ও সংখ্যাভীত হইয়া পড়ে এবং বক্তে ও প্লীহাদি-বস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। অতীবাক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা কবিলে অব-রুগ্ন ব্যক্তির মূত্রে ও ঘৰ্শ্বে ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস নামক জীবাণু দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের মৃত্তিকা ও বায়ুতেও এই সকল জীবাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জীবাণুপূর্ণ মৃত্তিকা জলের সহিত মিশ্রিত কবিয়া সুস্থ ব্যক্তির শোণিতে প্রবিষ্ট কবিলে ম্যালেরিয়া বিষ-দূষিত বোগীব স্তায় লক্ষণ এবং পর্য্যায় জ্বর ও প্লীহাব বিবর্দ্ধি সমুৎপন্ন হয়।

গৃহীত ম্যালেরিয়ার পবিমাণ এবং বোগীব স্বাস্থ্য ও বলাহুসারে রোগের উৎপত্তি তারতম্য জন্মে। অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিলেই প্রবল স্বল্প-বিরাম জ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন সংযত আকাবে অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অব প্রকাশ না পাইয়া হিমাইনের স্তায় এক প্রকার অবস্থা জন্মে এবং উহাতে কতিপয় ঘটকাল মধ্যেই বোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রভাব বশতঃ সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া একরূপ ঘটে। ইহাকেই দূষিত বিষমজ্বর বলে। পক্ষান্তরে সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরস্থ হয়, যে শিরঃ-পীড়া, গ্রানি বা উদরাময় ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াই উহার বিবক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতদ্বারা রক্তাতিসার বা শিবঃশূল জন্মিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বিষ গ্রহণ সময়ে শরীরের যে বস্ত্রের ক্ষীণতা থাকে তাহাতেই উহার ক্রিয়া সহজে প্রকাশ পায়। অমিতাচারী, ক্ষীণবল ও গুণমালাগ্রস্ত ব্যক্তির যে পরিমাণ ম্যালেরিয়া দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে, বলিষ্ঠ ও সুস্থকার ব্যক্তিদিগের তাহাতে তত অপকার জন্মে না।

এই বিষ একবার মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে এতদ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে পুনর্বার ম্যালেরিয়া গ্রহণ ব্যতীতও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া জনিত রোগ আরোগ্য হইবার পরেও কয়েক মাস কা

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের এমন একপ্রকার অবস্থা থাকিয়া যায়, যে সামান্য কারণে অর্থাৎ সর্দি বা বৌদ্ধ লাগাইলে, আহারের অভ্যাচারে বা অর্জ রক্ত ধারণ করিলে কিম্বা মিক্রপদে অধিকক্ষণ থাকিলে পুনর্বার জ্বর উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ।—প্রথমতঃ পূর্বরূপ অবস্থার অর্থাৎ সাধারণতঃ বিষগ্রহণের চতুর্দশ দিবসের মধ্যে অবসন্নতা, দুর্বলতা, অস্থিভা, জ্বন্তণ (হাইতোলা) ; অঙ্গ-মর্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা), এবং আমাশয়ে একপ্রকার যাতনা ; কখন কখন বা জন্বা, পৃষ্ঠ বা কটিদেশে বেদনা বা গ্লানি, অথবা চক্ষু ও করতলে দাহ, বর্ণ শঙ্ক, কিম্বা সামান্য শিথলতা প্রকাশ পায়। অনন্তর (>) সর্কাক্সে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে শীতাত্তব ; মুখমণ্ডল ও অঙ্গুলী সঙ্কুচিত এবং ত্বক্ রোমা-
কিত হয়। তৎপরে কম্প ও দন্ত-ঘর্ষ জন্মে। সময়ে সময়ে পূর্ববর্ণিত পূর্ব রূপাবস্থার লক্ষণগুলি উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই শীত ও কম্প প্রকাশিত হয়। কম্প সহকারে নাসাগ্র ও ওষ্ঠ নীল বর্ণ, নিখাস ক্ষত, নাকী বেগবতী, জিহ্বা শুষ্ক ও শুষ্ক হয়। এবং পৃষ্ঠ, কটি ও অঙ্গে প্রবল বেদনা থাকে। ইহাকেই বিষমু জ্বরের শীতাবস্থা বলে। এক্ষণ রোগীর শীতাত্তব সত্ত্বেও ক্ষতলে তাপমান-প্রয়োগে তাহার গাত্র-তাপ বিদ্বিষ্ট ও হস্তপাদির তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত দৃষ্ট হয়। ম্যালোরবার বিক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সূচাক-
রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হইলেই অস্ত্রান্ত অবস্থা অপেক্ষা শীতাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং যে যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হয়, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকার জনিত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলে শিরঃপীড়া, শিরোগোন্দ, নিদ্রাবেশ, প্রলাপ ও কর্ণনাদ ; কুসমুদ্র ও হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য হইলে বক্ষঃস্থল ভার, ঘনশ্বাস ও নাকীর ক্ষীণতা ; এবং আমাশয়, বহুৎ বা অল্পে রক্তসঞ্চিত হইলে বমন, বিবমিষা, পিত্তের ক্রিয়া-
টীবলক্ষণ্য, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। শীতাবস্থা : অবসানের প্রাক্কালে : শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা ও বহির্ভাগে শীতলতা অনুভূত হয়। অন-
ন্তর অর্ধ ঘটিকা হইতে তিন চারি ঘটিকার মধ্যে শীত ও কম্প হ্রাস পড়ে এবং দ্বিতীয় বা উচ্চাবস্থা আরম্ভ হয়। কাহার কাহার একেবারেই শীতাবস্থা প্রকাশ পায়না। শীতের পরিবর্তে অত্যন্ত দ্রাবীয়তা, আমাশয়ে বেদনা,

অবিরত বমন, অথবা তন্দ্রা-দোষ জন্মে । শিশুদিগের শীতাবস্থায় কখন কখন আক্ষেপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । উষ্ণাবস্থায় সর্বাঙ্গে মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশে, তৎপরে সর্বাঙ্গে দাহ প্রকাশ পায় । অনন্তর রোগীর মুখমণ্ডলের আরক্ততা, নাড়ীর বেগের ত্রুততা, কপাল-প্রান্তের শিরাম্পন্দন, উগ্রতা, অস্থিরতা ও অতিশয় পিপাসা জন্মে । শীত ও উষ্ণাবস্থায় রোগী বারংবার অন্ন, তীক্ষ্ণ ও জ্বালারমুখ পরিভ্যাপ্ত করে । উষ্ণাবস্থায় গাত্রতাপ সাধারণতঃ ১০৪ হইতে ১০৬ ডিগ্রী হইয়া উঠে । এই অবস্থা তিন হইতে আট ঘটিকা অবস্থিতি করে । (৩) অবশেষে তৃতীয় বা ঘর্মাবস্থা উপস্থিত হয় । প্রথমতঃ গ্রীবা ও মুখমণ্ডলে, অনন্তর সর্বশরীরে ঘর্ম্ম হয় । দাহ, পিপাসা, শিরঃপীড়া ও অস্থিরতাদির বিরতি জন্মে । এইক্ষেণে নাড়ী বগতি স্বাভাবিক হইয়া উঠে । রোগী অপেক্ষাকৃত স্নেহতা ও স্বচ্ছন্দতা অর্জন করবে ; এবং সচরাচর নিদ্রিত হইয়া পড়ে । ঘর্মাবস্থা গড়ে তিন চারি ঘণ্টা থাকে । ঘর্মাবস্থায় কখন কখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বা স্তব্ধতা বশতঃ সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত অথবা অকস্মাৎ মৃত্যু হইতে পারে । (৪) ঘর্মাবস্থার অবসানে অবস্থা হ্রাস বিরামাবস্থা উপস্থিত হয় । বিরামাবস্থায় ভিন্নভিন্ন বোগীর ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায় । কাহার কাহার কেবল দুর্বলতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তির কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে না । কোন কোন রোগীর দুর্বলতা, অগ্নি-মান্দ্য ও অজ্ঞাত ক্রিয়া-বিকার দেখা যায় । বিষম জরের ভোগ কাল গড়ে ছয়ঘণ্টা, কিন্তু কখন কখন তদপেক্ষা অল্প বা অধিক দৃষ্ট হয় ।

বিষমজরের আক্রমণ কালে তাপমান দ্বারা শরীর-তাপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহা স্বাভাবিক পরিমাণ ৯৮.৪ অংশ হইতে ১০৫ বা ১০৬ অংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় । এই জরের আবেশ আরম্ভ হইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্বেই শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রোগ অন্তর্হিত হইবার কয়েক দিন পরেও এই প্রকার শারীরিক তাপের বৃদ্ধিত ভাব দেখা বাইতে পারে । রোগান্তে যতদিন গাত্রতাপের এক্রপ অবস্থা থাকে, ততদিন রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগ-মুক্ত হয় নাই মনে করা উচিত ।

যদিও প্রকৃত বিষমজরে পূর্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু ৭৮ স্ফাটর, বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রমণের পরে ইহার বিস্তর ব্যতিক্রম দৃষ্ট

হয়। প্রথম প্রকৃতি ঘটে যে, শীতাবস্থা আর প্রকাশ পায়না অথবা অতি অল্প প্রকাশ পায় এবং কম্প ব্যতীত কেবল উষ্ণাবস্থা উপস্থিত হয়। অথবা পূর্ণোক্ত অবস্থাত্তরের কোন কোন অবস্থা একবারেই অবর্তমান থাকে। এই রোগে প্রায়ই শীত ও যকৃতাদি আভ্যন্তরিক যন্ত্র গীড়িত হইয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রের বিকৃতি ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা উহাদের রূপাবস্থা নিরূপণ করা যায়। অনেকানেক রোগীর শিবোলক্ষণ জন্মে এবং জ্বরের প্রকোপ কালে, বিশেষতঃ উষ্ণাবস্থায় বিলক্ষণ প্রলাপ উপস্থিত হয়। কাহার কাহারও আমাশয়িক উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং অবিবত দুর্নিবাব বমন হইতে থাকে, আহার ওষধ কিছুই আশ্রয় থাকে না।

পরিণাম।—ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজ্বর অনেকদিন থাকিলে প্রায়ই স্বল্প-স্বল্পতা বা এনিমিয়া, শ্রীগ যকৃতের কণ্ডিতা, দেহের শীর্ণতা, শোথ, শীতাদ, ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকার, উদরাময় ও রক্তাতিসারাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বিনির্ণয়।—বিষম জ্বরের বিরামকালে রোগের সকল সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। স্বল্প-বিরামজ্বরে জ্বরের সম্যক বিরাম জন্মে না, রোগ লক্ষণ কিয়ৎকাল কেবল মগ্নাবস্থায় থাকে। বালকদিগের বিষমজ্বর প্রায়ই স্বল্প-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মাব বিলেপী জ্বর ও গভীর-মূল ব্রণ-শোধের পুথোৎপত্তির পূর্ববর্তী অবস্থাতে ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজ্বর পৃথক করা বিশেষ কঠিন নহে। যক্ষ্মার জ্বর ও ব্রণ-শোধের জ্বরে যক্ষ্মা ও ব্রণ-শোধের অভাব যে সকল লক্ষণ থাকে ম্যালেরিয়ার জ্বরে তাহা থাকে না।

অতিরিক্ত কুইনাইন বা আর্সেনিক সেবন বস্তুতঃ ও কখন কখন ম্যালেরিয়ায় লক্ষণের ভ্রান্ত কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। উহা কুইনাইনের বিষ-ক্রিয়ায় ফল, বাস্তবিক জ্বর নহে। উহাকে ডম-এগিউ বা জ্বীর্ণ জ্বর বলা যায়। সামান্যতঃ অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন জনিত “ঘুম ঘুমে” জ্বরও বলে।

প্রতিকার।—সামান্য সবিরাম জ্বর সাংঘাতিক নহে। তবে শীত-যকৃতের বিকৃতি, শোথ, উদরাময় ও মুখ-ফতাদি উপসর্গ বিলক্ষণ ক্ষুদ্রতর। উত্তীর্ণ জ্বর অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য; চতুর্থক দুঃসারোগ্য; ঐক্যাহিক সমধিক

সকটাপন্ন। অগ্রগামী অরু রোগেব বৃদ্ধি ও পশ্চাৎগামী অরু অরুর হ্রাস জ্ঞাপক।

চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিতে বিষম-অরুর চিকিৎসা তত সহজ নহে। চিকিৎসকের ভৈষজ্যতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ঔষধ নিরূপণে সম-ধিক পারদর্শিতা না থাকিলে এই অব চিকিৎসায় সফর কৃতকার্য হওয়া সম্ভবপর নহে। চিকিৎসার প্রথমে রোগীর সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণগুলি অর্থাৎ অরুর ভোগ ও বিবাম কালে প্রকাশিত, সকল অবস্থায় অভিব্যক্ত, লক্ষণ-সমষ্টি অতি সাবধানে সংগ্রহ করা কর্তব্য। অনন্তর সংগৃহীত লক্ষণ সমষ্টির ঠিক সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করা বিধেয়। ঠিক সদৃশ ঔষধ নির্বাচিত ও প্রয়োজিত না হইলে অবিলম্বে ও নিশ্চিতরূপে অব আরোগ্য হয় না। সদৃশ ঔষধ স্থবীকৃত হইলে সাধাণতঃ তরুণ রোগে তাহার নিয়ন্ত্রণ ও পুরাতন রোগে উচ্চক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর নিয়ন্ত্রণে উপকার না দর্শিলে উচ্চক্রম, ও উচ্চক্রমে উপকার না দর্শিলে নিম্ন ক্রমও ব্যবহৃত হয়। ক্রম সঙ্কে কোন নির্দ্ধাবিত নিয়ম হইতে পেরে না। ইহা প্রত্যেক চিকিৎসকের নিজের ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করে। সবিরাম অরু অবের বিরাম-কালই ঔষধ প্রয়োগের সুসময়, তখন শরীর অপেক্ষাকৃত উপদ্রবশূন্য থাকে বলিয়া ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপে প্রকাশ পায়। বিরামকালে বথাবিহিত ঔষধ ব্যবহারের পর অবের যদি কোন প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয় অর্থাৎ অরু যদি অগ্রগামী ও বৃদ্ধি হইয়া উঠে, অথবা পশ্চাৎগামী ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় তবে প্রদত্ত ঔষধের ক্রিয়া হইতেছে জানিতে হইবে, তখন অল্প কোন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সেই ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মান উচিত নহে। অরুর আর এক আক্রমণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা কর্তব্য। ফলতঃ কি নূতন, কি পুরাতন কোন রোগেই, কোন ঔষধ প্রয়োগের পর রোগেব অস্পষ্ট বা ক্রমাগত উৎকর্ষ দৃষ্ট হইলে অল্প কোন ঔষধ বা সেই ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ বিহিত নহে। (যৎকৃত ভৈষজ্যতত্ত্বে মাত্রা ও ক্রম-বিচার দ্রষ্টব্য)।

যদিও বিরাম কালই ঔষধ প্রয়োগের উপযুক্ত সময় ঘটে, কিন্তু অরু-কালেও কোন কোন লক্ষণের অতিশয় প্রাবল্য থাকিলে ও নিত্যন্ত আবশ্যক বোধ হইলে রোগীর স্বপ্ননার উপশমার্থ বিশেষ বিশেষ লক্ষণে বিশেষ বিশেষ ঔষধ

ব্যবহৃত হয়। শীতের আতিশয্যে কক্ষের, ভিরেট্রুম, বা চারনা ব্যবস্থা করিলে শীতভোগ অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়ে। দাহাবস্থায় অতিশয় অস্থিরতা, পিপাসা ও আকুলতা থাকিলে একোনাইট ব্যবস্থ্যে; শিরোবেদনা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহার্য। অধিক বমন হইলে ইপিকাক; ঘর্ম্মাবস্থার প্রাবল্যে কস ফরিক এসিড; ও অবসন্নকর অতিঘর্মে আর্স, কার্বো, ইপি; এবং গাত্র-বেদনার আধিক্যে ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম দেওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ডিকিন্সন জ্বরফালীন অমৃৎকট জরে জেলসিমিনম এবং উৎকট বা দূষিত ম্যালেরিয়া জরে ভিরেট্রুম ভিবিডি ব্যবহার করিয়া থাকেন। শীতাবস্থায় প্রারম্ভ হইতে দাহাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসক দিগের ফিজার মিক্‌চারেব ছায় এক এক ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা জেলসিমিনম প্রয়োগ করেন এবং তিনি মনে করেন যে এতদ্বারা অধিকাংশ রোগীর জ্বরের জোগকালের খর্ব্বতা, তীব্রতাব লঘুতা এবং আত্মবলিক শিরঃপীড়া ও গাত্র-বেদনার স্বল্পতা জন্মে। ম্যালেরিয়া বিষেব বিশেষ আধিক্য না থাকিলে এতদ্বারাই জ্বব সত্ত্বব আরোগ্য হয়। তীব্র শীত, তৎসহ অতিশয় অবসন্নতা, মুখমণ্ডলের কৃষ্ণবর্ণ, তৎপরে উগ্র উত্তাপ, পূর্ণ কঠিন নাড়ী, গ্রীবার ধগনীব দপদপ, ও রক্তবহা নাড়ীর অতিশয় উত্তেজনা লক্ষণে; সংকেপতঃ দূষিত বা রক্তসঞ্চয় সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের ছায় আক্রমণে তিনি ভিরেট্রুম ভিবিডি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিমতে বিষম জ্বরের চিকিৎসায় নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হয়; (১) কুইনাইন, আর্সেনিকম, চারনা, ইউপেটোরিয়ম, ইয়েশিয়া, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, লোবেলিয়া, অক্ট্রিম-মিউর, নক্স-ভমিকা, পলস্কেট্টা, পেস্টজ, সলফার, ভিবেট্রুম; (২) একোনাইট, ইসকিউলস, এন্টিমোনিয়ম-ক্লডম, আর্ণিক, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া, ক্যাপসিকম, কার্বো-ডেজিটেবিলিস, ক্যানোমিলা, দিনা, ফিরম, জেলসিমিনম, লেক্টাটু, ওপিয়ম, পডোফিলম, টার্টার-এমেটিক; (৩) এলিট্রিস, এপোসাইনম, ক্যাস্কে-রিস, ককিউলস, কফি, কর্ণস ফ্লোরিডা, ড্রিসিয়া, হিপার, হাইড্রাট্রিস, হাইও-নারেরীস, লাক্টিকের শোডিয়ম, মারকিউরিয়ম, মেমিরাট্রিস, মেমোরিয়ম, নক্স-ট্রেট্টা, তাবাডিল্লা, সাবুকস, সাইমেক্স, সিনিসা, টাকিসেত্রিয়া, ট্রায়োনিয়ম,

খুজা, ভেলেবিশান, (৪) ইলাটেবিশম, এম্বুইয়া, কাক্টস, চেগিডোনিয়ম, সিমিসিফুগা, আমোনিয়ম-মিউব, এনাকার্ডিয়ম, চিনাফাইলা, কুপ্রম, ডিজি-টেলিস, হেলিবোবস, কালী-কার্ক, দসকবাস, টাবাক্সিকম, ভিরেটুম-ভিরিডি ; (৫) আর্সেনিফেট-অভ-কুইনাইন, আবেবিয়া ডায়েডিয়া, আলিষ্টোনিয়া, কান্ধালা-গুয়া, সিড্রন, পলিপোদুম, ইউক্যালিপ্টস, কিউবেয়া। ইহার মধ্যে সিহোনা, সিল্কোনা-সলফেট বা কুইনাইন, আর্সেনিকম, নয়ভমিকা, ইপিকাক, নাট্রুম-মিউব, ব্রাইওনিয়া, ও ইউপেটোবিয়ম সর্বপ্রধান। এপিস, আরেগিয়া, এণ্টিমোনিয়ম ফ্রুম, কাক্টস, কান্ধালাগুয়া, ক্যাপ্সিকম, সিড্রন, সাইমেক্স, কিউবেয়া, ল্যাকেসিস, ইউক্যালিপ্টস, লোনেলিয়া, লাইকোপোডিয়ম, পল-সেটীলা, ষ্ট্রামোনিয়ম দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। অত্যাশ্রয় ঔষধগুলি কোন কোন বোগীর পক্ষে উপযোগী। বাস্তবিক বোগীর লক্ষণ সমষ্টি লিখিয়া লইয়া ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সহিত যত্র পূর্বক তুলনা করিয়া ঠিক সদৃশ ঔষধ নিকুপিত হইলে সে ঔষধ যে শ্রেণীর অন্তর্গত কেন নাহউক তাহাই সেই বোগীর পক্ষে প্রকৃত ও প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করা উচিত।

কুইনাইন দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বরের মূলকাবণ ম্যালেরিয়াব্যাসিলি নামক জীবাণু বিনষ্ট হয়। এই জন্ত কুইনাইন এই জ্বরের সর্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং জ্বরের বিবাকালে সচরাচর ইহাই প্রয়োজিত হয়। কিন্তু সকল বোগীর পক্ষে কুইনাইন উপযোগী হয় না। বাস্তবিকও বিয়ম জ্বরে নির্দিষ্টেষে কুইনাইন ব্যবহার সম-মত সঙ্গত নহে। এলোপ্যাথ্যেবাই কুইনাইন জ্বরের অনোষ ঔষধ মনে করেন এবং সকল প্রকার সবিবাক জ্বরেই উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বোগ ও বোগীর বিশেষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অনেক স্থলেই ঔষধের অপপ্রয়োগ হয়। ঔষধের অপপ্রয়োগ হইলেই অনিষ্ট ঘটে। বিষমজ্বরে সজ্বর ও বিজ্বর অবস্থার সমগ্র লক্ষণের সহিত ঔষধের সাদৃশ্য দেখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। বিবাকালে লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে অবশ্যই কুইনাইন ১৬ ক্রম বা মূল দুই তিন গ্রেণ (১ বা ১১০ রতি) মাত্রায় তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক কুইনাইনের পরিবর্তে চায়না ১৬ ব্যবহার করেন। অব সম্যক বিবত হইলেও একপক্ষ পর্য্যন্ত জ্বরের নির্দী-

দ্বিত দিনে অল্প পরিমাণে এক এক মাত্রা কুইনাইন সেবন করান কর্তব্য । কেননা ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ একেবারে অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করাইয়া সহসা জ্বর বন্ধ করিয়া থাকেন । এরূপ কবিলে প্রায়ই কিছুদিন পরে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায় । কখন কখন কুইনাইন দ্বারাও তৎকণ জ্বর আরোগ্য হয় না । কুইনাইন দ্বারা সত্ত্বর জ্বর বন্ধ না হইলে উহা সেবনে বিশেষ ফল দর্শিবাব সম্ভাবনা নাই । বরং তাহাতে অপকারই হইয়া থাকে । পুৰাতন জ্বরেও প্রায়ই কুইনাইন ব্যবহৃত হয় না । একপ অবস্থায় লক্ষণানুসারে অত্যন্ত জ্বর ঔষধই ব্যবহার করা বিহিত । জ্বরে কুইনাইন ব্যতীত আর্সেনিক, নক্সভমিকা, পলসেটিল ইগ্নেশিয়া, ইপিকাক, স্ট্রাট-মিউব, কার্বো-ভেজি, ইউপেটোরিয়ম, ব্রাইওনিয়া, ক্যাম্পিকম, সাইমেন্স, সলফাব, মানকিউরিয়স প্রভৃতি ঔষধই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

জ্বরের কোন এক অবস্থায় অভাব, জ্বালাকর উত্তাপ, দ্রুত অবসাদন; নিশ্চেষ্টতা ও দুর্বলতা, শোথ, পুষ্টিবাস্পজনিত বাত্বিকৃতি, কুইনাইন অপব্যবহার, এই সকল লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয় ; ফলতঃ জিহ্বা যতই অধিক পরিষ্কৃত থাকে, যতই শীত জ্ববেব একবার আক্রমণে বোগী অধিক অসম্ম হইয়া পড়ে এবং যতই সম্ভব এই জ্বরের প্রকৃতিসিদ্ধ পাণ্ডুবর্ণ প্রকাশ পায় ততই আর্সেনিক দ্বারা অধিক উপকার দর্শে । যদি শীতের পূর্বে উত্তাপ অথবা এক সময়েই শীতোত্তাপ থাকে, বিশেষতঃ আমাশয় ও অজ্ঞের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে নক্সভমিকা উপযোগী । হবিংপাণ্ডু (ক্লোরোসিস) ও জলীয়রক্ত লক্ষণে পলসেটিল। ফলপ্রসূ ; কিন্তু পলসেটিল। সায়ুমণ্ডলে বিশেষ কার্য্য করে না বলিয়া উহার পরে ইগ্নেশিয়া ব্যবহার্য্য । শীতাবস্থায় পিপাসা ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসার অভাব ইগ্নেশিয়ার বিশেষ লক্ষণ । জরকালীন আমাশয়িক লক্ষণ ও বমন থাকিলে ইপিকাক ব্যবহৃত হয় । অত্যন্ত শীতধিকো ভিরেট্রম-এলুম বা কার্বোভেজিটেবিলিস্ উপকারী । প্রাচীন জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বিবর্জিত হইলে এবং রোগীর মুখাকৃতি পাণ্ডু ও পীত বর্ণ মিশ্রিত থাকিলে স্ট্রাট-মিউরিয়োটিকম্ প্রয়োজ্য । ঘর্ম ও উত্তাপাবস্থা যুগপৎ উপস্থিত হইলে ক্যাম্পিকম্ ফলপ্রসূ । প্রতিদিন একই

সময়ে জ্বর প্রকাশ পাইলে সিড্রণ উপযোগী । শীতের পূর্বে পিপাসা প্রাতঃকালে শীত, জ্বকালীন পিত্তবমন, জ্বরের শেষাবস্থায় অন্ন ঘর্ম, বিশেষতঃ অস্থিবেদনা থাকিলে ইউপেটোরিয়ম্ পারফোলিয়েটম্ বিশেষ উপকারজনক । অতিশয় ঘর্মপ্রধান জ্বরে ফস্ফরিক এসিড উপযোগী । শুষ্ক-কাসাদি বক্ষোলক্ষণ সম্বলিত জ্ববে ব্রাইয়োনিয়া ও রসটক্স ; এবং ক্রিমি-লক্ষণসংগৃহ জ্বরে সিন। ব্যবস্থেয় । ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকৃতি সংশোধনে সলফার মাদারটিংচার ফলোপধায়ক । কোন কোন চিকিৎসক দীর্ঘকালস্থায়ী পুরাতন জ্বরে পলসেটিল ও সিমিসিফুগা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বিধি দেন । ডাঃ জুর বলেন যে অল্প কোন বিশেষ ঔষধ জ্ঞাপক লক্ষণ না থাকিলে তিনি প্রথমেই ইপিকাক ব্যবস্থা কবিত্তা অনেক বোগী আবেগা করিয়াছেন । অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন জনিত আবদ্ধ জ্ববেও এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । যদিও ইপিকাক দ্বাবা সকল রোগী আরোগ্যলাভ করেনা বটে, কিন্তু উহা সেবনে জ্বরের অবস্থা এ প্রকার পরিবর্তিত হইয়া উঠে যে ইপিকাকের পরে নক্সভমিক, আর্সেনিক, পলসেটিল, ইয়েশিয়া প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণান্তমারে প্রয়োগ কবিলে বোগী জব-মুক্ত হয় । অতিরিক্ত কুইনাইন বা আর্সেনিক সেবন জনিত জীর্ণজ্ববে ইপিক, কার্বো, সিড্রণ, ও সলফ মাদারটিংচার ফলপ্রদ । কুইনাইন অপব্যবহার জনিত এই প্রকার জীর্ণ-জ্বরে বা ধাতু-দুষ্টতায় পর্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও ইপিকাক উপযোগী । এবং কুইনাইন শত বা সহস্র ক্রমেও ফলপ্রদ । *

* বিধম জ্বরের চিকিৎসায় কোন কোন চিকিৎসক শীতাবস্থায় ব্রাই-ওনিয়া, দাহাবস্থায় জেলসিমিনম, ও বিরামাবস্থায় কুইনাইন বা আর্সেনিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । কেহ কেহ শীতাবস্থায় ভিরেটম ভিরিডি বা চায়না, উষ্ণাবস্থায় একোনাইট এবং বিরামকালে কুইনাইন ব্যবস্থা করেন । কেহ কেহ বা শীতাবস্থাব প্রারম্ভ হইতে ঘর্মাবস্থায় সূচনা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একোনাইট ও ব্যাপ্টিসিয়া ও বিরাম সময়ে প্রথম দিন পর্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও সিমিসিফুগা ও তৎপরবর্তী অন্ত্যান্ত দিন পর্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও নক্সভমিকা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন । আবার কেহবা প্রথম দিন একোনাইট ১ক্রম, দ্বিতীয় দিন কুইনাইন ১বা ২ ক্রম, তৃতীয়াদিন

সবিরামজ্বরে সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ

সকলের বিশেষ লক্ষণ ।

এণ্টিম-ফ্রুড ।—মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে পিপাসাসংযুক্ত শীত । পায়ের
বরফের ছায় শীতলতা ও তৎসহকায়ে শবীরের অত্যন্ত স্থানে ঘর্ষ । আমাশ-
য়িক উপদ্রব, গুত্র লেপায়িত জিহ্বা ।

এপিস-মেল ।—সুশ্পষ্ট জ্বরের আবেশ । বক্ষঃস্থলের সমুখভাগে বা
জামুতে শীতের আবস্ত, এবং চুল্লীর নিকটে বা উষ্ণস্থানে শীতের বৃদ্ধি ।
সামান্য সঞ্চলনে শীতের পুনরাবৃত্তি । শীতাবস্থায় পিপাসা । ঘর্ষাবস্থায় পিপা-
সার অভাব । অপবাক্ত তিনটাব সময় জ্বরের আগমন ।

• আরেনিয়া ডায়েডেমা ।—প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে শীতের
প্রকাশ ; অতিশয় পিপাসা সহ স্থায়ী শীত ।

আর্গিকা ।—শীতের পূর্বে জ্বন্তণ ও অধিক পিপাসা এবং অধিক জল
পান । সর্ষগরীরে অতিশয় স্পর্শ-দ্রব ; সকল অস্থির অস্থি-বেষ্টে আকুটতা
ও ব্যথিততা । মস্তক উত্তপ্ত, শবীরের অবশিষ্টাংশ, বিশেষতঃ আমাশয়-
গহ্বর শীতল ।

আর্মোনিকম ।—শীত ও দাহাবস্থাব প্রাবল্য, স্নগ্ন ঘর্ষ বা ঘর্ষাভাব ।
ঘর্ষকালে রোগ-লক্ষণের অল্পপশন, ও অতিশয় পিপাসা সহকারে বিষমিবা
এবং জলপানান্তে আমাশয়ে বেদনা । ফুইনাইন অপব্যবহারের পববর্তী জ্বর ।

আর্মোনিক ও ক্রম ; প্রত্যহ দুই হইতে চারিমাত্রা ব্যবস্থা করেন । জ্বর
খামিলে আর ঔষধ দেন না । জ্বর ফিরিলে পুনরায় এইরূপ চিকিৎসাই
করিয়া থাকেন । কিন্তু এই প্রকার চিকিৎসা প্রকৃষ্ট সম-মত সঙ্গত কিনা
তাহা স্থির করিতে পারা যায় না । হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এলোপ্যাথি
চিকিৎসার ছায় কোন ধরাবাধা ব্যবস্থায় ঔষধ প্রয়োজিত হইতে পারে না ।
রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণের ঠিক সাদৃশ্য দেখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা
করিতে হয় ।

বেলেডোনা ।—প্রবল শিরঃপীড়া । একবার শীত, একবার উত্তাপ ।
বারংবার মূত্রতাগ ।

ব্রাইওনিয়া ।—শীতের প্রাধান্য । জ্বরের আবেশের পূর্বে তীব্র
শিরঃপীড়া, উত্তাপাবস্থায় উহার আদিক্য । বক্ষঃস্থলে হৃদী-স্বেদবৎ বেদনা ।
ব্যথিত পার্শ্ব শয়নকালে উপশম অনুভব । আশাশয়িক লক্ষণ ।

ক্যাক্টস ।—ঠিক পূর্নাঙ্ক এগারটা ও অপবাক্স এগারটার সমন্বয় নিয়মিত
রূপে জ্বরের আবেশ । মূত্র-বোধ । পৃষ্ঠে শীতলতা ও শীতল হস্ত ।

ক্যালেকেরিয়া কার্নি ।—শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা । তুষাববৎ
শীতল হস্ত সহকায়ে মুখমণ্ডলের উত্তাপ । জ্বরের আবেশের পূর্বে সমস্ত
সন্ধিতে অক্লিষ্টতা, এবং মস্তক ও সর্দশবীদেয় গুরুত্ব । শীতবাক্সে ও অর্ধ
স্থলে যাহারা অধিক কাজ করে তাহাদের জ্বর । গণ্ডমালা ধাতু ।

ক্যাঙ্কালিগুয়া ।—বসন্তকালেব জ্বর । অতি তীব্র শীত । রক্তকেব
হস্তের স্থায় ক্লিষ্ট হস্ত ; মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, ও হস্তের অতিশয় পাণ্ডুবতা ।
পৃষ্ঠবংশেব নিম্নে ও সর্দহ, বিশেষতঃ রাত্রিতে শয্যায় শবিত অবস্থার পুনঃ
পুনঃ শীত ।

ক্যাম্পিকম ।—তীব্র পিপাসা সহকায়ে শীত । শীতাবস্থায় প্রীহার
বেদনা বিশিষ্ট বিবৃদ্ধি । শীতাবস্থায় পৃষ্ঠে উত্তপ্ত বস্ত্র প্রয়োগে উপশম ।

কার্বো-ভেজিটেবিলিস ।—জ্বরের পদে ও শিরঃপীড়ার অবস্থিতি ।
পুরাতন জ্বর ; জ্বরের অনিয়মিত আবেশ । আধ্বান ।

সিড্রন ।—বহির স্থায় ঠিক নিয়মিত সময়ে জ্বরের আবেশ ।

ক্যামোমিল ।—দক্ষাফরে প্রচাপ, ও পিত্ত-বমন ।

চায়না ।—পশ্চাদ্ভী বা অগ্রভী ; অনেক ফণস্থায়ী জ্বরের আবেশ ।
হর্ষলকব প্রভূত ঘর্ষ । শীত ও দাহাবস্থার মধ্যে পিপাসা এবং পুনরাব
যম্যাবস্থায় পিপাসা । বিরামকালে অতিশয় হর্ষলতা ।

চিনি-সলফ বা কুইনাইন ।—প্রতিবার প্রায় দুইঘণ্টা আশুয়াইয়া
জ্বরের আক্রমণ । সুস্পষ্ট বিরাম ।

সিনা ।—জ্বরের সমগ্র আবেশ সময়ে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ । কুক্করবৎ
ঘন ঘন ক্ধা সহকায়ে বমন । শীতল ঘর্ষ ।

সবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত ঔষধের বিশেষ লক্ষণ । ১৭

ইউপেটোরিয়ম-পার্কো।—অনম্পূর্ণ বিরাম। শীতের পূর্বে পিপাসা। অস্থি-বেদনা।

ইপেটোরিয়ম-পার্প।—দিবসেব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জ্বরের আবেশ, একদিন পর একদিন অব।

ফেরুম।—জ্বর কালে চক্ষের চারিদিকে ক্ষীততা; নীরঙ্কতা।

জেলসিনিয়ম।—আমায়ী লক্ষণের প্রাধান্য; আমায়ী ও যকৃতের উপজ্বরের সম্যক অবস্থামানতা।

ইগ্নেশিয়া।—শীতাবস্থায় পিপাসা, দাহাবস্থায় পিপাসাব অবিদ্যমানতা। উত্তপাবস্থায় পায়েব শীতলতা। জ্বরের অগ্রবর্তী আবেশ।

ইপিকা।—কুইনাইন অপব্যবহারের পনবর্তী অব। শীতের পূর্বে প্রবল বমনচেষ্টা। আমায়ীক লক্ষণের প্রাবল্য।

ল্যাকেসিস।—অন্তবে শীত, বাহিরে তাপ। অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে জ্বরের আক্রমণ।

লাইকোপোডিয়ম।—শীতের পবেই ঘর্ম, অন্তর্কর্তী দাহাবস্থার অভাব। অপরাহ্ন চাষিটা হইতে আটটাব মধ্যে জ্বরের আক্রমণ।

মারকিউরিয়স।—উগ্র দুর্গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম। রাত্রে শয়িত অবস্থায় জ্বরের আক্রমণ।

ম্যাট্রিম-মিউরিয়েটিকম।—কুইনাইন অপব্যবহারের পর উত্তাপাবস্থায় তীব্র শিরঃপীড়া। সর্লশবীরে, বিশেষতঃ শীতাবস্থায় বেদনা। পদতলে ও কক্ষ-তলে প্রভূত ঘর্ম। পূর্বাহ্নে (দশটার সময়) জ্বরের আক্রমণ, কখন কখন আঙুরাইয়া আঙুরাইয়া জ্বরের প্রকাশ।

নক্স-ভমিক।—শীত ও উত্তাপ বিমিশ্রিত, শীত উত্তাপের একটী আভ্যন্তরিক, অপরটী বাহ্যিক অথবা উভয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত; বিষার মদিয়া পানের আকাঙ্ক্ষা, যকৃত-শিরায় বক্ত-সঞ্চয়। বিরামকালে আমায়ীক লক্ষণ। স্তম্ভপারী শিশুদিগের সবিরাম জ্বর।

পলমেটিকা।—অবিরত শীত, শীত অস্থভব, বিরামকালেও শীতানুভব এবং জ্বরের আক্রমণকালে পিপাসাব অভাব, অথবা কেবল উত্তাপাবস্থায়

শিপিাস। জ্বীদিগের রক্ত-হীনতা। অপবাছে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের আক্রমণ।
উত্তাপাবস্থায় গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীতানুভব।

শ্রামুকস।—শস্যায় বাইয়া শুইবার পূর্বে কম্পকর শীত। ঘর্ম্মশূন্য
উত্তাপ, গাত্রবস্ত্র তুলিয়া ফেলিতে অনিচ্ছা। অতিশয় অধিক পরিমাণ, অবসন্ন-
কর ঘর্ম্ম, বিরামকালেও ঘর্ম্ম বিদ্যমান থাকে।

সিলিশিয়া।—গণ্ডমালা ধাতু-দ্রষ্ট বালকদিগেব জ্বব; সর্কশরীরের
জ্বালকর উত্তাপ; আরক্ত ও ক্ষীত মুখগুলা, প্রতিনিয়ত উদবাসয় সহ উদ-
য়ের ক্ষীততা। জ্ববের বিরামকালে শিশুদিগের অতিশয় খিটখিটে স্বভাব,
স্পর্শ করিলে বা কিছু বলিলে ক্রন্দন।

ভিরেট্রম এলুম।—শীত ও শীতাবস্থায় শীতল পানীর দ্রব্য সেব-
নের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। শীতল আঠাআঠা ঘর্ম্ম।

ভিরেট্রম-ভিরিডি।—উত্তাপাবস্থায় প্রাবল্যে ও বস্ত্রবহানাড়ী মণ্ড-
লার প্রবল উত্তেজনায় উত্তাপাবস্থায় ব্যবহাব করা বাইতে পারে।

—*—

বিষম জ্বরের উপসর্গ।

প্লীহা।—বিষম অবস্থায় শীতাবস্থায় প্লীহায় বক্তসঞ্চয় হইয়া উহার
বিধানতন্ত্র গুলি প্রদাহিত হইতে থাকে, স্তব্ধতা ক্রমে ক্রমে প্লীহা অতিশয়
বিবর্তিত হইয়া পড়ে, তখন আব সহজে উহা সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক আয়-
তন প্রাপ্ত হয় না। প্লীহায় রক্তসঞ্চয় হইলে পঞ্জবাস্তির নিম্নভাগে বাম কুক্ষিতে
চাপ দিলে বেদনা অসহ্য হইয়া এবং অঙ্গুলী দ্বারা প্লীহা স্পর্শ করিলে উহার
বিবর্তিত অবস্থা বুঝা যায়। কখন কখন বেদনা দি বাতীত ও প্লীহা বর্দ্ধিত হয়।
প্লীহা রোগাক্রান্ত হইলে বক্তের লোহিত কণা নূন হয়, স্তব্ধতা রোগীর বর্ণ
পাণ্ডুর অর্থাৎ ফেকাসে হইয়া উঠে। কখন কখন অকস্মাৎ বিবর্তিত প্লীহা
বিদীর্ণ হইয়া ভূত্ব হয়। চিকিৎসা।—বিবর্তিত প্লীহায়—মার্ক বিনি-
রোড, বেবেবিস্ ভল্গেবিস্, ইয়েসিয়া, ক্যাপসিকম, চায়না, আর্সেনিক, ফেরুম,
এগোবিস. মার্নাব উবিস. ভ্রাট মিউব, কালী ব্রোস, স্পিগিয়া ২, মেরিসাইট্রিট

অব্ কুইনাইন এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিনবার, সিয়েনোথস্ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয় এবং বিন্‌আইয়োডাইড্ অব্ মার্কুরিব্ মলম বা জলপটী বাহ্য প্রয়োগ করা যায়। প্লীহা বেদনায়—একোনাইট, আর্ণিকা, ও ব্রাইয়োনিয়া ; এবং প্লীহা হইতে রক্তস্রাবে—একন, আর্ণ, আর্স চায়না ব্যবহৃত হয়।

যকৃৎ ।—বিষমজ্বরে পুনঃ পুনঃ শীতাবস্থার প্রকাশ বশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রে অবলম্বনে রক্ত ধাবিত হয়। উদরের দক্ষিণ দিকে যকৃৎ (মেটে) নামক যে যন্ত্র আছে তাহাতে ঐ রক্তসঞ্চিত হইলে উহা প্রসারিত ও বর্ধিত হইয়া উঠে। রক্তসঞ্চয় বশতঃ কখন কখন যকৃতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। লেপার্ত জিহ্বা, প্রাতে মুখের বিরসতা, ক্ষুধাবলক্ষণা, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ-রোধ, বমনোচ্ছা, দক্ষিণ কুক্ষিদেখে পূর্ণতা ও ভাব অস্বভাব, আলস্ত ও বিমর্ষতা এবং সময়ে সময়ে দক্ষিণ দিকে বেদনা যকৃতে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ। যকৃতে প্রদাহ জন্মিলে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণগুলি তীব্রতর হয়। অপিচ, যকৃতে বেদনা জন্মে এবং অঙ্গুলী দ্বারা যকৃৎ নিপীড়ন, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কিংবা কাসিলে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যকৃৎ-প্রদাহের সহিত কখন কখন জ্বর থাকে, কখন কখন থাকে না। চিকিৎসা ।—যকৃৎ-প্রদাহে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহৃত হয়,—একন (জ্বর) ; ব্রাই ও মার্ক পর্যায়ক্রমে (জ্বর হ্রাস পড়িলে) ; হিপার (যকৃতে ত্রণ উৎপত্তি হইবার আশঙ্কা জন্মিলে) ; কোনা, ফস, নক্স ভ, ক্যাম ; উষ্ণশ্বেদ। যকৃৎ-বিসর্জন—গডোফিলম্, লেপ্টাণ্ডা, ইসকিউলাস্, ফস, মার্ক, এসিড্-নাইট্, এগার, হাইড্রাস, আর্স, চায়না ফলপ্রদ। ডাঃ জোসেফ বলেন যে ম্যালেরিয়া জ্বরের পৰ্য্যন্ত যকৃতের পুরাতন রক্তসঞ্চয়ে তাইপারা বিশেষ উপযোগী। যকৃৎশূলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহৃত হয়—একন (তীব্র বেদনা) ; ব্রাই (জ্বালকর, অথবা আকৃষ্ট বা হলবোধবৎ বেদনা, বাতপ্রসূ ব্যক্তিদেগের) ; মার্ক (অতীব বেদনা) ; স্ত্রাবাদ (টাচিয়া লওয়ার স্থায় অস্বভাব)। যকৃৎ-রোগবশতঃ উদরী বা উদরশোথে—আর্স, ক্রোট-টিগ, এপোসাই, এপিস, এসিড্-নাইট্, নক্স-ভম সেবন ও উদরে জলপটী বন্ধন উপযোগী।

শোথ ।—কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া সন্ধ্যাক প্রকারে

নিম্ন না হইতে পারিলে শিরায় রক্ত-সঞ্চয় হয় এবং উহাব কৈশিকাগুলির আচুষণ-শক্তির হ্রাস বা অভাব হইয়া পড়ে স্নতবাং রক্তের জলিয়াংশ ঐ সকল কৈশিকার প্রাচীরের অভ্যন্তর দিয়া বহির্গত ও বহির্ভাগে সঞ্চিত হয়। ইহা-কেই শোথ বলে। বিষমজ্বরে প্লীহা ও যকৃতের পীড়া জন্ম শোথ জন্মে। এই শোথ প্রথমতঃ নিম্নোদবে উৎপন্ন হয়। হৃদ্রোগ বশতঃ শোথ জন্মিলে প্রথমে হস্তপদে প্রকাশ পায়, অনন্তর ক্রমে ক্রমে সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।—সর্ববাস্তব শোথ।—একন, টেরেব (জ্বরজনিত তরুণ শোথ); আর্স, ইলেকট, এপিস, হেলি, চায়না, এপোসাই; ডিজি (হৃদ্রোগ-জনিত)। **একান্তীন শোথ—**এপোসাই, আর্স, এপিস (উদরেব), আর্স এপিস (উদরেব); আর্স, ব্রাই, ডিজি, হেলি (বক্ষঃস্থলের); আর্স, এপিস, ফির, সলবকুটনা, চায়না (হস্তপদের); এপিস, আর্স (মুখমণ্ডলের); হোল এপোসাই, বেল সলফ, কাক-কার্ক, মিলি (মস্তকের); একন, আইয়োড, পলস, ব্রাই (মস্তিষ্ক); আইয়োড, বোড, অবম, গ্রাফ (অণ্ডকোষের)।

দুর্বলতা।—ফসফরিক এসিড, ক্যালকেরিয়া, সলফা, ফেবম।

বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ।—শীত ও বর্ষাকালে সময়ে সময়ে বিষমজ্বর সহকারে বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ দৃষ্ট হয়। এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে ব্রাই, এণ্ট-টাইট, ইপিকাক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা কবা যায়। স্বল্পবিরামজ্বর দ্রষ্টব্য।

পথ্যাপথ্য।—জ্বর পুরাতন হইলে জ্বরের দিন অল্প পরিমাণে লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ আবারুট, সাগু বা অন্নগুণাদি আহাব কবা উচিত। বিরামের দিন মাগুবাদি স্নমৎশ্রেণ বোল, স্নজিব রুটি অল্প পরিমাণে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ ব্যবহেয়। তরুণ অবস্থার সামান্য জ্বরের স্থায় পথ্য প্রদান করা উচিত। এই জ্বরে স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন কবা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি নিতান্ত জ্বর-পীড়িত প্রদেশে বাস কবিতো হয় তবে সন্ধ্যাকালে বা প্রাত্যহে শুল্লোদরে গৃহেব বাহিবে যাওয়া উচিত নহে। প্রাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া বাহির হওয়া ভাল। খট্টাদি উচ্চ শয্যায় অথবা গৃহেব উপরিতলে শয়ন করা বিহিত। দিব্যভাগে গৃহে বায়ু ও সূর্যালোক প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু নিশাবায়ু প্রতিরুদ্ধ করা সর্বতোভাবে উচিত। জ্বর-ঋতুতে ক্লাস্তি, অতিভোজন এবং বায়ুপ্রবাহে অবিকল উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান

থাকা নিষিদ্ধ। পুরুষদিগের পক্ষে শয্যাধারণ উপকারজনক। গলদেশ বজ্রাবৃত্ত রাখিলেও হইতে পারে। পুতিবাম্প-প্রধান স্থানে বাসিকালীন মুখরুদ্ধ করিয়া কেবল নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ ফলপ্রদ। *

প্রাতে ও বাস্তিতে এক এক মাত্রা চায়না সেবন বিষমজ্বরের প্রতিষেধক।

ঔষধ সকলের বিস্তারিত লক্ষণ পুস্তকেব শেষভাগে ও মৎকৃত ভৈষজ্যতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

—*—

(২) প্রচ্ছন্ন জ্বর, ছদ্মজ্বর—ম্যাস্কড ম্যালেরিয়স ফিভার।

শরীরে অল্প পরিমাণ পুতিবাম্প প্রবেশ কবিলে ক্ষীণ ও উপদাহ-প্রবণ ধাতুতে ক্ষীণ জ্বর উৎপন্ন হয়, ইহাকেই প্রচ্ছন্ন জ্বর বলে। এই জ্বর সবিরাম ও স্নগ্ধবিরাম উভয় প্রকারই হইয়া থাকে এবং প্রায়ই শীতাদ রোগেব সহিত সংসৃষ্ট দৃষ্ট হয়।

এই রোগাক্রান্ত হইলে উত্তাপ, কক্ষতা, করতল জ্বালা, কখন কখন পদ-তল দাহ, সময়ে সময়ে কর্ণনাদ, সর্কাস্পীন ঘনি, অল্প অল্প শিরঃপীড়া এবং অগ্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাড়ী উত্তেজিত হয় না, করতল ভিন্ন অল্প কোথাও স্পর্শ করিলে গাত্র উত্তপ্ত বোধ হয় না, কিন্তু তাপমান দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে গাত্রতাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। ক্ষুধার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা বটে, কিন্তু হ্রস্ব হয় না। করতল-জ্বালা প্রায়ই সমভাবে থাকে তবে একটু একটু বিরাম পড়ে; তখন হস্তস্বয় কিঞ্চিৎ অর্দ্র হয়; অথবা কবতল-জ্বালার সন্ধ্যা বিরতি জন্মে। এই অবস্থা মাসাবধি বা বৎসরাবধি একগুণ সামান্যভাবে বিদ্যমান থাকে যে রোগীর তৎ-প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ জন্মে না। কিন্তু কোন কোন রোগীর পক্ষে

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে চন্দ্রাব আকর্ষণের সহিত ম্যালেরিয়ার সন্ধান আছে। অতএব ম্যালেরিয়া জ্বগ্ৰস্ত ব্যক্তিদিগের কোন কোন তিথিতে অর্থাৎ পক্ষমী, দশমী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমার অব্যবহিত পূর্বে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যিক। সে সময় সর্দি না লাগান, লঘু আহার গ্রহণ ও এক টাই মাত্রা জ্বর ঔষধ সেবন বিহিত।

ইহা অসুখ জনক ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। যে সকল ব্যক্তিদিগের এই প্রচ্ছন্ন জ্বর হয় তাহাদেব বড় একটা স্পষ্ট জ্বর হয় না কিন্তু গীহা পীড়িত ও বিবন্ধিত হইয়া থাকে। অপিচ, হ্রস্বলতা, রক্তস্রবতা, বিবর্ণতা, উদরাময়, অপ্রকৃষ্টতা, পামা, অর্জাণ, হৃৎকম্প প্রভৃতি জন্মে। ইহাকেই পুতিবাম্পজ খাটুবিরতি কহে।

চিকিৎসা।—একগ্রেণ কুইনাইন চারি আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া এক ড্রাম মাত্রায় ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর অথবা কুইনাইন ১৮ ক্রম বা মূল এক দুই ডেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিলেই প্রচ্ছন্ন জ্বর আরোগ্য হয়। কখন কখন লক্ষণানুসাবে নক্স-ভমিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, সিগি-সিফুগা, ইপিকাক, সল্ফার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যিক হয়।



দূষিত বিষমজ্বর —পারিসম্ ইণ্টার- মিটেণ্ট ফিভার।

এক প্রকার উৎকট আকারের বিষম জ্বরকে দূষিত বিষমজ্বর বা সাধারণতঃ রক্ত সঞ্চয় জনিত শীত-প্রধান জ্বর বলে। এই জ্বরে সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বব অপেক্ষা অতিশয় তীব্রতা ও সাংঘাতিকতা বিদ্যমান থাকে। উষ্ণপ্রধান দেশে ও নিম্ন অনুপ প্রদেশেই ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। রোগীর হ্রস্বলতা ও প্রতিক্রিয়াকারিণী শক্তির অভাব বশতঃ পর্যায় জ্বরের শীতাবস্থা অতিশয় উগ্র ও দীর্ঘ হইয়াই দূষিত বিষম জ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ ।—এই জ্বরে সাধারণতঃ সামান্য বিষম জ্বরের ত্রায় পূর্বে লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐক্যাহিক বা তৃতীয়ক জ্বরের আবেশের ন্যায় দুই একবার জ্বরের আবেশ উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্বরের বিরাম কালে রোগীর অপেক্ষাকৃত অধিক অবসন্নতা, হ্রস্বলতা ও অস্থিরতা দেখা যায়। অনন্তর অতিশয় অবসন্নতা ও গাত্র-শোরব বিশিষ্ট দীর্ঘকাল ব্যাপী শীত উপস্থিত হইয়া প্রকৃত দূষিত বিষম জ্বর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন চর্ম পাণ্ডুর ও স্ফীত;

মুখাকৃতি হ্রস্ব ও সঙ্কুচিত ; ওষ্ঠ ও নাসিকা নীলিম ; জিহ্বা পাণ্ডুব ও লো-
লিত ; দেহশাখা শীতল, স্পর্শজ্ঞান পরিশূন্য, ও নীলাত ; নাড়ী ক্ষীণ ; বিষম,
ও ক্রান্ত ; এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয় । সাধারণতঃ কম্প থাকেনা, কিন্তু
অতিশয় পিপাসা থাকে ; রোগীর অস্থিরতা ; আকুলতা, বক্ষ-গৌরব, ও
খাসকষ্ট জন্মে ; গাত্ররক ক্রমে ক্রমে অধিকতর শীতল হইয়া পড়ে এবং আঠা
আঠা ঘর্ষে আবৃত হয় ; কাহার কাহার দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কালিমা
অর্থাৎ কালশিরা প্রকাশ পায় । কোন কোন রোগীর সাংঘাতিক বিমূঢ়িকার
স্তায় লক্ষণ উপস্থিত হয় । বাবংবার বমন ও তণ্ডুলাবৃত্ত বিনেচন হইতে থাকে
এবং বোগীকে সম্ভব অবসন্ন করিয়া ফেলে । যদি প্রতিক্রিয়া না জন্মে তবে
অবসন্নতা বাড়িতে থাকে, নাড়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবশেষে স্পন্দনশূন্য হইয়া
রোগীর মৃত্যু হয় । অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাহাব চৈতন্য থাকে । অধিকাংশ
রোগীরই এক প্রকাব মোহ বা তন্দ্রা-দোষ জন্মে এবং মৃত্যুর কতিপয় ঘটিকা
পূর্বে পর্য্যন্ত সেই মোহ বিদ্যমান থাকে । কাহার কাহার প্রলাপও জন্মে ।
রোগী আরোগ্য হইবার হইলে ক্রমে ক্রমে অশুভ লক্ষণ গুলি উপশান্ত হয় ।
তাহার গাত্র উষ্ণ, শীতল ঘর্ষ স্বগিত ; নাড়া ক্রমশঃ সবল ও নিয়মিত এবং
অত্যন্ত অবসন্নতা দূরীকৃত হয় । স্নেহ একটু একটু শক্তির পুনরাগমন অনুভব
কবে ও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে ।

প্রকার-ভেদ ।—দূষিত ম্যালেরিয়া অব ছয়প্রকার ; যথা, (১) মোহ
প্রধান, (২) প্রলাপ-প্রধান, (৩) অতিশয়-প্রধান ; (৪) শীতলতা-প্রধান ;
(৫) শ্বেদ-প্রধান ; (৬) পাণ্ডু-প্রধান । ইহার মধ্যে প্রলাপ-প্রধান ও পাণ্ডু-
প্রধান অপেক্ষাকৃত বিরল ।

কারণ ।—সবিরাম জ্বর ও স্বল্প বিবাম অববাব কাবণেব ন্যায় এই
জ্বরের কারণও ম্যালেরিয়া বা পুতি বাস্প । কিন্তু ইহাতে গৃহীত ম্যালেরিয়ার
আধিক্য বা প্রাবল্য থাকে ।

বিনির্ণয় ।—সামান্য সবিরাম জ্বর অপেক্ষা দূষিত বিষম জ্বরের লক্ষণ
তীব্রতর ও সর্বাস্থীন দুর্বলতা প্রবলতর । সংন্যাসের মোহ ও একাঙ্গীন
পক্ষাঘাত, জ্বর ব্যতীত হঠাৎ উপস্থিত হয়, দূষিত জ্বরের মোহ ও পক্ষাঘাত
জ্বর সহকারে উৎপন্ন হয় । মিনিঞ্জাইটিস রোগের মোহ প্রলাপাবস্থা হইতে

কয়েক দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, দূষিত জ্বরের যোহ, দুই এক দিবসের মধ্যেই প্রকাশ পায়। দূষিত জ্বরে রক্তে একপ্রকারে বর্ণক পদার্থ; প্রস্রাবে এষুমেনেব অভাব, মল প্রথম দুই একবার রক্ত মিশ্রিত ও অপ্রচুর থাকে; ওলাউটায় রক্তে বর্ণক পদার্থের অভাব, মূত্রে এষুমেন ও মল প্রচুর থাকে।

প্রস্তান।—এই জ্বরের ভাবীফল সঙ্কটজনক। জ্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় আক্রমণে বোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, তৃতীয় আক্রমণে প্রায়ই বাঁচে না। সম্বর প্রতিক্রিয়া, স্বকের উষ্ণতা ও স্বাভাবিক বর্ণ; পূর্ণ ও নিয়মিত নাড়ী শুভ লক্ষণ। অসম্যক প্রতিক্রিয়া, ক্ষীণ ও বিষম নাড়ী, ও অবসন্নতাস্থ-ভব অশুভ লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় আক্রমণের অতিশয় আশঙ্কা থাকে। প্রথমাক্রমণে বোগীর জীবন সমগ্রিক সঙ্কটাপন্ন হইলে বিত্তীয়াক্রমণে সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু হয়। অতএব আক্রমণ কালে যেমন সাবধান থাকা আবশ্যক, অল্প আক্রমণ প্রতিষেধে ও তদ্রূপ বিশেষ যত্ন-শীল হওয়া উচিত।

চিকিৎসা।—এই জ্বরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতঃপর দ্বিতীয় বা তৃতীয় আক্রমণ সময়ে সাবধানে উত্তেজক পদার্থ ব্যবহার করিলে উপকার দর্শিতে পারে। প্রতিক্রিয়া উদ্দীপনার্থ বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে উপকার দর্শে। উষ্ণ বালুকা বা লবণের পুতলি প্রয়োগ ফলপ্রসূ। অঙ্গদর্ষণ ও উপকাৰী। এই বোগে প্রধানতঃ আর্সেনিকম, ক্যাম্ফর, ভিরেট্রম ও কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ।

আর্সেনিকম।—শরীরের তুষাবৎ শীতলতা; শীতল ঘর্ষ; ওষ্ঠ ও অঙ্গুলীর নীলাভা, অতিশয় উৎকর্ষ ও অস্থিরতা; দুর্বলতা ও অবসন্নতা, ক্ষীণ ও অনিয়মিত নাড়ী; ও অত্যন্ত পিপাসা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, তৎপরে দীর্ঘ ব্যবধান কালের পর ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ক্যাম্ফর।—অত্যন্ত অবসন্নতা, দুর্বল, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী, গাত্রে আঠা আঠা ঘর্ষ; তন্দ্রাদোষের প্রবণতা লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োজ্য।

ভিবেট্রন ।—আমিয়িক বিহচিকার ছায় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভিবেট্রন এরম ব্যবস্থের। গাত্র ববকের ছায় শীতল, অথচ রোগী শীতলুভক করে না। কিন্তু অনাবৃত থাকিতে ভালবাসে, শীতল ঘর্ষসিক্ত আকৃষ্ট গাত্রস্থক ; স্বস্তি ; কুঞ্চিত মুখাকৃতি, পাতলা তবল পদার্থ বমন, অস্ত্র হইতে তপ্পলাশ্রুৎ বিবেচন ; ক্ষুদ্র ও হৃদয়ৎ নাড়ী, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগের ছায় শ্বাস, এই সমস্ত লক্ষণে ভিবেট্রন তৃতীয় দশমিকক্রম প্রতিক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট অন্তর এক একবার ব্যবস্থেব।

কুইনাইন ।—বিবানকালে কুইনাইন প্রথম দশমিকক্রমের বিচূর্ণ হই প্রেণ নাত্রায় এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য। কোন কোন চিকিৎসক পুনরায় অবাক্রমণ প্রতিষেধার্থে এই জ্বর প্রথম হইতেই কুইনাইন অধস্তাচ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অন্তর্কর্ত্তী ঔষধ স্বরূপ (১) নোহ-প্রধান দূষিত জবে, ওপিয়ম বা রসটম্ব ; (২) প্রলাপ-প্রধান জবে, হাইওসেরমাস বা বেলেডোনা ; (৩) অতিসাব-প্রধান জবে, আর্সেনিকন, ভিবেট্রন, পডোফিলম, (৪) হিমাপ্র-প্রধান জবে, ক্যাম্পন ; ক্যাম্পোতেজি, ভিবেট্রন, (৫) ঘর্ম-প্রধান জবে, চাবনা, জাবরাণ্ডি, ফসফরাস ; (৬) পাণ্ডুপ্রধান জবে, মোটেলস, ইউপেটোবিয়ম পার্কো, ব্রাইওনিয়া, প্রভৃতি ঔষধ ও লক্ষণানুসারে আবেশ্যকীয় হইতে পাবে।

(৩) শল্লবিরামজ্বর ।* রিমিটেণ্ট ফিভার ।

এই জ্বরকে ইংবেজি চিকিৎসা গ্রন্থে টেবাইফিগাব, জঙ্গল কিবার, বেঙ্গাল কিবার ইত্যাদিও বলে। এই সকল জবেব লক্ষণ সামান্যতঃ একই প্রকার। স্থানভেদে কেবল নামভেদ হইয়া থাকে।

* শল্লবিরাম জব আনুপেদোক্ত বাতজ্বর ও পিত্তজ্বের সহিত ঐক্য হয়।

এক্ষণে বিদ্যুৎ বাতজ্বর ও পিত্তজ্বর বড় দৃষ্ট হয় না, প্রায়ই দ্বন্দ্বজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা এক প্রকার অসংক্রামকজ্বর, অনিয়মিতরূপে ইহার প্রকোপ ও লাঘব জন্মে। দীর্ঘকাল স্থায়ী উষ্ণাবস্থাকেই ইহার প্রকোপকাল বলে। এই জ্বরের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিবর্তন পায় না, কেবল কতকটা হ্রাস পড়ে। এই জন্য ইহাকে স্বল্পবিবর্তনজ্বর বলে। ইহাতে তীব্র শিবেপীড়া, যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য এবং সচবাচর অনেক পীতবর্ণ বিদ্যমান থাকে। স্বল্পবিবর্তনজ্বরে সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাকে টাইফো-ম্যালেরিয়াগ ফিভার বা সন্নিপাত লক্ষণাগ্ন স্বল্পবিবর্তনজ্বর বলে।

লক্ষণ।—কখন কখন এই রোগ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাধারণতঃ প্রথমে এক দুই দিন চুলগতা, অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ ও সর্কাস্ট্রীন মানি প্রভৃতি পূর্বলক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তৎপরে শীত, কম্প, শিরোবেদনা, অক্ষিগোলক-বেদনা, শুষ্ণ ও অল্পবেদনা, নিবমিষা, পিত্তবমন অথবা বিরেচন, আমাশয়-গল্বে চাপ, অস্বচ্ছন্দতা বা বেদনা অত্যুৎপন্ন, মলারূত জিহ্বা, কৃষ্ণ ও উত্তপ্ত ত্বক এবং প্রভাশূন্য চক্ষু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাকেই স্বল্প-বিবর্তনজ্বরের প্রথমাবস্থা বা শীতাবস্থা বলে। এই শীতাবস্থার বোগী যদিও শীত অস্বভব কবে বটে, তথাপি তাপমান দ্বারা গাত্র-তাপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহা স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

স্বল্পবিবর্তনজ্বরের এই প্রথম অবস্থা কেবল অল্পক্ষণ থাকে এবং প্রায়ই কয়েকবার অবাক্রমণের পরে স্পষ্টরূপে জানা যাব না। অনন্তর দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অবস্থা বা দাহাবস্থার ভোগকাল প্রায় ৮ ঘটিকা। এই অবস্থায় নাড়ীব দ্রুততা, নিশ্বাসের গুরুতা, অত্যন্ত অস্থিহতা, ও ত্বকের উত্তপ্ততাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শরীর-তাপ ১০৩ অংশ হইতে ১০৬° অংশ, নাড়ীর স্পন্দন ১০০ প্রতি ১১০ বা ১১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে। মুখমণ্ডল আবদ্ধ, চক্ষু বদ্ধবর্ণ, অস্বচ্ছ আলো বা প্রলাপ থাকে এবং কখন কখন সহসা বা ক্রমশঃ সর্কাস্ট্রীন পীতবর্ণ হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে আমাশয়ের অত্যন্ত উগ্রতা, হিকা ও দুন্দ্য বমন উপস্থিত হয়। মূত্র আরক্ত ও স্বল্প এবং মল সাধারণতঃ অলক্ষ্য থাকে, কাহার কাহার বা প্রভূত গলবৎ অতিসার জন্মে। এই অবস্থা দুই প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় অথবা রাত্রি দুই প্রহরের সময় আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকালে মরণপ্রাপ্ত

হয় । এই মধ্যাবস্থাকেই ইহার স্বল্পবিবামকাল বা তৃতীয় অবস্থা বলে । ষষ্ঠ বা ষাটশ ঘণ্টা জ্বর ভোগেব পবে এই বিবামকাল উপস্থিত হয় । ঘর্ম, উত্তাপের ন্যূনতা, নাড়ীর কোমলতা এবং কখন কখন নিদ্রা, জ্বর-বিবামের লক্ষণ । এই জ্ববে বিবামকালে বোগেব লক্ষণ সকল অতি অল্প মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিষম জ্ববের স্তায় সম্পূর্ণ তিবোহিত হয় না । সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বিরামকাল উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি কবে । বোগ উৎকট আকারের হইলে, বিবামকাল নির্ণয় করা সহজ নহে, কিন্তু সতকভাবে উহার আবির্ভাব নিবীক্ষণ করা কর্তব্য । বিষমজ্বব ও স্বল্পবিবামজ্ববে প্রভেদ এই যে, বিষমজ্ববে জ্ববের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয় এবং বিবামকালে বোগ লক্ষণ সকল সম্যক প্রকারে বিলুপ্ত থাকে, কিন্তু স্বল্পবিবামজ্ববে জ্ববের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়না, এবং জ্বব-লক্ষণ গুলিও একেবারে তিবোহিত হয় না, কেবল কথঞ্চিৎ হ্রাস পড়ে । টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্ববে একেবারেই বোগ লক্ষণেব এপ্রকার হ্রাস জন্মে না, অগ্নিচ, মলিন কাপশ জিহ্বা, দস্তে দস্ত-শর্কবা, আঁখ্যান, পীতবর্ণ অতিসাব, মূত্র প্রলাপ, কণ্ডু-স্পন্দন বা বধিবতানি অতি-বিস্ত্র লক্ষণ থাকে । স্বল্পবিবামজ্ববে সন্নিপাত জ্ববের এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্বল্পবিবামজ্বব সন্নিপাত জ্ববে পরিণত হয় ।

স্বল্প বিবাম জ্ববের এক এক আক্রমণ গড়ে ২৪ ঘণ্টা থাকে কিন্তু প্রথম আক্রমণ অপেক্ষা পরবর্তী আক্রমণ গুলি আবণ্ড অধিক কাল অবস্থিতি কবে । এই রোগ প্রায় ৭।১৪।২১ দিবস ঠিকস্বত্বদপেক্ষা অধিক দিন থাকিবা বোগী আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হয় । সচরাচর অষ্টাহেব মধ্যে মৃত্যু হয় না । বক্তেব জীবনী শক্তির বিনোপ জানিত অবসন্নতা, ফুসফুসে বক্তসঞ্চয়, সন্নিপাত লক্ষণ, অথবা মস্তিষ্কেব উপসর্গ বশতই এইরোগে বোগী মৃত্যু হয় । স্পষ্টে বিবাম, গাত্র তাপ ও নাড়ী বোগের ন্যূনতা, আমাশয়িক উগ্রতার হ্রাস এবং প্রচুর ঘর্ম,—এইগুলি অল্পকাল লক্ষণ । দৌর্জল্যের আদিক্য, মলেন সহিত রক্তস্রাব, শীতল ঘর্ম, প্রলাপ, সংজ্ঞা-নাশ,—এই সকল বিপদ জনক লক্ষণ । যদি এতৎসহকারে কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র পীড়িত হয় তবে এই জ্বব অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পাবে । কখন কখন প্রোকালীন আকার দাবণ কবিবা উৎকট একজ্ববে অথবা সন্নি-

পাত লক্ষণাপন্ন হইয়া টাইফয়েড বা মল্লিপাত জ্বরে পরিণত হয়, কখন বা জ্বর-লক্ষণ গুলি মন্দীভূত হইয়া স্বল্প-বিবাম অব সবিবাম অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে ।

কারণ ।—অত্যন্ত ম্যালেরিয়া অবস্থায় যে কাৰণে উৎপন্ন হয়, স্বল্পবিবাম জ্বর ও সেই কাৰণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । রোগীর ধাতু-প্রকৃতি ও ম্যালেরিয়া বিষের পরিমাণানুসারে কাহার সবিবাম, কাহারও বা স্বল্পবিবাম জ্বর জন্মে । ম্যালেরিয়া বিষের সহিত টাইফয়েড অব্যবস্থাপিত বিষ সংযুক্ত হইলেই টাইফো-ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয় ।

নির্ণায়ক ।—স্বল্পবিবাম অবস্থায় সবিবামজ্বর, মল্লিপাতজ্বর, ও পীতজ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে । স্বল্পবিবাম ও সবিবাম জ্বরে প্রোভদ এই যে সবিবাম জ্বরে স্পষ্ট বিবামাবস্থা থাকে, স্বল্পবিবামজ্বরে এপ্রকার স্পষ্ট বিবামাবস্থা দৃষ্ট হয়না, মল্লিপাত জ্বরে স্বল্প-বিবাম জ্বরের স্থায়ী অবস্থার আবেশ, ত্বকের পীতবর্ণ ও মলিনবর্ণ থাকেনা, কিন্তু জ্বরের একেবারে অবিবাম, ত্বকের পীতবর্ণের অভাব, ও হৃদিতালের স্থায়ী পীতবর্ণ মল লক্ষণ থাকে । পীতজ্বরে নিয়মিত স্বল্পবিবাম লক্ষিত হয় না, অধিকন্তু অধিকাংশ বোগীই আমাশয় হইতে বক্তস্রাব হয় ।

প্রস্ততান ।—স্বল্প-বিবাম জ্বরের ভাবীফল, বিশেষতঃ নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে প্রায়ই অনিষ্টকর নহে । আমাশয়িক উপদ্রবের বিবর্তিত, নাড়ীর দ্রুততা ও পৃষ্ঠতাব হ্রাস, গাত্র-তাপের লাঘব, জ্বরের আক্রমণের প্রচণ্ডতার ক্রমিক হ্রাস, বিমুক্ত ঘনস্রাব ও তৎপরে বোগের সমস্ত লক্ষণের উপশম এই জ্বরে শুভ লক্ষণ । গাত্র-তাপের বৃদ্ধি, নাড়ীর দ্রুততাব বৃদ্ধি কিন্তু শক্তির হ্রাস, অবসন্ন কর অতিসার বা অন্ত্র হইতে বক্তস্রাব, প্রেলাপ, তন্দ্রা দোষ, এবং অত্যন্ত অবসন্নতা অশুভ লক্ষণ ।

উপসর্গ ।—স্বল্পবিবাম জ্বরের সচিৎ সময়ে সময়ে আমাশয়ের উপসর্গ থাকে এবং জ্বরের উৎকর্ষভায়ে অতিশয় বমন হয় । এমন কি ঔষধ ও পথ্য পর্যন্ত উত্তীর্ণ পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্কের উপসর্গবশতঃ, বিশেষতঃ শীতাবস্থায়, সহসা বোগীর মুচ্ছা জন্মিতে পারে । অববেচনা পূর্বক রোগীকে দত্তব্যমান কবাইলেই এই প্রকার ঘটনা থাকে । তৃতীয়তঃ, মস্তিষ্ক বা

মস্তিষ্কক্লিম্বীৰ উপদাহ বা প্রদাহ জন্মে । মস্তকেব অতিশয় উত্তাপ, প্রলাপ, চক্ষুৰ আবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বাৰা তাহা অবগত হওয়া যায় । এই উপদাহ বা প্রদাহ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া সংজ্ঞানাশ বা সম্পূর্ণ অচেতনত্বে পৰিণত হইতে পাৰে । চতুর্থতঃ, বায়ু-নলীভূজ-প্রদাহ বা ফুসফুস-প্রদাহও উৎপন্ন হয় । কখন কখন বক্ষঃস্থলেব উপসর্গ সকল এত অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয় যে, বিশেষকপে মনোনিবেশ না কবিলে উহা জানা যায় না সূতবাং তদ্বাৰা অতিশয় অপকায় হয় । পঞ্চমতঃ, এই জ্বৰে বক্রুং কিম্বা প্লীহাতে বক্রুসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মে । ষষ্ঠতঃ, এতৎসহকারে অতিমাব বা রক্তামাশয় বিদ্যমান থাকে । সপ্তমতঃ, এই বোগে প্রথম হইতেই অতিশয় দুৰ্দ্ধলতা ও সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

সন্নিপাত ও স্বল্পবিরাম জ্বরে প্রভেদ :—

সন্নিপাত জ্বৰ ।

স্বল্পবিরাম জ্বৰ ।

- ১। দুবিত্ত জলবায়ু হইতে উৎপন্ন হয় । ১। মালেরিবা হইতে উৎপন্ন হয় ।
- ২। প্রথম হইতেই পীতবর্ণ মলস্রাবী অতিমাব থাকে । ২। প্রথমে কোষ্ঠবোধ থাকে বা মলিন পৈত্তিক মল নিঃসৃত হয় ।
- ৩। অগ্নে স্পৰ্শবেশ ও বেদনা থাকে । ৩। অগ্নে বেদনাদি কিছুই থাকে না ।
- ৪। গোলাপী বস্বেব বা বক্রুংগেব পীড়কা উৎপন্ন হয় । * ৪। কোন প্রকাব পীড়কা উৎপন্ন হয় না ।
- ৫। একেবাবেই জ্বৰেব বিচ্ছেদ হয়না । ৫। সাধাবগতঃ প্রতিদিন প্রত্যাষে অল্প বিরাম লক্ষিত হয় ।
- ৬। পাণ্ডু বা স্বকেব পীতবর্ণ কচিং থাকে । ৬। পাণ্ডু বা স্বকেব পীতবর্ণ প্রায়ই থাকে ।
- ৭। বিবমিষা, হিক্কা ও বমন প্রভৃতি আমাশয়িক লক্ষণ কখন কখন থাকে । ৭। আমাশয়িক লক্ষণ প্রায় সৰ্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে ।

* এ দেশে সন্নিপাত জ্বৰে প্রায়ই পীড়কা দৃষ্ট হয় না ।

পীত লক্ষণাপন্ন হইয়া টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হয়, কখন বা জ্বর-লক্ষণ শুধি মন্দীভূত হইয়া স্বল্প-বিবাম অব সবিবাম জ্বরে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

কারণ।—অত্যন্ত ম্যালেরিয়া অব যে কারণে উৎপন্ন হয়, স্বল্পবিবাম জ্বর ও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোগীয় ধাতু-প্রকৃতি ও ম্যালেরিয়া বিবেক পরিমাণানুসারে কাহাব সবিবাম, কাহাবওবা স্বল্পবিবাম জ্বর জন্মে। ম্যালেরিয়া বিবেক সহিত টাইফয়েড অবোৎপাদক বিষ সংযুক্ত হইলেই টাইফো-ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয়।

নির্ণায়ক।—স্বল্পবিবাম অব সবিবামজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, ও পীতজ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। স্বল্পবিবাম ও সবিবাম জ্বরে প্রভেদ এই যে সবিবাম জ্বরে স্পষ্ট বিবামাবস্থা থাকে, স্বল্পবিবামজ্বরে এপ্রকার স্পষ্ট বিবামাবস্থা দৃষ্ট হয়না, সন্নিপাত জ্বর স্বল্প-বিবাম জ্বরের স্থায় অবস্থার আবেশ, স্বকেন পীতবর্ণ ও মলিনবর্ণ থাকেনা, কিছু অবস্থার একেবারে অবিবাম, স্বকেন পীতবর্ণের অভাব, ও ত্বিতালের স্থায় পীতবর্ণ মল লক্ষণ থাকে। পীতজ্বরে নিয়মিত স্বল্পবিবাম লক্ষিত হয় না, অদিকন্তু অধিকাংশ বোগীয়ই আমাশয় হইতে বক্তস্রাব হয়।

প্রজ্ঞান।—স্বল্প-বিবাম জ্বরের ভারীফল, বিশেষতঃ নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে প্রায়ই অনিষ্টকর নহে। আমাশয়িক উপদ্রবের বিবর্তি, নাক্তীৰ দ্রুততা ও পুষ্টতার হ্রাস, গাত্র-তাপের লাঘব, জ্বরের অক্রমণে প্রচণ্ডতার ক্রমিক হ্রাস, বিমুক্ত ঘৰ্মস্রাব ও তৎপরে বোগের সমস্ত লক্ষণের উপশম এই জ্বরে শুভ লক্ষণ। গাত্র-তাপের বৃদ্ধি, নারীর দ্রুততার বৃদ্ধি কিছু শক্তির হ্রাস, অবসন্ন কব অতিসার বা অস্ত্র হইতে বক্তস্রাব, প্রলাপ, ভ্রমাদোষ, এবং অত্যন্ত অবসন্নতা অশুভ লক্ষণ।

উপসর্গ।—স্বল্পবিবাম জ্বরের সতিত সময়ে সময়ে আমাশয়ের উপসর্গ থাকে এবং জ্বরের উপসর্গের অতিশয় বমন হয়। এমন কি ঔষধ ও পথ্য পর্যন্ত উঠিয়া পড়ে। বিতীর্ণতঃ, মস্তিষ্কের উপসর্গবশতঃ, বিশেষতঃ শীতাব-স্থায়, সহসা বোগীর মূর্ছা জন্মিতে পারে। অববেচনা পূর্বক বোগীকে দণ্ডায়মান কবাউলেই এই প্রকার ঘটনা থাকে। তৃতীয়তঃ, মস্তিষ্ক বা

মস্তকধিলীর উপদাহ বা প্রদাহ জন্মে। মস্তকেব অতিশয় উত্তাপ, প্রলাপ, চক্ষুব আরক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। এই উপদাহ বা প্রদাহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সংজ্ঞানাশ বা সম্পূর্ণ অচেতনত্বে পরিণত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, বায়ু-নলীভূজ-প্রদাহ বা কুসকুম-প্রদাহও উৎপন্ন হয়। কখন কখন বক্ষঃস্থলের উপসর্গ সকল এত অজ্ঞাতসাবে উপস্থিত হয় যে, বিশেষকপে মনোনিবেশ না করিলে উহা জানা যায় না সুতরাং তদ্বারা অতিশয় অপকার হয়। পঞ্চমতঃ, এষ্ট অবৈয়ক্য কিম্বা প্লীহাতে বক্রসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মে। ষষ্ঠতঃ, এতৎসহকারে অতিমান বা রক্তমাশয় বিদ্যমান থাকে। সপ্তমতঃ, এই বোণে প্রথম হইতেই অতিশয় দুর্বলতা ও সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সন্নিপাত ও স্বল্পবিরাম জুরে প্রভেদ :—

সন্নিপাত জ্বর।

স্বল্পবিরাম জ্বর।

- | | |
|---|--|
| ১। দূষিত জলবায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। | ১। ন্যাবেনিয়া হইতে উৎপন্ন হয়। |
| ২। প্রথম হইতেই পীতবর্ণ মলস্রাবী অতিমান থাকে। | ২। প্রথমে কোষ্ঠরোধ থাকে বা মলিন পৈত্তিক মল নিঃসৃত হয়। |
| ৩। অগ্নে স্পর্শদেয় ও বেদন থাকে। | ৩। অগ্নে বেদনাদি কিছুই থাকে না। |
| ৪। গোলাপী বঙ্গের বা রক্তবর্ণের পীড়কা উৎপন্ন হয়। * | ৪। কোন প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয় না। |
| ৫। একেবারেই জ্ববেদ বিচ্ছেদ হয়না। | ৫। সাধাবণতঃ প্রতিদিন প্রত্যুষে অল্প বিরাম লক্ষিত হয়। |
| ৬। পাণ্ডু বা ত্বকের পীতবর্ণ কচিং থাকে। | ৬। পাণ্ডু বা ত্বকেব পীতবর্ণ প্রায়ই থাকে। |
| ৭। বিবমিষা, হিক্কা ও বমন প্রভৃতি আশাশয়িক লক্ষণ কখন কখন থাকে। | ৭। আশাশয়িক লক্ষণ প্রায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। |

* এ দেশে সন্নিপাত জবে প্রায়ই পীড়কা দৃষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।—জেলসিমিয়ম, ব্রাইওনিয়া, বেসেডোনা, ইপিকাক, এটিমোনিয়ম-জুডন, ইউপেটোরিয়ম, নক্সভমিকা, মার্ক-সল, ব্যাপ্টিসিয়া ও কুইনাইন স্বল্পবিবাম জ্বরের প্রধান ঔষধ। সন্নিপাত-লক্ষণ (টাইফয়েড সিন-টমস) উপস্থিত হইলে ব্রাইওনিয়া, বসটিকা, ব্যাপ্টিসিয়া, হাইওসায়েরাস, ওপিয়ম, ট্র্যামোনিয়ম, ফসফরিক এসিড, আর্সেনিকম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জ্বরের প্রথমে জেলসিমিয়ম, তৎপরে ব্রাইওনিয়া, শিনো-লক্ষণে বেসেডোনা, অতিশয় গাত্র-বেদনা ও ঘর্ষাভাব লক্ষণে ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটন, বিবমিয়া বা বমনাদি আমাশয়িক উপদ্রবে ইপিকাক বা ব্যাপ্টিসিয়া, ক্রমি-লক্ষণে সিনা বা স্ট্রাণ্টোনিম, উদবায়ম-সংক্রমে মার্ক-সল, পডোফিলম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে ঘর্ষ্য হইয়া জ্বর ত্যাগ হইবামাত্র সাধারণতঃ ১।৩ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ২৩ ঘণ্টান্তর ব্যবহৃত হয়। পুনর্ব্বার জ্বর আসিলে অবকানীন যথোপযুক্ত ঔষধ এবং বিবাম সময়ে কুইনাইন ব্যবহৃত করা যায়। অত্যন্ত অবসন্নতা থাকিলে কুইনাইনের পরিবর্তে আর্সেনিক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বল্পবিবাম জ্বরে ব্যবহৃত ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

[১] জেলসিমিয়ম।—প্রথম সপ্তাহে, উপসর্গ শূন্য স্বল্প-বিবাম জ্বরে সাধারণতঃ জেলসিমিয়মই ব্যবহৃত হয় উগ্র জ্বর, অতিশয় গাত্র-তাপ; তীব্র শিরঃপীড়া; ঘাড়ে, পৃষ্ঠে, ও অঙ্গে বেদনা, চক্ষু নাড়িলে চক্ষে বেদনা; পিপাসা; স্বল্প ও আরক্ত মূত্র এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। জেলসিমিয়ম সেবনে প্রায়শঃ ৪।৫ দিবসেই জ্বরের ভোগকাল পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শিত্তদিগেব স্বল্পবিবাম জ্বরে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

[২] ব্রাইওনিয়া।—জ্বর কয়েকদিন থাকিলে জেলসিমিয়মের পরে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ব্রাইওনিয়াও জেলসিমিয়মের জ্বাব জ্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রযোজিত হইয়া থাকে। সমুখ কপালে শিরঃপীড়া; একবারে অধিক পবিমাণ জলপানের অনিবার্য বিশিষ্ট পিপাসা; কপিশবর্ণ জিহ্বা; বর্ষ্যশূন্য উতাপ; পেশীর স্পর্শ-দেহ ও বেদনা এবং নাড়িলে চড়িলে উহার আতিশয়্য, বক্ষঃস্থলে স্ট্রা-বেদন বেদনা, এবং কোষ্ঠাবদ্ধ ব্রাইওনিয়া

প্রয়োগ-লক্ষণ । [৩] বেলভেনা !—নাস্তিক লক্ষণের প্রাবল্য অর্থাৎ লক্ষণ কপালে অবশ্য শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীগুলির অতিশয় পূর্ণতা ও দগদগ, এবং অস্থিরতা ও প্রলাপ লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী ।

[৪] ইপিকাক ।—আমাস্যিক উপদাহিতা সত্বে আরম্ভ হইলে, এবং বিবমিষা, পিত্ত-বমন, উদবোদ্ধদেগে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইপিকাক ব্যবহৃত হয় । [৫] মার্ক-মল ।—অতিশয় থাকিলে মার্ক-মল ফলপ্রদ । মলিন কপিশবর্ণ, বা আমাশয়িত মল লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয় । ঘর্ম্মস্রাবও জবেব অন্তপশম এবং বেদনা এই ঔষধের অপক লক্ষণ ।

[৬] ইউপেটোরিয়াম ।—পিত্তপ্রধান স্বপ্ন বিবাহ জুরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । অস্থির অভ্যন্তরে ও পেশীতে বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ ।

[৭] পডোফিলম ।—আমাশয়, অগ্নি, ও যকৃতের লক্ষণের প্রাবল্য ; অতিশয় শিরঃপীড়া ও পিপাসা, অথবা শিবোবেদনায় পরিবর্তে উদরাময় থাকিলে পডোফিলম প্রয়োগ করা যাইতে পারে । [৮] নক্সভমিকা ।—জবেব প্রথমাবস্থায় বোগীয় ক্ষণবাহিতা ও একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; এবং জিহ্বাপ্রান্ত উজ্জল লোহিত বর্ণ থাকিলে নক্সভমিকা উপকারী । আগ্রাস আবেগোন্মুখ অবস্থায় বোগা শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য না হইয়া উঠিলে, তাহার ক্ষুধাহীনতা, ছন্দলতা, এবং দ্রব্য শীত ও উত্তাপ লক্ষণাপন্ন অল্প অল্প সপর্যায় অব থাকিলেও এই ঔষধ যথপ্রদ । [৯] কুইনাইন ।—স্বপ্ন-বিবাহজবে স্পষ্ট বিবাহ উৎপত্তি হইলে জবেব বিচ্ছেদকালে কুইনাইন ব্যবহৃত হয় । বিবাহ কালে নাড়ীর চঞ্চলতা ও হৃদযং হৃদযতা, অবকালে উহার পূর্ণতা ; কণ-নাদ, মস্তক লঘু অল্পভব,—এই গুলি কুইনাইনের প্রয়োগ-লক্ষণ । [১০] ব্যাপ্টিসিয়া ।—মনোভাবের বিশৃঙ্খলতা, প্রচাপিত বৎ অতীত শিবোবেদনা, শিরোবর্ণন, আবক্ত, ধূমল ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল ; কপিশ বা মলিন পীতবর্ণ কেন্দ্র ও লোহিতবর্ণ প্রান্ত বিশিষ্ট জিহ্বা , বাবংবাব অল্প অল্প, পাতলা, মলিন মল নিঃসরণ , অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শান্তি ও ঘৃষ্টবৎ অল্পভব ইহার লক্ষণ । এইসকল লক্ষণে দৃষ্ট স্বপ্নবিবাহ জুরের প্রারম্ভে ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগ করিলে অনেক সময় প্রথম হৃদযাবই এতদ্ভাবে জুব প্রতিরুদ্ধ হয় । অপর, জুরের প্রথম সপ্তাহের পাবে অতিশয় স্নায়বীয় অস্থিরতা , মস্তক বেন

থও থও হইয়া শয্যার বিক্ষিপ্ত বহিয়াছে এ প্রকার অনুভব ও সেই সকল থও একত্রিত করিবার নিমিত্ত সন্দা পার্শ্ব-পরিবর্তন ; জিহ্বাসিত কথার উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত হইয়া পড়া ; শিরোগোরব, তন্ত্রাদোষ ; জিহ্বার শুষ্কতা, দন্তে দণ্ড-শর্কবা ; শ্বাসে ছুগন্ধ, নাড়ীর পূর্ণতা ও ধীরতা ; কৃষ্ণবর্ণ ছুগন্ধময় মল, এবং লোহিতবর্ণ মুত্র প্রভৃতি গভীর বিকাশ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ বলপ্রদ । [১১] সিল্কোনা ।—আবোগ্যোম্মথ অব-স্থায় শীঘ্র আবোগ্য না জন্মিলে, অথবা পৌর্ণাব চক্ষুতলা, প্লীহারের ক্ষুণ্ণতা, ও বৈশিষ্ট্য থাকিলে সিল্কোনা ব্যবহৃত ।

স্বপ্নাববামজুবে বিকাশ ভন্নিলে এবং সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়শঃই টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরের ঔষধগুলি অর্থাৎ (১) বেলে ডোনা, ব্রাই ওনিয়া, বসটক্স, কাক উল্যাস, ভিবেট্রম, (২) আর্সেনিক, ব্যাপ্টি-সিয়া, কাকো-ডেজি, চাণনা, হাইওস, এপিস, আইরিস প্রভৃতি ঔষধ ব্যব-হৃত হইয়া থাকে । অতএব সেই সকল ঔষধের বিবরণিত লক্ষণ আব এখানে উল্লিখিত হইলনা । টাইফয়েড জ্ববে ও পুত্রেব শেষ ভাগেই উল্লেখ করা গেল । (টাইফয়েডজ্বর দ্রষ্টব্য) ।

প্রতিষেধক, —জেনার্সনিয়ম স্বপ্নবিবরান জ্বরের প্রতিষেধক ।

পথ্যাপথ্য ।—বিষমজ্বরের স্থায় ।

স্বপ্নবিবরাম জ্বরের প্রধান প্রধান

উপসর্গ ।

বায়ুনলি-ভুজ-প্রদাহ (ব্রুকাইটিস)—দুসকুসের বায়ুনলীন ও তাহার মৈথিক বিম্বী প্রদাহকে বায়ুনলি-ভুজ-প্রদাহ বলে । সাধারণতঃ সর্দি লাগিয়া এই প্রদাহের উৎপত্তি হয় । শীত ও বর্ষা ঋতুতে এ দেশীয় দিগের জরে মধ্যে মধ্যে এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে । উত্তর অঞ্চল ও সমুদ্রকূলবাসীদিগের জরবোগেই ইহা অধিক প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় । শিরঃপীড়া,

জ্বর পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, লেপাবৃত্ত জিহ্বা, অস্থিবেদনা; বক্ষঃস্থলেব সমুখ ভাগে আকৃষ্টতা ও আকৃকন অন্তর্ভব, দ্রুত, আয়াসসাধ্য, ব্যাকুলিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসহকাৰে কণ্ঠকুঞ্জন অর্থাৎ সাঁই সাঁই বা হাঁস ফাঁস শব্দ; এবং উগ্রকাস এই বোগেব প্রধান লক্ষণ। বায়ুনলীভূজ-প্রদাহের কাস প্রথমে শুষ্ক থাকে, দুই তিন দিন পবে নিশ্বাসবৎ কোমল শ্লেষ্মা উদগত হয়। সেই শ্লেষ্মা কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিয়া দিলে উহা অগুণাগেব আকার ধারণ কবে। কখন কখন কালে বস্তুর বেগাও দেখা যায়। অবশেষে গাঢ়, দীর্ঘ হবিত মিশ্রিত পাত বর্ণ ও পৃথক নিষ্কাশন নির্গত হইতে থাকে। বোগ জ্ঞান্য হইলে অষ্টম দিবসে ত্রাস পড়ে, নতুবা শ্বাসকৃচ্ছ বাদ্ধত, ওষ্ঠ কৃষ্ণ বর্ণ গণ্ডদেশ পাতুর ও মালন এবং কখন কখন প্রলাপ প্রভৃতি অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া বোগীণ প্রাণ বিনষ্ট হয়। বালকদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ অবিক বিপদ জনক। উহাদেব এই বোগ জন্মিলে প্রায়ই বায়ুবাহীনলেব স্তম্ভ স্তম্ভ উপশাখা গুলি আক্রান্ত হইবা থাকে, কিন্তু পূর্ণবয়স্কাদিগেব বোগে প্রধান প্রধান নলগুলিই প্রদাহিত হয়। প্রদাহ বিকীর্ণ হইবা বতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলে অধিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ততই বায়ুদ্বারা ভাংকপে এক বিশোবিত হইতে পারে না। অতরাং শ্বাস কৃচ্ছ হইবা সমুখ বোগীণ বৃত্তা হয়। চিকিৎসা।—একোনাইট (রোগের আরম্ভাবস্থা); ব্রাইওনিয়া (বক্ষঃস্থলে বেদনা, স্বল্প শ্লেষ্মা নিজীবন, বৃহৎ বৃহৎ বায়ুনলীর প্রদাহ), এন্ট-টাট (অতিশয় কণ্ঠকুঞ্জন, শ্বাসকৃচ্ছ, কুসকূসে অধিক শ্লেষ্মাসঞ্চয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুনলীতে প্রদাহের বিস্তৃতি), কালী-বাইক্রম (হৃৎশ্বেদ্য স্তব্ধ বৎ শ্লেষ্মাসঞ্চয়, শ্বাসকৃচ্ছ, কাস, ক্ষুব্ধানতা, পীতবর্ণ লেপাবৃত্ত জিহ্বা, কুসকূবাস, (কাস, রক্তবৎ শ্লেষ্মা-নিজীবন, বায়ুনলীভূজ হইতে পুৰুষাব), লোবেলিয়া, ইপিকাক, আসেনিক, বেলেডোনা, কার্বো-ভেজী, মাকু'নিয়েস, স্পঞ্জিয়া, সগফার। তখন বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে বক্ষঃস্থলে মসিননাব উষ্ণ প্যাঁটস প্রদান অত্যন্ত উপকাবজনক। বালকদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ—একন, যস, ব্রাই, পলস (সবল কাস); ইপিকাক (আক্কেপিক কাস), এন্ট-টাট (শ্লেষ্মা সঞ্চয়), সিনা, শ্রাটে (ক্লিমিকিত উপদাহ)। ডাক্তাব অশার বলেন যে বালকদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে ধোবেলিয়া সন্ধ্যাকৃষ্ট ঔষধ। বালকদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ—

এন্ট-টার্ট, এমন-কার্স (কষ্টে গ্লেয়া নিউন) : কোনা, কার্সোভে, ড্রাপ, সেনেগা, ফস, কা-বাইক্রম, আর্স। জ্বের আনুযায়িক বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে সাধারণতঃ ব্রাইওনিয়া বা এন্ট-টার্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া) ।—সাধারণতঃ প্রবণ প্রাণী-জীবের জ্বাশ শীত ও সময়ে সময়ে উত্তাপ সহকায়ে এই বোগ উপস্থিত হয়, অথবা বায়ুনলীভুজ-প্রদাহেব জ্বাশ ইহাব সূচনা হইয়া থাকে । কিন্তু স্বল্পবয়স্ক, সন্নিপাত জ্বর ও অজ্ঞাত জ্বাশ এই বায়িকণ কখন কখন প্রচ্ছন্ন ভাবে উপস্থিত হয় । বালক, বৃদ্ধ ও এদেণীষদিগেব ফুসফুস প্রদাহও সময়ে সময়ে এই প্রকার অস্পষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এতদ্দেশীষেবা অনেক সময় ফুসফুসেব বোগে প্রাণত্যাগ কবে অথচ তাহাব কোন স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয় না । ফুসফুস-প্রদাহেব প্রথম অবস্থায় শুষ্ক, হ্রস্ব কসি প্রকাশ পায় । তৎপরে পাতলা, ফেণিল ও অতিশয় আঠাবৎ গ্লেয়া নিঃসারিত হয় । অনন্তর লৌহেব মবিচায জ্বাশ বর্ণবিশিষ্ট অথবা রক্ত মিশ্রিত গ্লেয়া নির্গত হইতে থাকে । শ্লেষ্মাব এই প্রকার বর্ণ দ্বাবাই বায়ুনলীভুজ প্রদাহ হইতে ফুসফুস প্রদাহেব প্রভেদ করা যায় । এই বোগে সচবাচয অধিক তীব্র বেদনা থাকে না । কিন্তু এতৎ সহকায়ে ফুসফুস-বেষ্টেব প্রদাহ (প্লুরিসি) উৎপন্ন হইলে হৃচীবোধ-বৎ প্রবশ পাশ্বে-বেদনা বিদ্যমান থাকে । কখন কখন স্তনেব নিম্নদেশে এই বেদনা অনুভূত হয় । কেবল ফুসফুস-প্রদাহে বক্ষঃস্থলে নিয়ত অনুগ্রহ বেদনা থাকে এবং শ্বাস হ্রস্ব ও ঘন হয় । চক্ষে জল ও নাসাবন্ধে অর্জিতা থাকেনা । শ্বাসেব গতি ১১৪ হইতে ১৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত হ্রাস পায় । গাত্রতাপ ১০৪ বা ১০৫ তাপাংশ উত্তিত হয় । প্রদাহ অনুগ্রহ আকাবেব হইলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে রোগ হ্রাস পড়ে নতুবা এক পক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় । যদি শরীর-তাপ গড়ে ১০৪ তাপাংশ, নাড়ীবে স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১২০ বাব এবং শ্বাসেব গতি এক মিনিটে ৩৫ বাব অপেক্ষা অধিক না হয় অথবা অন্য কোন সঙ্কট জনক উপসর্গ না জন্মে তবে রোগী অষ্টম বা দশম দিবসে আবেগ্যা লাভ কবিত্তে আশস্ত করে । কিন্তু রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে শ্বাসেব দ্রুততা ও কৃচ্ছ্রতা, নাড়ীবে বেগ ও গাত্রেব উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় । অপিচ, প্রাণাপ ও তৎপরে সম্পূর্ণ অচেতনতা জন্মে । এই রোগে বক্ষোবোক্ষা

বস্ত্র দ্বারা স্বচ্ছাশ্রিত নিম্ন ভাগে বক্ষঃস্থলে আকর্ষণ করিলে কেশঘর্ষণ ধ্বনি (ক্রেপিটেশন), এবং বোগের বদ্ধিত অবস্থায় অঙ্গুলি দ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রাতি-
ঘাত করিলে স্বাভাবিক বায়ু-গর্ভ শব্দের পরিবর্তে ঘন গর্ভ (ডংল) শব্দ শুনা
যায় । জ্বর কালীন বালকদিগের ফুসফুস-প্রদাহ প্রায়ই অজ্ঞাতসারে উপস্থিত
হয় । তিন বৎসরের নূনবয়স্ক বালকদিগের এই বোগ হইলে উহা বা শ্লেষ্মা
তুলিয়া ফেলিতে পারেনা । মুখ বিকসিত করিয়া ঘন ও আঘাসসাধ্য নিশ্বাস
তাগ করে । নিশ্বাস ত্যাগকালে নাসারন্ধ্র প্রসারিত হয় । বালকদিগের
ফুসফুস-প্রদাহ প্রায়ই বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ বলিয়া ভ্রম জন্মে । কিন্তু এই দুই
বোগে প্রধানতঃ প্রভেদ এই যে ফুসফুস-প্রদাহে গাত্র ও মুখ গহ্বর উত্তপ্ত ও
কক্ষ, কাস হ্রস্ব ও ক্ষীণ, নির্গত শ্লেষ্মা স্ফীত কলঙ্কের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও কেশিল,
এবং গাত্র তাপ ১০৩—১০৫ তাপাংশ থাকে । বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে গাত্র ও মুখ-
গহ্বর উষ্ণ ও আর্দ্র, কাস উচ্চ ও শব্দ, নির্গত শ্লেষ্মা শুষ্ক ও অগুলালবৎ,
এবং গাত্র তাপ ১০০—১০২ তাপাংশ হয় * । চিকিৎসা ।—এই বোগে,
নাড়ী বৎসর, শ্বাসের গতি ও শরীরের তাপ হ্রাস করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য
অতএব যে সকল ঔষধে এই তিন উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় তাহাই এই ব্যাধির
প্রকৃত ঔষধ । একম ও কস পর্যায়ক্রমে (প্রাবৃত্তাবস্থা); ব্রাই ও কস
পর্যায়ক্রমে (ফুসফুসেতে পরিব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহ), এট টাট ও কস পর্যায়
ক্রমে (বায়ুনলীভূজ পরিব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহ) । চেল-মাজ (যকৃতের উপসর্গ);
কালী-কার্ব (উভয় ফুসফুসের প্রদাহ); আর্ন বা এসিড-নাইট (বৃদ্ধ বা ডকল
রোগী), আইয়োড, ব্রোম, এসিড-অকজেলিক (গণ্ডমালাগ্রস্ত বোগী),
সলফ (ক্লান্তসাধ্য বা অনতিপ্রবল), 'রস, আর্স, ব্যাপ্ট, ভিবেট-ভিব
(সাম্মিপাতিক লক্ষণ); কাস-ভে, আর্স বা ল্যাক (ছগন্ধি নিশ্বাস, ফুস-
ফুসের বিগলিত অবস্থা), ক্যাষ্ট (বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়); ভিবেট-ভিব
(মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জার উপদাহ), আর্ন (উপঘাত বা অতি পরিশ্রম

* ফুসফুসেতে প্রদাহে সূচীবেধ বা কর্তনবৎ পার্শ্ববেদনা ও শুষ্ক হ্রস্ব
কাস থাকে কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে না । অপিচ, নিউমোনিয়ায় ন্যায় ইহাতে
নিশ্বাস প্রাণের সংখ্যা বৃদ্ধি নাড়ীর সংখ্যা বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে না ।

জনিত) ; লাইকো (গভীর-মূল বেদনা, বা ফুসফুস প্রদাহের পরবর্তী বায়ুনলী-
ভূজের উপদাহ) , বেণ-বদ্ব (যকের নিম্নে ক্ষুদ্র কতবৎ অশুভব) । শীতল
জলে বদ্বগু সিক্ত কবিতা উত্তমরূপে চিপিয়া লইয়া তদ্বারা বক্ষঃস্থলের
পীড়িত পার্শ্বে পাঁচ মিনিট ক্ষুদ্র এক একবার পটী প্রয়োগ করিলে ২৩
ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ উপশম বোধ হয় । দীর্ঘ ও পুরু মনিম্বাব পোল্টিস
বক্ষঃস্থলে ও পুটে দিলেও অতিশয় উপকার দর্শে । জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ ফুসফুস-
প্রদাহে সাধারণতঃ ব্রাউনিয়া ও কনফাসি ব্যবহৃত হয় ।

প্রলাপ (ডিলিরিয়াম) ।—অসংলগ্ন ও অতশৃঙ্খলিত বাক্যকে প্রলাপ
বলে । মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিকার বশতঃ প্রলাপ জন্মে । তবে দুই প্রকার প্রলাপ
উপস্থিত হয়, যথা—প্রবল প্রলাপ ও মৃদু প্রলাপ । জ্বরের প্রথম অবস্থায়
প্রলাপ জন্মিলে প্রাগৈ প্রবল প্রলাপ জন্মে । এই প্রকার প্রলাপে বোণীর
অতিশয় উত্তেজনা, উত্থান-চেষ্টা, শিবঃপীড়া ও চক্ষের আবর্তনতা প্রভৃতি বিদ্য-
মান থাকে । জ্বরের শেষাবস্থায় অর্থাৎ অষ্টাহ পরে আব এক প্রকার প্রলাপ
জন্মে । উহাকেই মৃদু প্রলাপ বলে । মৃদু প্রলাপে বোগী অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট
হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মৃদুভাবে অস্পষ্ট ও অসঙ্গত বাক্য বলে । ইহাতে
উগ্র শিবঃপীড়া ও চক্ষের আবর্তনতা প্রভৃতি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের লক্ষণ
প্রকাশ পায় না । এই শেষোক্ত অবস্থাকেই টাইকয়েড্ কণ্ডিশন
বা স্লিপাটাবস্থা কহে । মস্তিষ্কের প্রদাহ ও অত্যন্ত মস্তিষ্কবোগ বশতঃ যে
প্রলাপ উৎপন্ন হয় তাহা অতিশয় উগ্র ও প্রচণ্ড হইয়া থাকে । স্বপ্নবিবামাদি
কোন কোন জ্বরে সময়ে সময়ে অট্টোত্তম বা তন্দ্রাদোষ (কোমা) জন্মে ।
জ্বরের প্রথম অবস্থায় তন্দ্রাদোষ ততঃস্থানীয় নহে । কিন্তু প্রলাপের পর
নিরন্তর তন্দ্রা সঙ্কটজনক । চিকিৎসা ।—মস্তিষ্কে প্রবল রক্তসঞ্চয় অর্থাৎ
স্নায়ুক্ষেত্রে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত মস্তিষ্ক-বিকার, রক্তবর্ণ চক্ষু, কপাল প্রান্তের
শিরাম্পন্দন, আবর্ত মুখমণ্ডল ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় । রক্তসঞ্চয়
ব্যতীত, কেবল স্নায়ু বিধানতন্ত্রের সামান্য উপদাহজনিত মৃদুপ্রলাপে হাইমো-
সারেমাস উপযোগী । উন্মাদের ত্রায় প্রলাপ, প্রচণ্ডতা ও দংশনচেষ্টার
ট্রিমোনিয়ম কলপ্রদ । স্নায়ুক্ষেত্রে অবসাদন বশতঃ প্রলাপ অপেক্ষা অট্টো-
ত্তমবৎ নিদ্রার আবৃত্তি থাকিলে ওপিয়াম ব্যবহার্য ।* অবকাশীন তন্দ্রাদোষে

সাধারণতঃ এপিয়ম ও রসটেক্স ব্যবহৃত হয় ; আবশ্যক হইলে বেলেডোনা, হাইয়োসায়েরমাস, জেলসিমিয়মাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

কুমি (ওয়ারমস) ।—শরীর ক্লান্ত ; উদব শরু ও ক্ষীণ , মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ; অকস্মাৎ মুখমণ্ডলে বর্ণপরিবর্তন ; চক্ষুর নিম্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ অর্ধ-মণ্ডল ; প্রসারিত কণীনিকা ; নাসাকণ্ডুয়ন ; মলদ্রাব কণ্ডুয়ন ; কোষ্ঠরোধ ও ঘন ঘন মল-প্রবৃত্তি, অথবা মলিন, আঠাবৎ দুর্গন্ধি মলস্রাব ও কুহ্নন বিশিষ্ট উদবাময় ; নিম্নোদবে বেদনা ; দুর্গন্ধময় নিশ্বাস ; কখন কখন নিদ্রাবস্থায় লালাস্রাব ; বমন-প্রবৃত্তি ; অতি-ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা , মলদ্রাব হইতে আম-স্রাব ; বালিকাদিগেব জননেদ্রিব হইতে স্নেহাস্রাব ; কখন কখন মূত্রকৃচ্ছ্র ; শ্বেতবর্ণ বা দুগ্ধবৎ মূত্র ; শব্দায় মূত্রত্যাগ ; নিদ্রাকালীন অস্থিরতা , চমকিত হইয়া উঠা, দস্তে দস্ত ঘর্ষণ বা কথা বলা, শুষ্ক ও হ্রস্ব বা আক্ষেপিক কাস ; দীর্ঘ-নিশ্বাস ; হিকা ; আক্ষেপ ; বা প্রলাপ ;—এইগুলি কুমির প্রধান প্রধান লক্ষণ । হুলান্ত ও ক্ষুদ্রান্ত উভয় অঙ্গেই কুমি থাকে । হুলান্তে সূত্র-কুমি ও ক্ষুদ্রান্তে মহিলতাব গ্রাষ কুমি বাস করে । বমন বা মলের সহিত কুমি নির্গত হইলেই উদরে কুমি আছে বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয় চিকিৎসা ।—অবে কুমি উপসর্গ থাকিলে সাধাবগতঃ দিনা ও স্ত্যান্টিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মহি-লতার আকাব কুমিও পক্ষেই দিনা ও স্ত্যান্টিনি বিশেষ উপযোগী ; সূত্রকুমি রোগেও এই দুই ঔষধি উপকারী । কিন্তু ডাঃ হিউজ টিউক্রিয় ১৮ ক্রম অধিক ফলপ্রদ মনে করেন । পূর্ণবয়স্কদিগেব সূত্রকুমিতেই এই শেষোক্ত ঔষধ বিশেষ উপকারজনক । সূত্রকুমিতে সূইট অয়েল বা লার্ভের পিচকারীও ফল-প্রদ । কুমিজ্বনিত অতিসার বা রক্তাতিসারে মায়কিউরিয়স ; স্নায়বীয় উপদাহ, বা আক্ষেপে বেলেডোনা ; এবং স্নায়বীয় অবসন্নতায় ইয়েশিয়া ব্যবহৃত হয় ।

অন্যান্য উপসর্গ ।—অতিসার ।—আস, ইপিক, মার্ক, কার্সো, ডিবাট, ব্যাপ্ট । রক্তাতিসার ।—মার্ক, ইপিক, কলোস, ব্যাপ্ট, আর্স । পাণ্ডু ।—ফস, মার্ক, ক্রোটেলস ।

শিশুদিগের স্বাস্থ্যবিধান **মজুর** * -রিমিটেণ্ট ফিবার অভ ইন্ফ্যান্টস্‌।

শিশু ৭ বালকদিগের অনেক সময় স্বাস্থ্যবিধানের হইয়া থাকে। ইহাদের জন্ম সর্বদা কেবল পুষ্টিবাস্প হইতে উৎপন্ন হয় না। পুষ্টিবাস্প, দস্তাদগম জনিত উপদাহ, ক্রিমি, মলমূত্রাদি আহার, অল্পে মলসঞ্চয়, দীর্ঘকালব্যাপী উদরাময় ফুসফুসের পীড়া, আমাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, এই সকল শিশুদিগের স্বাস্থ্যবিধান জবাব প্রদান কারণ। মূল স্বাস্থ্যবিধান জরে যে সকল প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতেও প্রায় সেই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শিশুদিগের জবে মধ্যান্ত্র প্রত্যবে ও প্রকোপ অবস্থা সন্ধ্যা প্রাকালে বা রাত্রির প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়। এই জবে প্রলাপ ও অচেতনতা প্রবণতা এবং, আক্ষেপের (কন্ভলশন) সম্ভাবনা থাকে।

টিকিৎসা।—জবের স্বাস্থ্যবিধান প্রকৃতি নিকৃষ্ট হইবামাত্র এই জবে জিলসিমিনম্ ব্যবস্থেয়; কিন্তু আমাশয়িক লক্ষণ থাকিলে পলসেটিলা ও এণ্টিমোনিয়ম্ ফ্রুডম্ প্রয়োজ্য। শিরোলক্ষণের প্রাবল্য হাইমোসায়োস্‌ ব্যবহার করা কর্তব্য। কখন কখন ক্রিমি উপসর্গ বশতঃ এই জ্বর দীর্ঘকাল থাকে এরূপ অবস্থায় দিনা ব্যবস্থেয়। শিশুদিগের জরে কায়োমিলা ১২ অনেক সময় সবিশেষ ফলপ্রদ। সময়ে সময়ে এই স্বাস্থ্যবিধান জব, সন্নিপাত জবে পৰিণত হয়। একপ হইলে প্রথম অবস্থায় ব্যাপ্তিবিষা; উদরাময় ও অবসন্নতাদি লক্ষণে আর্সেনিক; পুষ্টিগত ক্ষতে মিউবিয়োটিক্ এসিড; প্রবল উষ্ণতা, বমন, শিরঃপীড়া ও তন্দ্রাদি লক্ষণে ডিবেটম্-ভিরিডি; তিষ্ঠাস্বাদ, পিত্তপ্রকোপ, কাস ও কোপনতাদি লক্ষণে ব্রাইবোনিয়া; অতিঘর্ষে মারকু রিয়স্‌, দুর্গন্ধময় মলমূত্রাদি নিঃসরণে কার্বো-ভেজিটেবিলিস; উদরাময়ের হৃৎনাশ পলসেটিলা; ফুসফুসের উপসর্গে ফসফরাস ও ব্রাইওনিয়া; স্নায়বীয়

* অধুনা শৈশবাবস্থার স্বাস্থ্যবিধান জবকে Enteric fever (এণ্টারিক ফিবার) বা সন্নিপাত জব বলে।

ছুর্লতায় কেবল, সলকাব, চায়না বা ফসকবিক এসিড ব্যবহৃত হয় । আক্ষেপে ।
—বেল (পূর্ণরক্ত বোগী), এসিড-হাইড্রোসায়েনিক (ক্ষীণরক্ত বোগী),
ইয়েশিয়া (পৃষ্ঠবংশজ ও কুমিজ আক্ষেপ), দিনা (কুমিজ আক্ষেপ) ।

পণ্যাপণ্য ।—সাত, এনারকট, ছুঙ্গ ইত্যাদি লঘুপাক ত্বলদ্রব্য পণ্য
দেওয়া উচিত ।

অবিরামজ্বর-দি কণ্ঠনিউড ফিবাস ।

[১] সামান্য জ্বর—সিম্পল ফিবার ।

এই জ্বর সর্বাঙ্গেন্দ্রিয় মৃদু । ইচ্ছা ১২ হইতে ৩৬ ঘটিকাব মধ্যেই
বিরাম পায় । এই নিমিত্ত ইতাকে একাদিনস্থায়ী জ্বর বা একি মারাল
ফিবার বলে । •

লক্ষণ ।—অপরাজে বা সফ্যাকালে অল্প অল্প অবাক্রমণ, প্রথমতঃ
শীত, অনন্তর উত্তাপ ও স্বকৈব কক্ষতা ; দূত, পূর্ণ, দ্রুত নাড়ী ; লেপাস্থিত ও
গুরু জিহ্বা ; পিপাসা ; দ্রুত শ্বাস, লোহিত বর্ণ ও অল্প মুত্র । অপিচ,
সচবাচব কটিবেদনা, অঙ্গ-গ্রহ, শিরঃপীড়া, অস্বাভাবিক ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ও ক্ষুব্ধমান্দ্য
ইহাব প্রধান লক্ষণ ।

সময়ে সময়ে অন্যান্য গুরুতর বোম্বের পূর্বকপ স্বরূপ ও এই জ্বরের লক্ষণ
প্রকাশিত হইয়া থাকে অতএব প্রথমেই ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে ভাবী
রোগেরও অনেকাংশে শমনতা ক্রমে ।

কারণ ।—ঘর্ষাববোধ, হিন বা আদ্রতা ভোগ, সহসা ঋতু-পরিবর্তন,
আর্দ্রবস্ত্র পরিধান ; অপুষ্টিকর বা অপর্ণ্যাপ্ত আহাব গ্রহণ ; আভ্যন্তরিক বা
বাহ্যিক উপঘাত প্রাপ্তি ; এবং শ্রান্তি সামান্য জ্বরের কারণ । কখন কখন
অন্যান্য জ্বরের প্রকাব-ভেদ স্বরূপেও এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—কেবল একোনাইট দেবন করাইলেই সামান্য জ্বর
আরোগ্য হইয়া থাকে । ২৩ ঘণ্টা অন্তর এক একমাত্রা ঔষধ দেবন কবান

কর্তব্য। নিত্যস্থ আবশ্যক হইলে, এক বা অর্ধ ঘণ্টা অন্তরও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উষ্ণ ও শুষ্ক স্থান; একবার শীত একবার দাহ; বেগবতীনাড়ী, কোষ্ঠবদ্ধ, হাঁচি, ঘানি; অস্থিরতা প্রভৃতি একোনাইটের লক্ষণ। একোনাইট সেবনান্তে ঘর্ম নিঃসৃত হইলে আর উহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রবল শিথঃপীড়া থাকিলে একোনাইট সহকায়ে পর্যায়ক্রমে বেলেডোনা দেওয়া বিহিত। সহসা শীত, কম্প এবং তৎসহকারে অবসন্নতা ও সর্পিগ্ধীন ঘানি লক্ষণে জরের, আক্রমণেব প্রারম্ভাবস্থায় সহ্য হই বিন্দু মাত্রায় কর্পূরের উগ্র অরিষ্ট চিনি সহ-যোগে ১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর সেবন করাইলে কেবল কর্পূর দ্বাবাই এই অব-আবোগ্য হইতে পারে। একোনাইটেব বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ অতিশয় অস্থি-রতা না থাকিলে এবং শীত, গৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা, শিবোবেদনা ও শিবোগোবধ, সঞ্চালনে অঙ্গিগোলকে বেদনা, পূর্ণনাড়ী সহ অব, এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে জেলসেমিনম ১৮ গ্রন ব্যবস্থেয়। এই ঔষধেও অনেক সময় এক-দিবসেব মধ্যেই গাত্রবেদনাব বিবতি জন্মিয়া ও ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া জরের বিরাম পড়ে। জরেব প্রাণনা লাঘব হইবাব পব রোগী শীঘ্র আবোগ্য লাভ না করিলে, অথচ তাহার হৃৎসলতা, আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, মুখে তিক্তা-বাদ, কোষ্ঠবদ্ধ, ও আরক্ত মুত্রাদি লক্ষণ থাকিলে ট্রাইওনিয়া তৃতীয়ক্রম ২৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা ব্যবস্থা করা যায়। কখন কখন এন্টি-ফ্রুড, সিকোনা, নক্সতমিকা প্রভৃতি ঔষদও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—জ্বের প্রবল অবস্থায় কোন পথ্য দেওয়া কর্তব্য নহে। কেবল রোগীব ইচ্ছানুসারে শীতল জল পান করিতে দেওয়া উচিত। শীতল জল পান করিতে দিলে ঘর্ম হইয়া শীঘ্র জ্বের বিরাম হয়। জ্বের বিরতির পর খই, যবের মণ্ড, দাণ্ড, আরাকট, তণ্ডুলেব কাথ, সূজীর কটী ইত্যাদি পথ্য দিবে। বেদানা, কিস্মস্, পানীফল প্রভৃতি ফলও দেওয়া যাইতে পারে। পুনরায় জ্ব অসিধ্যাৎ আশঙ্কা দূব হইলে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মসুর বা মুগের দাউলের ঝোল, ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল পথ্য দিবে। কোন প্রকার গুরুতব আহার ব্যবস্থা করিবে না। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে স্নান করিতে দিবে।

[২] সামান্য সন্তত জ্বর—সিম্পল কণ্ঠিনিউড ফিবার ।

এই জ্বর এক হইতে তিন দিন অথবা ততোধিক কাল বিদ্যমান থাকে ।
যখন ১২ বা ২৪ ঘটিকার মধ্যে অরলক্ষণ সমস্ত উপশমিত হয়, তখন ইহাকে
সামান্য জ্বর বা একিমারাল ফিবার বলা যায় । কিন্তু ফুসফুসপ্রদাহ, তরুণ
আমবাত, টাইফস্ জ্বর প্রভৃতির পূর্বরূপ স্বরূপ এই জ্বর হইলে ইহা উৎকট
আকার ধারণ করে ।

কারণ ।—ঋতু-পরিবর্তন, অধিকক্ষণ রোদ্রভোগ ; আর্দ্রবস্ত্র ধারণ
বা আর্দ্র গৃহে বাস ; অপরিপুষ্ট বা অতিরিক্ত আহার গ্রহণ ; মাদক সেবন ;
উপঘাত প্রাপ্তি, মানসিক বা শারীরিক শ্রান্তি অথবা উত্তেজনা সামান্য সন্তত
জ্বরের উদ্ভাপক কারণ । টাইফস্ বা টাইফয়েড্ জ্বাঃদি জ্বরের বিশেষ বিধের
ক্রিয়া, স্থানিক বা সর্বাঙ্গীন ক্রিয়া-বিকার ; অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার ও সৈন্তজ্ঞসঙ্ক-
রাদি বশতও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে । কখন কখন কোন স্পষ্ট
কারণ নিরূপণ করা যায় না । পুতিবাস্প (ম্যালেরিয়া) এই জ্বরের
কারণ নহে ।

লক্ষণ ।—প্রথমতঃ শীতাহতব, পৃষ্ঠ ও শিরোবেদনা, ক্ষুধামান্দ্য ও
ক্রান্তনাড়ী ; অনন্তর গাঢ়ের উত্তাপ ; নাড়ীর বেগ, নাড়ীর স্পন্দন ১০০—১২০
বার, ওষ্ঠ ও জিহ্বাশোথ, পিপাসা, স্বপ্ন ও আরক্ত মূত্র, কোষ্ঠরোধ
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । অধিকাংশ লক্ষণ সাধারণতঃ রাত্রিকালে
বৃদ্ধি ও প্রত্যাঘে হ্রাস পায় । তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসান্তে, কচিং বা
পঞ্চম কিবা ষষ্ঠ দিবসে প্রচুর ঘর্ম হইয়া জ্বরের বিচ্ছেদ হয় । কখন
কখন ঘর্ম না হইয়া জ্বরের শেষাবস্থায় নাসিকা বা জরায়ু হইতে রক্ত-
স্রাব, উদরাময় ও ওষ্ঠে অরস্ফোট প্রকাশিত হইয়া জ্বরের বিরাম পড়ে । এই
জ্বরে হ্রনিবার বমন ও আহার ধারণে অসমর্থতা ইত্যাদি আশাশয়িক লক্ষণ
বিদ্যমান থাকিলে ইহাকে আশাশয়িক জ্বর (গ্যাষ্ট্রিক ফিবার) বলে । পিত্ত

বা শ্লেষ্মা লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারে কেহ কেহ ইহাকে পিত্তজ্বর বা শ্লেষ্মাজ্বর (বিলিয়স অব মিউকস ফিবার) বলিয়া থাকেন। এই অব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে জিহ্বা শুষ্ক ও কপিশবর্ণ, উদর ক্ষীণ এবং অঙ্গিমার উপস্থিত হয় ও সামান্য সন্তত জ্বর সন্নিপাত অব্বে পরিণত হইবার আশঙ্কা জন্মে।

এই জ্বরে শরীর-তাপ কতিপয় ঘটিকার মধ্যে ১০২, ১০৩ বা ১০৪ অংশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এই তাপ এক বা দুই দিনের অধিক থাকে না। ২৪ বা ৩৬ ঘটিকার মধ্যে শরীর-তাপ হ্রাস পড়িলে এবং অত্যন্ত অল্পকাল লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থানেব অতিরিক্ত উষ্ণতা সামুদ্রিক বায়ু দ্বারা নিবারিত হয় না সেই সমস্ত স্থানে অর্থাৎ মহাস্থর, দণ্ডকারণা ও পঞ্জাবাদি প্রদেশে এই জ্বরের যত প্রাবল্য বোধাই ও বঙ্গদেশে তত নহে।

চিকিৎসা।—ব্যাপ্টিসিয়া এই জ্বরের অমোষ ঔষধি। মূল বা ১ম ক্রমের অরিষ্ট দুই ঘণ্টা অন্তর ১১২ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যথাসময়ে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র জিহ্বা পবিত্র হইয়া, আহার গ্রহণ ও পরিপাক করণে সামর্থ্য জন্মে এবং সন্তত জ্বর সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু বোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় সন্নিপাত লক্ষণ প্রকাশান্তে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে আর্সেনিকই বিশেষ উপযোগী ঔষধ। এই জ্ববে অপর কতকগুলি ঔষধেরও ব্যবস্থা আছে। সেগুলি যদিও ইহার অমোষ ঔষধ নহে তথাপি উহাদের প্রয়োগ-লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারে ব্যাপ্টিসিয়া সহকারে পর্যায়ক্রমে অথবা স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহাব করা যাইতে পারে, যথা ;—পর্যায়ক্রমে শীতান্তাপ, উত্তপ্ত ও রুদ্ধ ব্রহ্ম, হাঁচি, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে একো'নাইট ; প্রবল শিরঃপীড়া, কপালপ্রান্তের শিবাম্পন্দ, মুখমণ্ডলের আব্রুতা, নেত্রের প্রচণ্ডতা, অনিদ্রা, রাত্রিকালে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ; শিরোগোরবর্ধিত শিরঃপীড়া (মস্তক সঞ্চালনে এই শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পায় এবং বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে), কাস, শ্বাসকষ্ট, আমাশয়ে চাপাভ্রুব, পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবোধ, কপিশ বা পীতবর্ণ মূত্র, গাত্রবেদনা, কোপনতাদি লক্ষণে ট্রাইওনিয়া প্রয়োজিত হয়। এতদ্ব্যতীত ওপিয়াম, ক্যাসোগোমিলা, নক্সভর্মিকা, পলমেটীলা,

মারকুরিয়স, ইপিকাপ, জেলসিমিয়ম, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এণ্টিমোনিয়ম টার্টেরিকম, চায়না, কুইনাইন প্রভৃতি ও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও রোগ উপশম প্রাপ্ত না হইলে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে উহা সম্ভবতঃ সন্নিপাত জ্বর (টাইফয়েড ফিবার) বলিয়া স্থির করা উচিত ও তদনুরূপ চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

পথ্যাপথ্য, —বোগীর গৃহে অধিক আলোক, উত্তাপ, গোলমাল ও লোক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে । রোগীকে অধিক বস্ত্রাবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখাও অকর্তব্য । যাহাতে বোগীব উত্তেজনা জন্মে অথবা নিদ্রার বাধা হয় তাহা নিবারণ করা আবশ্যক । অব্যব প্রারম্ভাবস্থায় উষ্ণজলে পাদ-স্বেদ (ফুট-বাথ) বিশেষ ফলপ্রদ । এতদ্বারা রক্তসঞ্চালনের সামঞ্জস্য জন্মে ও বোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় । অল্পপরিমাণে বারংবার শীতল জলপান ব্যবস্থেয় । শীতল জলপানে পাদস্বেদের উপকারিতা বর্দ্ধিত হয় । এই জ্বরের প্রবল অবস্থায় শীতল জল ও লঘুপাক পাতলা পেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন পথ্য ব্যবস্থেয় নহে । অগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে যবের মণ্ড, ধৈয়ের মণ্ড, আরাকট বা সাণ্ডর মণ্ড, অন্নমণ্ড ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে সহ পাইলে অন্নাদি অতরল পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

—:—

[৩] সন্নিপাত জ্বর — টাইফয়েড ফিবার ।

টাইফস জ্বরের সহিত সাদৃশ্য থাকাতে ইহার নাম টাইফয়েড জ্বর । টাইফয়েড জ্বরে সচরাচর অল্প আক্রান্ত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে এণ্টারিক ফিভার বা আন্ত্রিক জ্বরও বলে । দূষিত পয়ঃপ্রণালী ইহার উৎপত্তির অন্ততর কারণ বিধায় ইহার সামান্য নাম ডেণ-ফিবার । ইহা মুক্তানুবন্ধী নহে অর্থাৎ তাগ হইয়া পুনরায় উত্থিত হয় না । এদেশীয় কবিরাজেরা সচরাচর ইহাকে সন্নিপাত জ্বর বা বাত শ্লেষ্ম-বিকার বলিয়া থাকেন । টাইফয়েড জ্বর কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপক ও স্পর্শ-সংক্রামক । জ্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই ইহা অধিকতর স্পর্শ-সংক্রামক হইয়া উঠে । পরিণতবয়স্ক অপেক্ষা যুবকগণই

এতদ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ও নবেম্বর মাসে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় ।

কারণ ।—এই জ্বর মলিনতা বা দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হয় । বিগলিত জাস্তব পদার্থ, পরঃপ্রণালী (নবদামা) অথবা মলিন জলাশয়াদি হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিযাক্ত বাষ্প দ্বারা বা পানীয়জল দূষিত হইয়া এই বোগ জন্মে । সুপ্রসিদ্ধ ক্লেবস্ বলেন যে ব্যাকটিরিয়া নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে টাইফয়েড জ্বর উৎপন্ন হয় । জনাকীর্ণ ও বিগুদ্র বায়ু-বিবর্জিত স্থলেই ইহা বিশেষ প্রাদুর্ভূত হয় । এই জ্বরগ্রস্ত রোগীর মল-মূত্রে দূষিত জলাশয়ের জল ব্যবহার অথবা উক্ত জল মিশ্রিত দুগ্ধপান বারাও এই বোগ জন্মে ।

ডাঃ হার্লি বলেন যে (১) পবিত্রাক্ত জাস্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ অন্যত্রুষ্টি কালে সঞ্চিত ও বিগলিত হইলে উহা হইতে একপ্রকার বিযাক্ত পদার্থ সমুদ্ভূত হয় । এই বিব প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিব জলে দ্রবীভূত ও প্রক্ষালিত না হইলে বায়ুতে উথিত বা জলে বিকীর্ণ হয় এবং জলবায়ু সহযোগে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া টাইফয়েড জ্বর উৎপন্ন কবে । (২) আহাৰ্য বা পানীয় দ্রব্য দূষিত হইয়াও এই বোগ জন্মিয়া থাকে । (৩) অত্র কতকগুলি তরুণ বোগের ভোগ-কালে সর্কান্ট্রীন প্রাদাহিক অবস্থা বশতও এই জ্বরের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে । বয়ঃক্রম, ঋতু, তাপ, ও বায়বীয় পরিবর্তনাদি ইহার পূর্ববর্তী কারণ ।

লক্ষণ ।—টাইফয়েড জ্বর সাধাবণতঃ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় । ইহার পূর্বরূপ অবস্থা ছয় হইতে চৌদ্দ দিবস অবস্থিতি করে । কখন কখন এই রোগ অতি সূত্রবৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । রোগ বিকাশ পাইবার সময় রোগী অলসতা, ও একপ্রকার ম্লানি অনুভব করে, এবং সহজেই প্রাস্ত হইয়া পড়ে । তাহার ক্ষুধামান্য, শরীরাত্যন্তরে বেদনা, এবং জিহ্বায় একপ্রকার জঁষৎ শুভ্র লেপ বিদ্যমান থাকে । কয়েক দিবসের মধ্যে শীতানুভব, শিরো-বেদনা, কিয়ৎপরিমাণে আলোকাসহতা, জিহ্বার লেপের প্রগাঢ়তা ও উহার অপ্রত্যাহার আৱকতা, অতিশয় দুর্বলতানুভব, নাড়ীর ক্ষীণতা, উদরের অল্প অল্প স্পর্শ-দেব এবং ক্রমশঃ অধিক অনিদ্রা লক্ষণ উপস্থিত হয় । রাত্রিতে গাত্রের উত্তাপ, অস্থিবেদনা, ও অতিশয় পিপাসা, এবং অল্প অল্প বিবমিষা জন্মে ।

সাধারণতঃ কিয়ৎপরিমাণে অতিসার থাকে । বোগ যতই বর্ধিত হইতে থাকে এই সমস্ত লক্ষণ ততই তীব্রতর হইয়া উঠে এবং অন্তান্ত অতিরিক্ত লক্ষণও আবির্ভূত হয় । মুখমণ্ডলের অবসাদ ও পাঞ্জুরতা ; গণ্ডস্থলের আর-জ্বতা ; নেত্রের নিমগ্নতা ; মূতের স্বল্পতা, ও সময়ে সময়ে অবরুদ্ধতা ; নাড়ীর সমধিক ক্রততা ; গাত্র-তাপেব বিবৃদ্ধি ; শ্বাসের দুর্গন্ধ ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও কপিশতা ; জিহবার নীবসতা, বিদীর্ণতা ও কপিশবর্ণ ; দন্তে দন্ত-শর্করার সঞ্চয় ; উদরে, বিশেষতঃ দক্ষিণ শ্রোণি-গহ্বরে স্পর্শ-দেয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । এক্ষণ বোগী আব শিরোবেদনার কথা বলেনা । সে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া পড়ে । মুখ-শোষ সত্ত্বেও বিশেষ কিছু পান বা আহাব করিতে চায়না ; কোন বিষয়েব অভিযোগ কবেনা ; কোন প্রশ্ন কবিলে ধীরে ধীরে উত্তর দেয় ; “কেমন আছ,” জিজ্ঞাসা করিলে “ভাল আছি” বলে, ইন্দ্রিয়ের, বিশেষতঃ শ্রুতিশক্তিব ক্ষীণতা জন্মে । স্পর্শ-জ্ঞান স্তব্ধ হয় । সময়ে সময়ে কনীনিকা প্রসারিত দেখা যায় । অধিকাংশ বোগীবই প্রলাপ উপস্থিত হয় । সাধারণতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেই প্রলাপ প্রকাশিত হইয়া থাকে । প্রলাপ মৃদু বা তীব্র উভয় প্রকারই হইতে পারে । কিন্তু প্রায়ই উহাতে প্রচণ্ডতা লক্ষিত হয় না, তবে সময়ে সময়ে উচ্চ চিৎকার ও গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা বর্তমান দেখা যায় । কখনও বা রোগীর অদ্ভুত কল্পনা উপস্থিত হয় ও তাহা প্রতিনিয়তই বিদ্যমান থাকে । সচরাচর অসংলগ্ন মৃদু প্রলাপ, স্থান-পরিবর্তন-প্রবৃত্তি, ও অবাস্তব আভ্যন্তরীণ নিকট হইতে পলায়ন-চেষ্টাই সমধিক প্রকাশ পায় । প্রলাপেব সহিত শয্যা-বস্ত্র খুঁটন বা শূন্তে অবাস্তব পদার্থ বাস্তব বলিয়া ধাবণ লক্ষণও থাকে ।

অধিকাংশ রোগীব পেশীর স্পন্দন, বিশেষতঃ হস্তের পেশীর স্পন্দন পরিলক্ষিত হয় । ইংরেজীতে ইহাকে “সবসলটস টেণ্ডেন্স” কহে । রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে ওদন্ত মোহে পন্নিগত হয়, ও কখন কখন উহার সহিত শ্বাসের ঘড় ঘড় শব্দ বর্তমান থাকে ।

এই জ্বরের, সহিত প্রায়ই উদরাময় থাকে এবং গেরিমাটির বর্ণ বা দাই-লের ঝোলের ভ্রায় বিরেচন হয় । কোন কোন রোগীর আবার অতিসার না জন্মিয়া কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে । রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে অনিচ্ছায় শলশ্রাব হয়,

অথবা মূত্রগুস্ত জন্মে এবং বিন্দু বিন্দু করিয়া মূত্র পাত্ত হয়। কাহাব কাহারি, অল্প হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই রক্তস্রাব সঙ্কটচূচক মনে কবেন, কেহ কেহ বা ইহা তত বিপদজনক বলেন না।

উদরাগ্নান ও অস্ত্র-কূজন টাইফয়েড জ্বরের অপর অস্ত্র-লক্ষণ। আগ্নান, অস্ত্র-কূজন, দক্ষিণ শ্রোণীদেশে স্পন্দ-দ্রব, এবং হরিতালের বর্ণের স্তায় পীতবর্ণ অতিসার, এই চারিটা এই রোগের বিনির্ণয় লক্ষণ। ইহাতে উদরের ক্ষীততা সচরাচর তত অধিক থাকে না এবং অস্ত্রে বাস্প সঞ্চিত হইয়াই অস্ত্র-কূজন জন্মে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে গাত্রে টাইফয়েড জ্বরের প্রাকৃতিসিদ্ধ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই পীড়কা অপচ্যমান, ক্ষুদ্র, ঈষৎ উন্নত, ও অপ্রগাঢ় পাটিলবর্ণ। অঙ্গুলীদ্বারা চাপিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হয় এবং দুই তিন দিনের মধ্যে নিশিয়া যায়। অনন্তর আবার নূতন পীড়কা প্রকাশিত হয়। এদেশীয়দিগেব শ্রামবর্ণ শরীরে এই সকল পীড়কা মশক দংশনের স্থায় দেখায়। পীড়কা সর্বদা বিন্যাসমান থাকেনা, কখন কখন কেবল উহার দুই একটা চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয়। সচরাচর জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদই উৎপন্ন হয় এবং ঘাড়ে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে উহা প্রকাশ পায়। উদ্ভেদ গুলিতে এক প্রকার তরল পদার্থ বা মস্ত সঞ্চিত থাকে। দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগে গাত্রে কালিমা বা কালশিরা জন্মে। সহজসাধ্য রোগে, বিশেষতঃ বালকদিগের অরে পীড়কা উৎপন্ন হইবাব পরে জ্বরের হ্রাস পড়িতে থাকে। কতকগুলি রোগীর অত্যন্ত ঘর্ষস্রাব হয়। ক্রমাগত ঘর্ষস্রাব স্রলক্ষণ নহে।

এই রোগে মধ্যে মধ্যে সাবহিত হইয়া রোগীর ফুসফুস পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, টাইফয়েড জ্বরে যে কোন সময়ে রোগীর ফুসফুস-প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। শরৎকালের জ্বরেই এই উপসর্গ অধিক জন্মে, কিন্তু রোগী ঔদাস্তবশতঃ সে সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করে না। ইহাতে কাসের প্রায়ই উগ্রতা থাকেনা, কেবল মধ্যে মধ্যে ‘খক খক’ শব্দ শুনা যায়। আকর্ষণ করিলে ফুসফুসের উপসর্গ বিদিত হওয়া যায়। টাইফয়েড জ্বরে কখন কখন কর্ণ-মূল প্রদাহিত ও পবিপক হয়। এই রোগে কর্ণ-মূল-প্রদাহ স্রলক্ষণ নহে। এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে রোগী আবোগ্য হইলেও শীঘ্র আরোগ্য লাভ

করিতে পারে না। টাইফয়েড জ্বরে অল্প কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন আত্মবলিক উদরাময় বর্জিত ও দুর্বলকর হইয়া সন্নিপাত জ্বর সঙ্গতজনক হইয়া উঠে। কখনও বা অল্প হইতে অধিক পরিমাণে বসন্তপাত হয়। দ্বাবিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি দিবসের মধ্যে অল্পে ছিদ্র জন্মিতে পারে। এই শেষোক্ত উপসর্গ উৎপন্ন হইলে হিমাক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অত্যন্ত আধান, দুর্নিবার হিকা, ও বমনাদি লক্ষণও দৃষ্ট হয় এবং রোগী প্রায়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। টাইফয়েড জ্ববে অল্প-প্রদাহ, গীহা বা যক্ষ্মে বিবর্দ্ধনাদি উপসর্গও সম্ভব-পব। কখন কখন বমনাদি লক্ষণাপন্ন তীব্র আমাশয়িক উপদাহও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

টাইফয়েডজ্বরে তাপমানদ্বারা প্রতিনিয়ত বোগীর গাত্র-তাপ পরীক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যুষে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হয়, অথবা কোন সময়ে ১০৭ ডিগ্রীর উপরে উঠে, তবে প্রায়ই এই বোগ আরোগ্য হয়না। প্রথম সপ্তাহে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উন্নত হয়; দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে একই প্রকার অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে ১০৫ ডিগ্রীর একটু উর্দ্ধে ও প্রাতঃকালে ১০৫ ডিগ্রীর একটু নিম্নে থাকে; তৃতীয় সপ্তাহে প্রাতঃকালের গাত্রতাপ কিঞ্চিৎ নূন হয়; চতুর্থ সপ্তাহে ক্রমশঃ হ্রাস পড়িতে থাকে। সাধাবণতঃ এই অব্বে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক বুদ্ধি পায়না। ১০৫ ডিগ্রী অপেক্ষা বৃদ্ধি বিপজ্জনক। এবং আকস্মিক বা অনিয়মিত বুদ্ধি অভ্যন্তরিক যন্ত্রে উপসর্গ জ্ঞাপক। সম্ভবতঃ ফুসফুসে রক্ত-সঞ্চয় হইলেই এইরূপ ঘটে। গাত্র-তাপ অধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইলে অল্প হইতে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা। অল্প হইতে রক্তস্রাব হইবার পূর্বে কখন কখন সহসা গাত্র-তাপের লাঘব ও নাড়ীর বেগের পরিবর্তন জন্মে। ক্রমাগত গাত্র-তাপের হ্রাস ও অত্যন্ত লক্ষণের উপশমে আরোগ্যোন্মুখতা বৃদ্ধি যায়; কিন্তু সহসা গাত্র তাপের হ্রাস ও অত্যন্ত লক্ষণের অল্পশম কুলক্ষণ। বোগ অত্যন্তকট আকারের হইলে প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেই উপশমিত হইতে থাকে, অর্থাৎ জ্বরের বিরামকাল স্পষ্ট, উদরাময় হ্রাসপ্রাপ্ত, জিহ্বা পরিষ্কৃত ও অঙ্গ-বেদনা দূরীকৃত হয়; গাত্র-তাপ হ্রাস পড়ে এবং নিদ্রা ও ক্ষুধা জন্মে। উৎকট আকারে হইলে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্য-ভাগে প্রলাপাদি গুরুতর লক্ষণ সকল

উপস্থিত হয়; এবং মৃত্যু-সম্ভাবনা হইলে সম্পূর্ণরূপে রোগীর সংজ্ঞা নাশ প্রাপ্ত, ও গাত্রতাপ বিবর্তিত হয়। এই রোগের ভোগকাল গড়ে আর ২৮ দিন। সাধারণতঃ প্রথম ষোল দিবসের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়। এক পক্ষ জীবিত থাকিলে তাহার আরোগ্যের সমধিক সম্ভাবনা।

বিনির্ণয়।—সুতীত্র স্বপ্নবিবাম অর, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, এন্টি-ব্রাইটিস, ও মিনিঞ্জাইটিস বোগের সহিত টাইফয়েড অরর বিনির্ণয়ে ভ্রম কল্পিতে পারে। কিন্তু গাত্র-তাপের পরিমাণ দ্বারা অন্তান্ত ব্যাধি হইতে টাইফয়েড অরের প্রভেদ করা যায়। সাধাবণতঃ এই অরে গাত্রতাপবৃদ্ধির ক্রম এইরূপ—প্রথম দিবস প্রাতঃকালে ৯৮.৫, সন্ধ্যাকালে ১০০.৫; দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে ৯৯.৫, সন্ধ্যাকালে ১০১.৫, তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে ১০০.৫, সন্ধ্যাকালে ১০২.৫, চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে ১০১.৫, সন্ধ্যাকালে ১০৪, চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালের গাত্র-তাপ ১০৩ হইতে ১০৪ তাপাংশ, এবং প্রাতঃকালে উহা অপেক্ষা প্রায় এক তাপাংশ নূন থাকে।

ভাবতবর্ষে যেসকল টাইফয়েড অর দৃষ্ট হয় স্বপ্ন-বিবাম অরের লক্ষণের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য থাকে, এদেশে সন্নিপাত অরে ও ঈষৎ বিবাম দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ, বমন, বিরেচন, মস্তিষ্ক-পীড়ার উপসর্গ উভয় অরেই বিদ্যমান থাকিতে পারে। সন্নিপাত অবের প্রকৃতিসিদ্ধ পীড়কা এতদেশে প্রায়ই প্রকাশ পায় না। সুতরাং সন্নিপাত ও স্বপ্ন-বিবাম অরের প্রভেদ নিরূপণ করিতে হইলে তাপমান যত্নবারা গাত্রতাপ পরিমাণ করার নিত্য আবশ্যক পড়ে। সন্নিপাত অবের ছায় স্বপ্ন-বিবাম অরে প্রথম হইতে চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত গাত্রতাপ বৃদ্ধির কোন নৈকীকৃত নিয়ম দৃষ্ট হয় না; এবং সকল স্থলেই প্রাতঃকালের তাপ অপেক্ষা সন্ধ্যাকালের তাপ বৃদ্ধি পায় না। অধিকতর, স্বপ্ন-বিবাম অরের স্বপ্নবিবাম বা মগ্নাবস্থা টাইফয়েড অর অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট থাকে। নিউমোনিয়ার পূর্সরূপ অবস্থার লক্ষণ; এবং টাইফয়েড অবের অরর আক্রমণের পরে নিউমোনিয়া উপসর্গের উপস্থিতি দ্বারা টাইফয়েড অর ও নিউমোনিয়ার প্রভেদ করা যায়। কিন্তু দক্ষিণ প্রোংগম্বরে (ইলিয়াক ফোলা) বেদনা ও স্পণ-শ্বেষ, পীত, হরিতালের বর্ণের ছায় বিরেচন; এবং প্যাটল বর্ণের (গোলাপী রঙ্গের) পীড়কা; এই কয়টাই

টাইফয়েড জ্বরের প্রধান বিনিশ্চয় লক্ষণ । এই সকল বর্তমান থাকিলে অস্ত্রের প্রদাহ বিদ্যমান আছে বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে ।

প্রজ্ঞান ।—কোন কোন ক্ষত্রে টাইফয়েড জ্বরে অধিক সংখ্যক, কোন কোন ক্ষত্রে অল্প সংখ্যক বোগী মরে । আবার, কোন বৎসর বহুলোকের, কোন বৎসর বা অল্প লোকের মৃত্যু হয় । কোথাও বা টাইফয়েড জ্বর বিহুটিকা ব্রাদ ব্যাপক আকারে উপস্থিত হইয়া বিস্তৃত লোকের প্রাণ নষ্ট করে । এই বোগে শতকরা গড়ে ৮ হইতে ১৫ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে । বোগের তীব্রতাসমাবেই ভাবী ফল নিকৃষ্ট হয় । প্রথমাবস্থায় প্রবল প্রলাপ চরু লক্ষণ । তজ্জাদোষ, আক্ষেপ, সুস্পষ্ট কণ্ডরোংক্ষেপ, শব্দাবজ্ঞা খুঁটন, প্রতিনিয়ত প্রবল প্রলাপ, কর্ণ-মূল-প্রদাহ, অল্প হইতে প্রভূত রক্তস্রাব, ও অতিশয় অবসন্নতা, টাইফয়েড জ্বরে এই গুলি অন্তত লক্ষণ । মোহ বা প্রবল প্রলাপ অতিশয় গুরুতর লক্ষণ এবং বোগের ভাবী ফলের অবধারিত অন্তত প্রাপক । অতিশয় অবসন্নতা, ক্ষীণ ও অতি দ্রুতনাড়ী ও তজ্জপ অমঙ্গলসূচক । গাত্র-তাপের ১০৬ ডিগ্রীর উপরে উত্তীর্ণ, অথবা স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা নীচ নীচ অধঃপতন উভয়ই বিপদজনক । গর্ভাবস্থায় এই রোগ জন্মিলে প্রায়ই এতদ্বারা গর্ভপাত হয় এবং তজ্জনিত প্রভূত রক্তস্রাব নিবন্ধন রোগিণী মৃত্যু হইয়া থাকে । মোহ, প্রলাপ, অতিশয় অবসন্নতা, বা গর্ভাবস্থা না থাকিলে বোগীর আরোগ্যলাভের আশা করা যাইতে পারে । আবোগ্যামুখ অবস্থায়ও অল্প-ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে ।

সম্প্রাপ্তিগত শরীর-বিকার ।—টাইফয়েড জ্বরের বিষে জড়িত হইয়া বা ইলিয়মেব বিকৃতি দৃষ্ট হয় । কখন কখন মস্তিষ্কের বক্রসঞ্চয়, আমাশয়ের কোমলতা ও ক্ষত, প্রাণ ও যকৃতের বিরুদ্ধি প্রভৃতিও পবিলক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু সচরাচর পেয়ারাখ্য গ্রন্থি, নিঃস্র (সলিটারি) গ্রন্থি, ও মধ্যস্থ গ্রন্থিরই বিকৃতি জন্মে । এই রোগে সহস্র মৃত্যু হইলে জড়িতাত্ত্বেব শৈল্পিক কিল্লী বক্ষীততা এবং পেয়ারাখ্য গ্রন্থি ও নিঃস্র গ্রন্থির প্রদাহ লক্ষিত হয় । বিলম্বে মৃত্যু হইলে গ্রন্থিগুলিতে ক্ষত ও কখন কখন অস্ত্রে রক্ত দেখা যায় । মধ্যস্থ গ্রন্থি ক্ষীত হয় ও কখন কখন পচিয়া অল্প-বেষ্ট-গহবরে নিপতিত হয় । জড়িতাত্ত্বেব ও অক্ষাত্ত্বেব মধ্যস্থ কপাটের সমোপবর্তী গ্রন্থিগুলি হ

সমধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । অল্প-বেধ জন্মিলে সাধারণতঃ অকাত্তের জ্বর হকির ন্যায় হইবে । জড়িতাত্তের শেষে দুই তিন ইঞ্চি অভিশয় ক্ষীত দৃষ্ট হয় । কাত্তান কাত্তান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত-একটি গভীর ও বহু বহু ক্ষতে পরিণত হয় এবং উহা ক্ষীত ও আবদ্ধ শৈথিল্যক বিলীলাবা পরিবেষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায় । কখন কখন অক্ষাত্ত ও কৃতাত্তের গ্রন্থিতেও প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে ।

সকল বোগীদই প্রাচীন অল্পবিস্তার বক্ত-সঞ্চয় জন্মে, উহা সাধারণতঃ বিবর্জিত হয়, কখন কখন উহা স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পায় ; বর্ণ মলিন হয়, এবং প্রাচীনাতিশয় নবন হইয়া পড়ে, এত নবন হয় যে সহজেই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় যে পাবে । অধিকাংশ বোগীদই কুসক্কসের প্রদাহ ও দৃঢ়তার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । ডাঃ লুইস বলেন যে অস্ত্রাত্ত রোগ অপেক্ষা টাইফয়েড অবৈ কুসক্কসই অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

সম্প্রাপ্তি ।—রক্তে এক প্রকার দূষিত পদার্থের সম্প্রবেশই সাধারণতঃ টাইফয়েড অবৈ উদ্যোগক কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । কিন্তু এই বিষাক্ত পদার্থের প্রভাবে কিরূপে টাইফয়েড অবৈ বিবিধ শারীরিক পরিবর্তন বিশেষতঃ অস্ত্রের বিধান-বিকার সমুৎপন্ন হয় তাহাই পর্যালোচনা করা কর্তব্য । সম্ভবতঃ বক্ততের রক্তবহা নাড়ীতে রক্তসঞ্চয় অথবা উহার নিঃস্রব-নিঃসারিণী নাড়ীতে বিবেশ প্রভাব বশতঃ বক্ততের ক্রিয়ায় অল্পাধিক বৈলক্ষণ্য ও স্তম্ভতা জন্মে । বক্ততের শৈথিল্য সক্ত-সঞ্চয়ন কোন দূষিত পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে বক্ততের স্বাভাবিকী ক্রিয়ায় উহা লিপষ্ট বা বিনির্গত হইয়া থাকে । কিন্তু প্রবিষ্ট বিবেশ প্রভাবে যদি বক্ততের এই বিব-নিঃসারিণী শক্তির ন্যূনতা জন্মে এবং পিত্তের গুণাস্তন উপাহত হয় অর্থাৎ উহার গাঢ়তা, গুরুত্ব, ও আবদ্ধ নষ্ট হইয়া পিত্ত জলবৎ, লনকারাম, বা অল্প হইয়া উঠে তাহা হইলে ভুক্তদ্রব্যের আমলস (কাইন) অময়াক্ গুণবৎ পিত্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া অল্প-পথে উপদাহ উৎপন্ন করে ও বাষ্প জন্মায় এবং তজ্জন্ত অল্প ক্ষীত ও উপদাহিত এবং পেরাবাধ্য গ্রন্থি ও অসমবেষ্টগ্রন্থি ক্ষতগ্রস্ত হইয়া পড়ে । এই সকল গ্রন্থি অভিশয় নাড়ীনিয় ও হৃদ্যদের কোবনয় বিনান অধিকতর ক্ষুদ্রায়

বলিয়া অস্ত্রের অত্যাচ্ছ গ্রন্থি অপেক্ষা ইহারাই অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকে । জড়িতাস্ত্রের (ইলিয়ন) নিম্নভাগে গ্রন্থিগুলিই সমধিক পীড়িত হয় । তাহার কারণ এই যে জড়িতাস্ত্রের এই স্থানেই অধিক সংখ্যক গ্রন্থি অবস্থিত আছে এবং এই স্থানেই জড়িতাস্ত্র অক্ষাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে সংযোগস্থলে অস্ত্রের অংশস্বর নলবারেব ছাণাবরক-পেশীর আকার ধারণ করিয়াছে । সুতরাং উহার তন্ত্রগুলিও নির্মাণ-গুণে ঐ সংযোগস্থলের অপেক্ষা দিকে শৈরিকরক্কের গতি জন্মিতে না পারাতে সংযোগস্থলের নিকটবর্তী অস্থানেই রক্তসঞ্চয়ের সমধিক সম্ভাবনা জন্মে ।

চিকিৎসা ।—ব্যাণ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বসটক্স, ফসফরাস, ফসফিক এসিড, হাইওসায়েনাস, বেলেডোনা, কার্বো-ভেজি, মার্ক-সল, মিউব-এসিড, আর্সেনিকম, ও সিঙ্কোনা টাইবয়েড অপেক্ষা প্রধান ঔষধ । সচবাচর এই বোগে ব্যাণ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বসটক্স, ফসফরাস, ও হাইওসায়েনাসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাঃ ডিকিন্সন বলেন যে টাইফয়েড জ্বরে লক্ষণানুসারে কেবল ব্রাইওনিয়া ও বসটক্স প্রযোগেই তিনভাগেব দুইভাগ রোগী আরোগ্য লাভ করে, অবশিষ্টাংশেব অত্যাচ্ছ ঔষধের প্রয়োজন পড়ে ।

(১) পূর্বরূপ অবস্থায় ।—ব্যাণ্ট, ব্রাই জেলস, বস ; (২) প্রথম অবস্থায় ।—বেল, ব্যাপ্ট, ব্রাই, ক্যান, চায়না, জেলস, ডিজি, ডক, হাইওস, ইপিকাক, আইরিস, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভম, পলস, বস, ভিবাট-এষ, ভিরাট-ভির ; (৩) দ্বিতীয় অবস্থায় ।—পলস, মার্ক, ব্রাই, ব্যাপ্ট, বস, এপিস, এসিড-ফস, ক্যান, ক্যাক-কার্ক, ককু, হাইওস, সলফ, ভিবাট-এষ ; (৪) তৃতীয় অবস্থায় ।—ব্যাণ্ট, ব্রাই, বস, এসিড-ফস, বেল, ওপি, ক্যাক-কার্ক, নক্স-ভম, ভিরাট-এষ, চায়না, আস', এসিড-মিউর, এসিড-নাইট ; (৫) আরোগ্যানুখ অবস্থায় ।—চায়না, নক্স-ভম, পলস, ভিরাট-এষ, ককু, এলটোন ; (৬) উপসর্গে ।—[ক] নামিকা হইতে রক্তস্রাবে, —একন, মার্ক, ফস, পলস, বস, সলফ । [খ] অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবে, —টেরিবিস, হেসে, এসিড নাইট, এসিড ফস, আস', কার্বো-ভেজি, ইপিক, ফস । [গ] অন্ত্র-বেক্ট-প্রদাহে ; —আস', বেল, কার্বো ভেজি, ইপিক, মার্ক, ওপি । [ঘ] কর্ণ-মূল-প্রদাহে ; —একন, বেল, ক্যাক কার্ক ।

[ঙ] তালুমূল-প্রদাহে ;—একন, বেল, ব্রাই। [চ] স্ফোটকে ;—আর্স, বেল, লাইকো, সিলি, সলফ। [ছ] বধিরতায় ;—আর্গ, কস, এসি-কস, ভিরাট, চায়না, কুইনাইন। লক্ষণানুসারে এই সকল ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে।

পরিণাম অবস্থায় এই বোগে কাস, অগ্নিমান্দ্য, শিরঃপীড়াদি বিবিধ উপ-সর্গ উপস্থিত হয়। মাংসিক-লক্ষণে ;—বেল, হাইওল, জিকম, ওপিয়ম, রসটক্স ; বক্ষালক্ষণে ;—ফস, ব্রাই, আউওড, ইপি, সলফ ; অগ্নি-মান্দ্য ;—নক্স-ভম, কার্বো-ভেজি, ইথের, মার্ক ; অতিক্রোধায়,—চায়না ; নিম্নাঙ্গের শোথে,—আর্স, সিলি, লাইকো, সলফ ; শয্যাক্রান্তে,—মুছ ক্যাণেথুলা দ্রব ; দুর্বলতায়,—বলবিধানার্থ কয়েকমাত্রা সলফার, চায়না ; এই সকল ঔষধ ব্যবস্থেয় হয়।

প্রধান প্রধান ঔষধের বিশেষ লক্ষণ ।

(১) ব্যাপ্টিসিয়া* ।—টাইফয়েড অব সন্দেহ হইবামাত্র রোগের পূর্বরূপ অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া ১৮, এক বিন্দুমাত্রার ২০ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিলে জ্বরের প্রকোপ অনেকটা হ্রাস পড়িতে পারে। নাড়ীর কোমলতা, পূর্ণতা, ও দ্রুততা ; শিরঃপীড়া ও প্রলাপ প্রবণতা ; আবোগ্যে নৈরাশ্র ; শ্বাসে দুর্গন্ধ ; সর্কাস্কে-বেদনা, ও শয়নে বেদনামুক্ত অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ। (২) ব্রাইও-নিয়া ।—ব্রাওনিয়া টাইফয়েড জ্বরের প্রথম সপ্তাহেব সমস্ত লক্ষণের উপযোগী বলিয়া পূর্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ রোগের প্রারম্ভে দুর্বলতা, অলসতা, ক্ষুধা-হীনতা, জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ, অঙ্গ-ক্রান্তি, পেশীতে সঞ্চারমান বেদনা, ও বর্ষ-শূল জ্বালাকর উত্তাপ লক্ষণে এই ঔষধ বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসি-তেছে। অতিসার পরিশূন্য বোগীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে রোগের প্রবর্তিত অবস্থায়ও ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। (৩) রসটক্স ।—উদরাময় লক্ষণাপন্ন টাইফয়েড জ্বরে রসটক্স বিশেষ উপযোগী। বারংবার গৈরিকবর্ণের তরল মলশ্রাব, স্বপ্নমুগ, অশ্রুজ্বলন, গাত্রে রসটক্স স্রাবক আমবাতিক বেদনা, ওদন্ত প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ-

* ঔষধ সকলের বিস্তারিত লক্ষণ পুস্তকের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য।

লক্ষণ । রসপঙ্ক প্রয়োগে উদরাময় নিবারিত না হইলে আর্সেনিক ব্যবহের ।

(৪) আর্সেনিক ।—কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধময় মল ও রোগের প্রারম্ভাবস্থায় শয্যা-কৃত, এবং বারংবার মুত্র বেগ ও অল্প অল্প জ্বালাকর মুত্রত্যাগ আর্সেনিকের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ । (৫) মার্কসল ।—হরিভাভ আমমর মল লক্ষণে মার্কসল ফলপ্রদ ।

(৬) কস্ফরিক এসিড ।—মূত্র প্রকৃতির টাইফয়েড জ্বরে অতিশয় ঔদাসিন্য, ও বেদনাশূন্য উদরাময় লক্ষণে কস্ফরিক এসিড উপযোগী । অল্প হইতে মলিন বর্ণ, গাঢ় রক্ত্রসাবে ও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ । (৭) কস্ফরাস ।—টাইফয়েড জ্বরের সহিত ব্রুকাইটস বা নিউমোনিয়া সংশ্লিষ্ট থাকিলে কস্ফরাস ব্যবহের । ব্রুকাইটসিয়াও উপযোগী । আরোগ্যোগ্যস্থ অবস্থায়ও অস্ত্রের ক্ষত শুক না হওয়াতে অতিসার রহিবাগেলে কস্ফরাস উপকারী । (৮) হাইড্রোসায়েরাস ।—উচ্চ রবে কথা বলা, অবিবত হান্ত, গান ও চিৎকার করা লক্ষণাপন্ন প্রলাপে হাইড্রোসায়েরাস ফলপ্রদ । (৯) ট্রিমোনিয়ম ।—অবাস্তব কল্পনা, দ্বিদেশ, বা বিখণ্ডিত দেহ প্রভৃতি কল্পনা বিশিষ্ট প্রলাপে ট্রিমোনিয়ম উপযোগী । (১০) বেলডোনা ।—মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয় বা মাত্তিক স্নায়ুর প্রদাহ সংশ্লিষ্ট টাইফয়েড জ্বরে তীব্র শিরঃশীতা, চক্ষের আরক্ততা, প্রচণ্ড প্রলাপ, মস্তকেব উত্তাপ, পূর্ণ নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে বেলডোনা ব্যবহার্য । (১১) ওপিয়ম ।—তজ্রা-দোষ, অথবা পর্যায়ক্রমে মুহুপ্রলাপ ও তজ্রা-দোষ, ও আসে ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে ওপিয়ম উপযোগী । তজ্রা-দোষের আধিক্য অগ্নিয়া মস্তিষ্কের স্তব্ধতার সম্ভাবনায়ও ওপিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ । ওপিয়মে উপকার না দর্শিলে ল্যাকেসিস ব্যবহের হইতে পারে । (১২) আর্গিকা ।—তজ্রা-দোষ সহকারে অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসরণ লক্ষণে আর্গিকা ব্যবহ করা বাইতে পারে । (১৩) কার্বো-ভেজি ।—প্রায় তজ্রা-দোষের ভ্রাস, উদাসীনতা, ব্যংগরোনাতি অবসন্নতা, ও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ-পরিশূভতা হস্ত-পদাদি দেহ-শাখার শীতলতা, ও উহাতে আঠা আঠা বর্ষ ; মলিনবর্ণ, দুর্গন্ধময় ; এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে টাইফয়েড জ্বরে কার্বো-ভেজিটেবিলিস পরম উপকারী । (১৪) এসিড-মিউর ।—জীবনী-শক্তির অতিশয় নিম্নতা ; অত্যন্ত অবসন্নতা, পেশীর শক্তি হীনতা, এবং ভ্রাস্ত শয্যার পশ্চাত্তাগে সরিয়া বাওয়া, অনিচ্ছায় মল-মূত্রাদি নিঃসরণ ;

সংক্ষেপেতঃ সমস্ত যন্ত্রের পক্ষাঘাত লক্ষণে নিউবিয়টিক এসিড উপযোগী ।
(১২) মিস্কোনা ।—মূল রোগে নহে, কিন্তু আবেগগাম্ভীর্য অথবা শীঘ্র রোগীর
দুৰ্দ্ধগতা দ্বারা কৃত না হইলে, ক্ষুণ্ণ-মান্দ্য, ও আশ্রমান্দ্য থাকিলে এবং মলের
সহিত অজ্ঞান ভুক্ত দ্রব্য নিগত হইলে নিঃক্ষুণ্ণা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্যাপ্যাপথ্য ।—বোগীকে উত্তম বায়ুসেবিত গৃহে রাখিতে হইবে ।
রোগীর নিকট কোন প্রকার শব্দ হইতে দিবে না । উহার চক্ষুতে যেন
সুখানোয়ক না পড়ে । শয্যে স্থিতি কেমন বা কতদিন হইবে না । রোগীর
গাত্র ও গাত্রবস্ত্র সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত । পৃষ্ঠ ও উকদেশে শয্যা-ক্ষত
না জন্মে এনিমিত্ত ঐ সকল স্থানের নীচে বা লম্ব দিরা রাখিবে এবং সর্বদা
পরিষ্কার ও পর্যবেক্ষণ করিবে । প্রতিদিন ঈষৎক্ষণ জলে স্নানসিত কার্কাণিক
এসিড মিশাইয়া গাত্র-মাজ্জনা বিভাহিয়া বোগীর গাত্র পরিষ্কার করিয়া দিবে
এবং ঐ জল দ্বারা বাবংবাব বোগীর মূত্র বোঝাইবে । বোগের প্রারম্ভে
শীতল জল, আবহবদেশীয় গর্দেব জল, যবের পাতলা মণ্ড, 'গেমমেনড বা সোডা'
ওয়াটার প্রভৃতি পানীর ভিন্ন অল্প অল্প পথ্য দিবে না । শরীরে অগ্নিশক্তি
হইলে একটু সেবুব বস ও জল দ্বারা বোগীর শুষ্ক জিহ্বা স্নান করিয়া প্রথম
প্রথম চক্ষু, মাংসের কাথ প্রভৃতি পুষ্টিকর তরল বা অর্দ্ধ তরল পথ্য ব্যবস্থা
করিবে । দুইমাস অস্তীত হইলে অর্থাৎ বোগীর অস্ত্রের ক্ষত শুষ্ক হইয়া
শরীরেব তাপাংশ ৯৮ হইলে স্নাপাচ্য অতরল দ্রব্যাদি পথ্য দিবে । ইহার
পূর্বে অন্নাদি পথ্য দিলে বিশেষ বিপদ ঘটিবান সম্ভাবনা । এই রোগে প্রথম
সপ্তাহেব পর হইতে বোগীকে এক আউন্স মাত্রায় জল মিশ্রিত স্নান দেওয়া
বাইতে পাবে । স্নান ব্যবস্থাবের পবে যদি জিহ্বা অবিকৃতর আর্দ্র, নাড়ী
অপেক্ষাকৃত মৃদুগতি এবং গাত্র ষষ্ঠাভ্যন্তর তপে, তদ্বারা উপকারাদর্শিতেছে
মনে করিতে হইবে । যদি ইহার বিপরীত কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তবে
স্নান সেবন বর্জিত করিয়া দিবে । অব-মুক্ত ব্যাক্তির ৩৪ মাস পর্যন্ত
কোনপ্রকার পরিগ্রহ জনক কার্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে । উদরোপার
জলপটী দিলে সন্নিপাত অয়ের উদবাময়ে বিশেষ উপকার দর্শে ।

মোহ জ্বর —টাইফস ফিবার।

টাইফস জ্বর চতুর্দশ হইতে একবিংশ দিবস ব্যাপী একপ্রকার স্পর্শ-সংক্রামক উৎকট অবস্থান জ্বর। সাধারণতঃ ইহা ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় এবং তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ দিবসের মধ্যে এই জ্বরে গায়ে একপ্রকার বিশেষ দীড়কা উৎপন্ন হয়। সচরাচর ইহাকে ত্রৈমাসিক বা মাসিক-জ্বর বলে। মোহ-জ্বর নামে ইহা বাঙ্গালার অনুরাদিত হইয়াছে। টাইফয়েড জ্বরের ত্রায় টাইফস জ্বর ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হয় না, কিন্তু সহসা আক্রমণ করে। পূর্বে ভাবতর্ষে টাইফস জ্বর অপরিজ্ঞাত ছিল, অধুনা এদেশেও এই জ্বর কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কারণ।—টাইফস জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শরীর হইতে উদ্ভূত এক প্রকার বিশেষ বিবেক সংক্রমণ বশতঃ এই জ্বর উৎপন্ন হয়। যে গৃহ বিস্তৃত বায়ু-সেবিত নহে তাহাতে বহুসংখ্যক লোক বাস করিলেও টাইফস জ্বরেৎ-পাদক।বহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিবিক্রপ পরিশ্রম বা উৎকর্ষ বশতঃ শারীরিক ও মানসিক শক্তি অবসন্নতা জন্মিলে শরীরে এই বোগ সংক্রমণের সমরিক উপযোগিতা উৎপন্ন হয়। ক্লান্ত মনিসতা ও অপব্যাপ্ত আহার জনিত শরীর-বিকার টাইফস জ্বরের আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এজন্য বড় বড় নগরের যেসকল স্থলে জল-প্রণালী বা বিস্তৃত বায়ু-সঞ্চালনের সুবন্দোবস্ত নাই তথাকার দণ্ডি লোকেবাহ টাইফস জ্বরে আবহ আক্রান্ত হয়। জ্বাৰ্ত্তক, ও যুদ্ধাদির সময়ে বা তৎপরেও এই জ্বর ব্যাপক আকারে প্রোচ্ছভূত হইয়া থাকে। জনাকীর্ণতা টাইফস জ্বরেৎপাত্তব অত্যন্ত কারণ। কি সংকীর্ণ কুটীর, কি সুগ্রন্থ অট্টালিকা, কি সৈন্যশিবির, কি আরোহী পুণ্য অর্ঘ্য-পোত যেখানে অতিশয় জনাকীর্ণতা জন্মে সেইখানেই বায়ু-দূষিত হইয়া টাইফস জ্বর উৎপন্ন হয়। শীত-প্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশেই ইহার বিশেষ প্রোচ্ছভাব দেখা যায়। শীতকালেই ইহা সমরিক তাঁর আকারে প্রকাশ পায়। কেননা শীত ঋতুতে শীত-প্রধান দেশের দরিদ্রলোকদিগকে উপযুক্ত আহার ও আচ্ছাদনাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে একত্র

এক গৃহে বাস করিতে হয় । নিম্ন ও অর্ধস্থান অপেক্ষা উচ্চ ও পরিষ্কৃত স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম । টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ-সংক্রামক । এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত বিষয় ইহাৰ বিশেষ উদ্দীপক কারণ । পূর্বোক্ত পূর্ববর্তী কারণ বিদ্যমান থাকিলে রুগ্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে সহজেই এই রোগ আক্রমণ করে । পূর্ববর্তী কারণ বর্তমান না থাকিলে সংস্পর্শ-দোষে বিপক্ষে রোগ প্রকাশ পায়, এই জন্তই বোগীর পরিচর্যক ও চিকিৎসক টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ হইতে প্রায়ই সতর্কতা করিতে পাবেন না । যাহারা অব্যবস্থাপূর্ণ রোগে আক্রান্ত থাকেন ও তাহাকে স্পর্শ করেন তাহাদিগের শরীরেই এই বিষয় বিশিষ্টরূপে সংক্রামিত হয় । মধ্যে মধ্যে রোগীকে দেখিতে গেলে টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ বিষয় কদাচং সংক্রামিত হইয়া থাকে । বোগীর শয্যা ও গাত্রবস্ত্রাদি সংস্পর্শেও এই অব্যবস্থাপূর্ণ হইয়া থাকে । মক্ষিকাদি সংযোগেও ইহা সংক্রামিত হয়, কিন্তু বসস্তাদি দ্বারা তত সহজ সংক্রামিত হয় না । আকাশস্থ বায়ুতে বিকীরণ হইয়া পড়িলে টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ বিষয় বিনষ্ট হয় ।

বিধান-বিকার ।—টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ অধিক শারীরিক বিধানের পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না । কিন্তু বক্তের বিকার সততই দেখা যায় । পেশী, শৈথিল্য, বৃদ্ধক, ফুসফুস, ও মস্তিষ্কেও আকাবগত বৈলক্ষণ্য জন্মে । রক্ত বিশিষ্টরূপে তবলতব হয়, এবং হয় একেবারেই সংবত হয় না, নয় হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহন নাড়ীতে জমিয়া বড় বড় কোমল খণ্ডরূপে বিদ্যমান থাকে, ও সেই সকল খণ্ড সহজ বিগলিত হয় । পেশীগুলি, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পেশী কোমল ও শিথিল হয়, তৃতীয় সপ্তাহে বা তৎপরে মৃত্যু হইলে হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষ ও জন্মে, আমাশয় ও অন্ত্রেব শৈথিল্য বিস্তারিত প্রদাহ ও রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন হয়, কখন কখন অন্ত্রে কোমল লাসিকাও ক্ষরিত দেখা যায় । কচিং বা সমবেত ও অসমবেত গ্রন্থিগুলি বিবর্তিত হয় । কিন্তু টাইফয়েড অব্যবস্থাপূর্ণ প্রায় এই বোগে অন্ত্রে ক্ষত জন্মে না । গ্রন্থিগুলির মধ্যে যকৃৎ, প্লীহা ও লিলা-গ্রন্থিই সচরাচর আক্রান্ত হইয়া থাকে । এই সকল গ্রন্থি বিবর্তিত ও কোমল হয় । কখনও বা লিলাস্রাবী গ্রন্থি পাকে ও পচিয়া পড়ে । মস্তিষ্কের গহ্বরে কিঞ্চিৎ রক্তাবিক্য এবং মস্তিষ্কের বিধান-তন্তুতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রক্তপূর্ণতা দৃষ্ট হয় ।

লক্ষণ।—টাইফস জ্বরের পূর্বরূপ অবস্থা এক হইতে দশ দিবস থাকে। অন্তর জ্বর প্রকাশ পায়। শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, অন্ন অন্ন শীত, পৃষ্ঠে বেদনা, ঐলন্ত, ও হৃৎকম্পাত্মক টাইফস জ্বরের প্রথম লক্ষণ। এই সকল পূর্বলক্ষণ দুই তিন দিবস থাকে। তৎপরে কম্প, বিবর্জিত শিরোবেদনা, ঐনার্দ্ৰ ও উত্তপ্ত ত্বক্, পিপাসা, দৃষ্টির গুরুতা ও প্রভাশূন্যতা, নাড়ীর কোমলতা ও দ্রুততা, জিহ্বার রসহীনতা, স্ফুট, অবসাদ, পেশীর বেদনা, এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কোন কোন রোগীর কোষ্ঠবদ্ধের পরিবর্তে অতিসার জন্মে। রোগীর আকৃতি-গত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সে অবসন্ন অবস্থায় চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহার মুখমণ্ডল শ্রান্ত ও নিশ্চত, চক্ষু ভারাক্রান্ত, এবং গণ্ডস্থল ধূসরভাৱে আবৃত রাগে রঞ্জিত দেখায়। জীৱ আকারের জ্বর হইলে জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থায় রোগী অর্ধ নিম্নলিভ নেত্রে লয়ন করিয়া থাকে, অবসন্নতা বশতঃ কথা বলিতে, জিহ্বা বাহির করিতে স্বেদনা পাশ ফিবিতে পারে না। মুখরস-শূন্য ও পবিত্রক, ওষ্ঠ ও দন্ত দৃষ্টশর্করাকৃত, ত্বক্ উত্তপ্ত ও শুষ্ক এবং জিহ্বা ও হস্ত বিকম্পিত হয়।

নাড়ী।—নাড়ীর বেগের দ্রুততা জন্মে। জ্বরের তীব্রতাসূচক ৯০ হইতে ১৪০ বা ১৫০ বাব নাড়ী স্পন্দিত হয়। উৎকট জ্বরে চরমসীমা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্তর রোগ আরোগ্য হইবার হইলে ক্রমে ক্রমে বেগ হ্রাস পড়ে। সহসা নাড়ীর বেগের হ্রাস সঙ্কটস্থচক। ক্রমে ক্রমে বেগের হ্রাস পড়িতে পড়িতে সহসা বৃদ্ধি কোন প্রকার উপসর্গের আবির্ভাব জ্ঞাপক। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালের নাড়ীতে কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। তবে নাড়ীর প্রকৃতি সর্বদা একরূপ থাকে না। কখনও অস্থূলীর স্পর্শে নাড়ী সবেল ও পূর্ণ, কখনও বা সামান্য প্রচাপনে বিকূপ্ত; আবার অল্প সময়ে বা ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ অহুত হয়। কিন্তু সচরাচরই নাড়ীর সপর্শ্যায় ও বৈষম্য-দোষ বিদ্যমান থাকে।

পীত্বোত্তাপ।—রোগের প্রাবল্যেই গাত্র-তাপ বিবর্তিত হইতে থাকে এবং ১০০° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হয়। তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাপ বৃদ্ধি পায় এবং সচরাচর ১০৫° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত গাত্র-তাপ, বৃদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হয় ও তৎপরে

অল্প হ্রাস পড়ে। রোগ অধিক উৎকট হইলে প্রথম সপ্তাহের শেষে জ্বরের এক প্রকার স্বল্পবিরাম জন্মে। দ্বিতীয় সপ্তাহে গাত্রতাপ পুনরায় বৃদ্ধিতে থাকে, কিন্তু প্রায়ই প্রথম সপ্তাহের ত্রায় তত বৃদ্ধি পায় না। দ্বিতীয় সপ্তাহ পরিসমাপ্তির প্রাকালে, দ্বাদশ ও চতুর্দশ দিবসের মধ্যে আবার জ্বরের স্বল্প-বিরাম লক্ষিত হয়। এই স্বল্পবিরাম কি বৃহৎ, কি উৎকট, কি সাংঘাতিক সকল প্রকার জ্বরেই দেখা যায়। রোগ আবোগ্য হইবার সম্ভাবনা জন্মিলে দ্বয়োদশ ও সপ্তদশ দিবসের মধ্যে গাত্রতাপ কম পড়িতে থাকে। তাপের এই হ্রাসতা বড়ই শীঘ্র শীঘ্র জন্মে, এমন কি কখন কখন চক্ষিণ ঘণ্টার তিন চারি ডিগ্রী কনিয়া যায়। রোগীর প্রাণ-নাশের সম্ভাবনার সমস্ত গাত্র-তাপ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুর অলক্ষণ পূর্বে উহা এত বিবর্দ্ধিত হয় যে রোগ-কালে আর কখনই এতদূর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। এই জ্বরে প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যাকালের গাত্র-তাপে টাইকয়েড জ্বরের ত্রায় অধিক প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

পীড়কা।—চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে গাত্রে টাইকস জ্বরের প্রকৃত-দিক উদ্ভেদ প্রকাশ পায়। বর্ণানুসারে এই সকল উদ্ভেদকে তুঁত উদ্ভেদ (নালবারি রাশ) কহে। টাইকস জ্বরের পীড়কা গুলি বিষমাকার, ধূসর অথবা স্তম্ভক তুঁতফলের বর্ণের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট। চাপ দিলে উহার বিলীন হয় এবং স্পর্শ করিলে চর্ম্মের উপর একটু উন্নত অমুভূত হইয়া থাকে। পীড়কা অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ মিলিত হইয়াই বড় বড় উদ্ভেদ জন্মে। রোগের আক্রমণের উগ্রতানু-সারেই পীড়কার বর্ণের গাঢ়তা ও সংখ্যার বহুলতা উৎপন্ন হয়। প্রথমে এই সকল পীড়কা নগিবন্ধে; কক্ষ-প্রান্তে ও উদবোধে দেশে প্রকাশিত হয়, অনন্তর বক্ষঃস্থলে ও শরীর-শাখায় জন্মে। প্রথম প্রথম পীড়কাগুলি প্রচাপনে বিলীন হয়। কিন্তু দুই এক দিবসের মধ্যেই উহারাই ইষ্টক চূর্ণের ত্রায় বর্ণ ধারণ করে, তখন আর প্রচাপনে বিলীন হয় না এবং রোগের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। কোন কোন রোগীর পীড়কা পিটিকীতেও (ডাঁশের কামড়ের ত্রায় উদ্ভেদ) পলিণত হয়।

ফুসফুস।—এই জ্বরে ফুসফুস ও বায়ুনলীভূত আক্রান্ত হইবার বিশ-ক্ষণ সম্ভাবনা, সাবহিত হটয়া উহার প্রথম অভিব্যক্তি পর্য্যবেক্ষণ করা

উচ্চিক। কাস, শ্বাস, ও নিশ্বাসনাশ না থাকিলেও প্রতিদিন রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্তব্য। অনেক রোগীরই দ্বিতীয় সপ্তাহে ফুসফুসের ভূমি দেশে বেশ ঘর্ষণ ধ্বনি, ও এক বা দুই ফুসফুসেরই ঘন গর্ভ শব্দ, এবং তৎপরে মৈত্রিক ধ্বনি শুনা যায়। ফুসফুসের এইরূপ অবস্থা কাস বা নিশ্বাসনাশ ব্যতীতও থাকিতে পারে। নিশ্বাসনাশ নির্গত হইলে উহার ফুসফুস-প্রদাহ বা বায়ু-নলীজ্বর-প্রদাহেব নিশ্বাসনের সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। ফুসফুস বা দাহনলীর উপসর্গ অরের পবিবর্তন সময়ে হাস পড়ে কিন্তু ফুসফুসেব নিরেটতা (কনসলিডেশন) জন্মিলে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থার পরেও উহা কিছুদিন থাকিয়া যায়। ফুসফুসেব উপসর্গ বশতঃ মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পূর্বে ত্বক্-ভ্রামবর্ণ, শ্বাস প্রতিহত, ও নাড়ী ক্ষীণ হয়; এবং শ্বাস রুদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

স্নায়বীয় লক্ষণ।—টাইফস অরের স্নায়বীয় লক্ষণ অতিশয় পরিহার্য। যোধ হয় যে এই জ্বের বিষেব সমধিক প্রভাব স্নায়ুমণ্ডলেই দর্শে। প্রাণ্ডি, অস্থিরতা, ও নিদ্রাহীনতা স্নায়বীয় উৎস্রবের প্রথম লক্ষণ। তৎপরে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ও মনোভাবের বিশৃঙ্খলা জন্মে। চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে অধিকাংশ রোগীরই প্রলাপ উপস্থিত হয়। এই প্রলাপ অতীব কষ্টকর। প্রথমে রোগী নানাপ্রকার অসঙ্গত, বিশৃঙ্খল কথা বলে, লোক ও স্থান চিনিতে পারেনা, এবং তাহার কালেবও জ্ঞান থাকেনা। এই অবস্থা হইতে প্রথম প্রথম তাহার চৈতন্য জন্মান যায়। অনন্তব তাহার দৃষ্টি বিলম্ব ও প্রতি-বিলম্ব জন্মে, সে নানাপ্রকার যন্ত্রণাপ্রদ দৃশ্য দেখিতে ও কষ্টপ্রদ শব্দ শুনিতে থাকে। সে মনে কবে যে কেহ যেন প্রতিহিংসাবশতঃ তাহার অত্মস্বয়ণ কবিতোছে এবং সে তাহার নিকট হইতে পলাইতে বুধা চেষ্টা কবিতোছে, কখনও বা তাহার অসুভব হয় যে সে গন্ধকাব কারাগৃহে আবদ্ধ হইয়াছে, কখন বা সে অসুমান করে যে কেহ যেন তাহাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। সে একই কথা অনবরত বলে, এবং একই প্রকার অসংলগ্ন চিন্তাই নিয়ত চিন্তা কবে। সময়ে সময়ে এই প্রলাপ সন্দেহের আকার ধারণ করে। সে মনে করে যে তাহার পরিসেবকগণ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে চাচ্চা করে। এই জন্ত সে ঔষধ পান্য সেবন করিতে অসম্মত হয়। কয়েক দিনস পবে প্রথম প্রলাপ মৃদু প্রলাপে পরি-

ণত হয়। তখন বোগী হিরডাবে চিং হইয়া কুইয়া আপনাপ্রাণিই-বিড় নিষ্ক
করিয়া তাহার মনের কথা বলিতে থাকে। ঙ্গুতর রোগে প্রাণাণ ক্ষুণ্ণিতে
পরিণত হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জিহবার কম্প ও কণ্ঠের স্পন্দন ক্ষয়ে।
রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিলে সম্যক জ্ঞানশূন্যতা বিশিষ্ট তজ্জাদোষ, অধঃশ
জাগ্রত তজ্জা (কোমতিজিল) উপস্থিত হয়; এই প্রকার জাগ্রত তজ্জা-
দোষে বোগী স্থিৎ চক্ষু, এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে কিন্তু চারিদিকের কিছুই
সে দেখিতে পায় না। কখন কখন অপ্রাণবের স্থায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়।
এই আক্ষেপ মৃত্যুব লক্ষণ। বোগীর প্রায়ই শ্রুতি-বিকার এবং বধিরতা
ক্ষয়ে। প্রাণাণ প্রবল ও অনেকদিন ব্যাপী হইলে বোগী আরোগ্য লাভ
করিলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাব বুদ্ধির বৈকল্য থাকিয়া যায়।

ভোগ-কাল।—উৎকট উপসর্গ উপস্থিত না হইলে টাইফস জ্বর
প্রায়ই ষোল দিনের অধিক থাকে না। এই বোগে সাধারণতঃ দুই এক
দিবসের মধ্যে সমস্ত লক্ষণ গুলি উপশমিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখতার লক্ষণ
হয়। বোগীর মৃত্যু হইলে তৃতীয় হইতে একবিংশ দিবসের মধ্যেই মৃত্যু হয়।
যে সকল রোগীর প্রাণনাশ হয় সচরাচর তাহাদের রোগ বার, চৌদ্দ দিন
থাকে।

উপসর্গ।—এই বোগের ভোগকালে অতিসার, লাল-গ্রন্থির ক্ষীণতা
ও পরিপকতা, বিসর্প; পাইমিয়া, আক্ষেপ, ও পদাঙ্গুলীর কোথ প্রভৃতি
উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বিনির্গম।—টাইফস জ্বর বিনিশ্চয় কালে হাম, ফুসফুস-প্রদাহ, ও
টাইফয়েড জ্বর বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। ১। হাম ও টাইফস জ্বরের
উদ্ভেদ একই সময়ে বহির্গত হয়, এবং উভয়ের কলকটা সাদৃশ্যও আছে।
কিন্তু টাইফস জ্বরের উদ্ভেদ হামের উদ্ভেদের স্থায় অর্ধ চন্দ্রাকার নহে, সাদৃশ্য-
রূপতঃ উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার, এবং অত উন্নত নয়। হামের পূর্বে সর্দি থাকে,
টাইফস জ্বরের পূর্বে সর্দি থাকে না। হামের ভোগকাল টাইফস জ্বর অপেক্ষা
অল্পদিন স্থায়ী। ২। টাইফয়েড নিউমোনিয়া বা সাম্প্রতিক ফুসফুস প্রদাহ ও
টাইফস জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ নিউমোনিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু
বোগীর ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হইলেই উভয়ে প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায়।

প্রাথমিক রোগে প্রথম হইতেই জ্বর রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়। অসিচ, রোগীর গাত্রের পক তঁত ফলের বর্ণের জ্বর বর্ণ বিশিষ্ট পীড়কা বিলম্বিত থাকে না। (১) টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরে প্রভেদ এই—টাইফস জ্বর। (১) টাইফস জ্বরের আক্রমণ-কাল অল্পকালস্থায়ী। (২) সাধারণতঃ ইহাতে কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকে। (৩) অল্প হটতে প্রায়ই রক্তস্রাব হয় না। (৪) উদ্ভেদ পক তঁত ফলের বর্ণের জ্বর জ্বার রক্তবর্ণ হয়, উহা অরাক্রমণের চতুর্থ হটতে সপ্তম দিবসের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং বিলীন হয় না। (৫) নাড়ী ও গাত্র তাপে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত বর্দ্ধিত হয়, তৎপর নবম দিবস পর্য্যন্ত পৌর সমভায়ে থাকে, অন্তঃস্থ কমিতে থাকে। (৬) ভাল অবস্থার লোকের প্রায়ই টাইফস জ্বর হয় না। (৭) ইহার ভোগকাল ১৪ দিন। (৮) এই জ্বর সকল বয়সেই হইয়া থাকে। (৯) টাইফস জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থায় রোগীর গাত্র হইতে গলিত পলালের গন্ধেব জ্বর একপ্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

টাইফয়েড জ্বর।—(১) টাইফয়েড জ্বরেব আক্রমণ কাল প্রচুর ও দীর্ঘ স্থায়ী। (২) সাধারণতঃ ইহার সহিত অতিসার থাকে। (৩) সচরাচর অল্প হইতে রক্তস্রাব হয়। (৪) উদ্ভেদের বর্ণ পাটল (গোলাপী), উহা অরাক্রমণের সপ্তম হইতে চতুর্দশ দিবসের মধ্যে প্রকাশ পায়, এবং একবার প্রকাশিত ও একবার বিলীন হয়। (৫) নাড়ী ও গাত্র তাপের সমতা থাকে না; সাধারণতঃ দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত উভয়ের বৃদ্ধি থাকে; টাইফস জ্বর অপেক্ষা টাইফয়েড জ্বরে প্রাতে ও সায়াহ্নে নাড়ী ও গাত্র তাপের অধিকতর বিভিন্নতা থাকে। (৬) ৫ দিবসলোক অপেক্ষা ভাল অবস্থার লোকেরই এই জ্বর অধিক হয়। (৭) টাইফয়েড জ্বরের ভোগকাল প্রায় ২১ দিবস। (৮) টাইফয়েড জ্বর প্রায়ই রালকদিগকে বা চল্লিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করেনা। (৯) টাইফয়েড জ্বরে বোগীর গাত্রের বিশেষ কোন দুর্গন্ধ থাকে না।

প্রতিকার।—এই রোগের ভাবীফল যুরকদিগের পক্ষে অপ্রোক্তক জ্বরজ্বল, কিন্তু যুরকদিগের পক্ষে বিপদজনক। টাইফস জ্বরে বাল্যকালে হইতে বার্ষিক পর্য্যন্ত বয়সের বৃদ্ধি অহুসারে মুক্তা সংখ্যার বৃদ্ধি হুই হয়। বয়সের ন্যূন বয়স্ক রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ৫; দশ ও কুড়ি বয়স

বঙ্গের মধ্যে শতকরা ৮-৯; কুড়ি ও ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১৫.৩; ত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২১.৫; চল্লিশ ও পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪২; পঞ্চাশ বৎসরে উর্দ্ধে শতকরা ৬৬.৬ জনের মৃত্যু হয়। ক্ষীণকায় কার্যশীল লোক অপেক্ষা স্থলকার অলস প্রকৃতির লোকদিগকে মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতিরিক্ত সুরাপারীদিগের আবেগোব সঙ্কটান্বিত হয়। অতিরিক্ত পবিত্রমে শ্রান্ত ও মানসিক বা শারীরিক অবসাদে অবসর ব্যক্তিগণ টাইফস অবাক্রান্ত হইলে মবল ও মতেজ লোক অপেক্ষা সহজে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ১০৭° বা ১০৮° তাপাংশ গাত্রতাপ; প্রথম সপ্তাহে অবিরত গাত্রতাপের বৃদ্ধি; তৃতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে সহসা গাত্রতাপের অতি-শয় আধিক্য; দুর্বল, দ্রুত, ১৫০ বা ততোধিক স্পন্দন বিশিষ্ট নাড়ী; বিষম-গতি নাড়ী; পীড়কার অধিক প্রাচুর্য ও প্রচাপনে তাহার অপরিবর্তনীয়তা; ধূসর বর্ণ মুণাকৃতি; দুর্বল্য প্রবল প্রলাপ; অবিরত অনিদ্রা; তন্দ্রা-দোষ; আগ্রততন্দ্রা; শব্দা খুঁটন; অত্যন্ত অবসন্নতা; আক্ষেপ; দুর্বল্য অতিসার; কুদ-কুদ প্রদাহ, বায়ু-নলীভুক্ত শব্দাহ্বাদি উৎকট উপসর্গ টাইফস অরে অন্তত লক্ষণ।

সম্প্রাপ্তি।—ডাঃ বুচনান বলেন যে এক প্রকার বিমিশ্র (অরগ্যানিক) বিবাক্ত পদার্থ হইতে টাইফস অব উৎপন্ন হয়। এই বিবাক্ত পদার্থ বিস্মা-নিত হইয়া আবার নূতন বিষ উদ্ভব করে। এতদ্বারা শরীরের অণুগাণ বিশিষ্ট তরল পদার্থের ও বিধান-তত্ত্ব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এবং সেই পরিবর্তন বশতই রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। যদিও এই রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্যক্রূপে জানা যায় নাই; কিন্তু রোগীর রক্ত ও মূত্রের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে শরীরের অণুগাণিক পদার্থের ও বিধান-তত্ত্বের যে এই প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। টাইফস অরের বিষ-দোষ নিবন্ধন প্রথমে রক্তের অন্তর্কর্ষ ও ক্লি-কর্ষ শক্তির বাতিক্রম হয় এবং পরিপাক-পথ ও রক্তের মধ্যে শরীর রক্ষার্থে প্রতিদিন স্বভাবতঃ পরস্পর যে তরল পদার্থের বিনিময় হইয়া থাকে তাহার ব্যাঘাত জন্মে। তিনি অনুমান করেন যে এমোনিয়া বা এমোনিয়া সংস্থি কোন মিশ্র পদার্থ টাইফস অরের প্রকৃত বিষ। ডাঃ রিচার্ডসন বলেন যে টাই-ফস অন্তর্গত একজন রোগীকে তিনি জীবিত অবস্থায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া

ছিলেন এবং তাহাতে অতিরিক্ত এমোনিয়ার বিদ্যমানতার সুস্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রোগীর খাসে অল্পলিপিত কাচ ক্রোমাইড অক্স এমোনিয়ার দানার সমাচ্ছন্ন; আরক্ত লিটমস কাগজ পুনরায় নীলবর্ণ; এবং শোণিত, সুস্থ শোণিত এমোনিয়ার অল্পত্র ভ্রব মিশ্রিত করিলে যেরূপ রক্তাণু সকল বিকৃত, সংযত, ও কিরণপরিমাণে প্রবীভূত হয় ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।

চিকিৎসা।—ব্যাণ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বেলেডোনা, হাইওসায়েরমাস, ওশিরম, মিউরিয়েটিক এসিড, রসটক্স, ফসফরাস, ফসফরিক এসিড, এশিড ও টেরেবিন্থিনা টাইফস জ্বরের প্রধান ঔষধ।

এই জ্বরের প্রথম সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্বে ব্যাণ্টিসিয়া প্রয়োগ করিয়া দেবা উচিত। যদি ব্যাণ্টিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার না দর্শে অথবা রোগের প্রবর্তিত অবস্থায় চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে রোগীর নিম্নলিখিত তিন প্রকার অবস্থার একপ্রকার অবস্থা বিদ্যমান দেবা যায়। (১) প্রথম প্রকারে শিরঃপীড়া প্রধান লক্ষণ থাকে, যদি অষ্টম দিবসেও উষ্ণতা হাস না পড়ে, অবিকল্প প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং মস্তকে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে বেলেডোনা সেবন করাইলে উপকার দর্শে। রক্তিক-লক্ষণ অধিক প্রবল আকারের না হইলে বেলেডোনার পরিবর্তে হাইয়োমাসায়েরমাস উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু প্রলাপের অত্যন্ত উগ্রতা থাকিলে ট্র্যামোনিয়ম ব্যবহের। তজ্জা না অট্টেজ লক্ষণে ও পিয়ম উপযোগী। অতিশয় অস্থিরতা, অঙ্গ-স্পন্দ, কৃষ্ণ প্রভৃতি লক্ষণে কেহ কেহ এগেরিয়ম ব্যবহা করিতে বলেন। (২) দ্বিতীয় প্রকারের রোগীদিগের জ্বরবীর অবসাদই প্রধান লক্ষণ, এতৎসহকারে অল্পমাত্র জ্বর বা রক্তের বিকৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় ফসফরিক এসিড প্রয়োগ। রোগীর অবসাদের অত্যন্ত আধিক্য থাকিলে ফসফরাস ব্যবহের। ফসফরাস দ্বারা অতিশয় বিপর্য অবস্থারও প্রাপ্তকী হইতে পারে। (৩) তৃতীয় অবস্থায় রক্তের বিকৃতি ও জ্বরলক্ষণ প্রথম হইতেই প্রবল থাকে। রোগের উগ্রতাহেলে মিউরিয়েটিক এসিড, রসটক্স, ও আর্সেনিক এই অবস্থার প্রধান ঔষধ।

প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ ।

(১) ব্যাপ্টিসিয়া ।—রোগের আরম্ভে অভ্যন্ত শিরোবেদনা; গায়ে জ্বালায় তীব্র উত্তাপ; আরক্ত-প্রাস্ত, কপিল লোপাকৃত, পরিপূর্ণ জিহ্বা; তীব্র অস্পষ্ট কথা; মুখমণ্ডলের লোহিত, ধূসরবর্ণ, নিম্নভ-দৃষ্টি; উদরোচ্চ দেশে শূণ্যতাভব, পেশীতে স্পর্শ-দেয়; মনোভাবের বিশৃঙ্খলা; শরীর বিখণ্ডিত অস্থাব, ও সেই সকল খণ্ড একত্রিত করিবার জন্য কৃথা চেষ্টা; ঔদার্য, বা স্পৃহা, চেষ্টা করিয়া উঠা হইতে রোগীকে আগ্রহ করিতে হয়; অতিশয় দুর্বলতা ও দ্রাব্যীয় অবসন্নতা;—এই সকল লক্ষণে ব্যাপ্টিসিয়া উপযোগী । (২) ব্রাইওনিয়া ।—অতীব, প্রচাপনবৎ শিরোবেদন, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি; রাত্রিতে প্রলাপ; বিষয়-কার্য সম্পর্কীয় অসম্বন্ধ কথা; অস্থির নিদ্রা, কৌঁ কৌঁ করা; কোষ্ঠবদ্ধ; অথবা বোগেব্ প্রবদ্ধিত অবস্থায় শুষ্ক, কাপশ জিহ্বা, হ্রস্ব, ক্ষুণ্ণ, বা দীর্ঘনিশ্বাসসংযুক্ত শ্বাস; অজ-কম্প, অতিশয় দুর্বলতা; অতিশক্তির ক্ষীণতা; উদবেব ক্ষীণতা; শুষ্ককাস; নিদ্রাবলী; এই সকল লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ব্যবহ্যেয় । (৩) বেলেডোনা ।—টাইকস জ্বরের আরম্ভাবস্থার সময়ে সময়ে, মস্তিষ্কের প্রবল রক্ত-সঞ্চয়; তীব্র শিরোভা, ও প্রচণ্ড প্রলাপ; মুখাকৃতির আরক্ততা; চক্ষুর আরক্ততা ও প্রবল দৃষ্টি, প্রসারিত কনীনিকা; জিহ্বার আরক্ততা, পরিপূর্ণতা, ও নিক-স্পন্দ; অস্থির নিদ্রা, অল্পকালস্থায়ী নিদ্রা হইতে বার বার প্রবলভাবে চমকিত হইয়া উঠা; এবং লাগাগ্রস্থির দৃঢ়তা ও ক্ষীণতা লক্ষণে বেলেডোনা প্রযুক্তব্য । (৪) রসটক্স ।—উত্তেজোৎপন্ন অবস্থায়ই রসটক্স বিশেষ উপযোগী । উত্তেজ কামড়ের ভায়ে উত্তেজ; ওদাত্ত ও স্পৃহা, অর্জবৃদ্ধিত চক্ষু, চুপ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকা; অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা; আতিশয়িক মল, অজকুণ্ডল, তল ও অনার্য গাত্র; কম্পিত, পরিপূর্ণ, উত্তপ্ত, অতিশয় আত্মসং নিঃসারিত জিহ্বা; অস্পষ্ট মুহ প্রলাপবাক; কণ্ঠ-ক্ষুরণ; দুর্বল, ক্ষুণ্ণ, বা অনিশ্চিত্ত সবিদ্যাম নাড়ী; এবং অতি-শক্তিব-ক্ষাণতার রসটক্সের প্রয়োগলক্ষণ । (৫) ওপিয়াম ।—রোগের উৎকট অবস্থায় প্রীগত তন্দ্রা-দেয়, আকৃষ্ট কনীনিকা, মলিন লোহিত মুখমণ্ডল, দীর্ঘ ও অনিশ্চিত্ত শ্বাস, অনিশ্চিত্ত বা

সপ্যার নাড়ী লক্ষণে ওশিয়ম ব্যবহৃত। আগ্রত তত্ত্ব। (কোমতিজিল) লক্ষণেও এই ঔষধ প্রয়োজ্য। (৬) হাইওসায়েমাস।—প্রাণ ইজির-বিক্রমে পরিণত হইলে এবং ভয় বা হাউজনক করনা থাকিলে, ও রোগী পলায়নের চেষ্টা করিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (৭) মিউরিয়েটিক-এসিড।—রক্তের বিষহৃষ্টতা নিবন্ধন শরীরের পেশীর শক্তি-লোপ; চর্মের ককতা, পরস্পরতা ও শীতলতা; দ্রুত ও ক্ষীণনাড়ী, মূহপ্রাণ, লালাস্রাব, গলমধ্যস্থ ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ প্রভৃতি এই ঔষধের লক্ষণ। অপর, পিপাসার শাস্তির জন্য দশ ফোটা মিউরিয়েটিক এসিড চাবি আউজ জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তম অল্প পানীয় প্রস্তুত পূর্বক দুই ড্রাম মাত্রার ব্যবহা করা যাইতে পারে। (৮) আর্সেনিক।—অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, নিঃস্রবন, শুষ্ক ও বিদারিত জিহ্বা, হ্রনিবার পিপাসা, অনৈচ্ছিক অতিসারাদি লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবহৃত। (৯) ফসফরাস।—হৃদহৃদের উপসর্গে, শুষ্কাস, হৃদহৃদের ভূমিদেগে কেশ-ঘর্ষণবৎ ধ্বনি, হৃদ্বাংস, অঙ্গুলীর আঘাতে ঘন-গর্ভ শব্দ, এবং কুসঙ্গ-বিধানের নিরৈটতা লক্ষণে ফসফরাস প্রয়োগ করা যায়। (১০) ফসফরিক এসিড।—সম্পূর্ণ উদাসীনতা; জীবনী-শক্তির অতিশয় ক্ষয়লতা; উচ্চ আটোপ ও অন্ত-কূজন; অনিচ্ছায় পাতলা জলবৎ মলস্রাব; অন্ত হইতে রক্তস্রাব; গায়ে কাদিমা; দুর্বল, ক্ষুদ্র ও বৈষম্য-দোষ বিশিষ্ট নাড়ী এই ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণ। (১১) এপিস।—মূত্রে অধিক পরিমাণে অশু-লাল (এম্বুমন) থাকিলে এপিস ব্যবহৃত। (১২) টেরেবিছিনা।—রক্তমূত্রে টেরেবিছিনা উপযোগী। (১৩) সিকোনা।—আরোগ্যোদ্ধ অবস্থায় অধিক দুর্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, অথবা মলের সহিত অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য নির্গত হইলে চায়না ব্যবহৃত।

উপসর্গ।—টাইফস জ্বরে হৃদহৃদের উপসর্গে ফসফরাস কলপ্রদ, এতদ্বারা স্বপ্নিণ্ডের মেদাপকর্ষণও নিবারিত হয়। মূত্ৰদোষ বশতঃ এই রোগে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ আর্সেনিক এই আক্ষেপে উপযোগী। লালাগ্রহি ও গ্রীবার প্রদাহিত ক্ষীততা আর একটা গুরুতর উপসর্গ, বিনআইয়োডাইড অথবা মাকু'রি ১ম ক্রমের বিচূর্ণ সেবনে উহা নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য ।—এই অবগ্রস্ত রোগীর বিশেষরূপে পরিচর্যা করা আবশ্যিক । রোগীর বাসগৃহ পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও উত্তমরূপে বায়ুসেবিত হওয়া উচিত । পবিধেয় ও শয্যাবস্ত্র ঘন ঘন পরিবর্তন করিয়া দেওয়া কর্তব্য । রক্তসঞ্চয় ও শয্যাকৃত নিবারণার্থ বারংবার রোগীর অবস্থান পরিবর্তন করিয়া দেওয়া অতীব প্রয়োজনীয় । রোগের প্রথম অবস্থায় ত্বক যখন ক্লক ও উত্তপ্ত থাকে, তখন ওয়েট প্যাক্ (আর্দ্রবস্ত্রাবরণ) দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । আহার শু পেষ অল্প অল্প পরিমাণে বারংবার নির্দ্ধারিত সময়ে দেওয়া বিহিত । কলমিশ্রিত হুন্ধ, চা, মাংসেব কাথ প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য প্রথম হইতেই অল্প অল্প করিয়া দেওয়া কর্তব্য । নিত্যস্থ অবসন্নতা বা রক্তসঞ্চালনের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে কোন মূহুর্বায়া স্নান বা ত্রাজী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রোগী আহাব গ্রহণে অসমর্থ হইলে বস্তি প্রয়োগ দ্বারা পথ্য প্রদান করা আবশ্যিক । কলরবপূর্ণ স্থানে রোগীর কণে তুলা দিয়া রাখা বা উহাকে স্থানান্তরিত করা ভাল । প্রতিদিন অন্ততঃ এক এক বার ঈষৎক জলে গামছা ভিজাইয়া রোগীর সর্কশরীর মোছাইয়া দেওয়া উচিত । বিশেষ সাবধানে রোগীকে পর্যাবেক্ষণ করা কর্তব্য যেন সে অজ্ঞানাবস্থায় স্থানান্তরিত হইতে চেষ্টা না করিতে পারে । সংক্রমণ নিবারণার্থ কয় ব্যক্তির বস্ত্রাদি ক্লোরাইড্ অব্লাইম্ মিশ্রিত জলে ধৌত করিবে এবং উহার গাত্র মার্জনার্থে যে জল ব্যবহার করিবে তাহার ৫ ছটাক পরিমাপ জলে ৫ বিন্দু বিপ্লব ক্যাক্টলিক এসিড মিশাইয়া লইবে ।

কাহারো রোগীর শুশ্রূষা করিবেন তাহারো যেন রোগীর নাসিকা হইতে নির্গত বায়ু অথবা শয্যাবস্ত্র পরিবর্তন সময়ে উহা হইতে নির্গত বাষ্প গ্রহণ না করেন । টাইফস্ জ্বর আক্রমণের আশঙ্কা জন্মিলে উহার প্রতিষেধক ঔষধ হাইসেন্সোয়েমাস্ ও ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার, বিপ্লব বায়ু সেবন এবং পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করা উচিত ।

(৬) অভিন্যাস জ্বর—আর্ডেন্ট অর সঃন-ফিবার।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রথমে সূর্যোদ্যানে যে প্রচণ্ড সত্ত্ব জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অভিন্যাস জ্বর বলে। কেহ কেহ ইহাকে এক প্রকার অর্জুণাত (সঃন-ষ্ট্রোক) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই জ্বর সহসা শীতানুভব সহকারে উপস্থিত হয়। ইহাতে সাতিশয় শিবঃপীড়া, শিরোগুণ্ণন, অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ, পিপাসা, শব্দদেশের শিবাস্পন্দ, অস্থিৰতা, বমনেচ্ছা ও পিত্ত বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নাড়ী দ্রুতগামী ও সবল, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয়। প্রায় ৬০ ঘটিকাব পরে, হয় রোগ উপশম পাইতে থাকে নর অট্টেতত্ত উপস্থিত হইয়া বোগীব মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—নাড়ীর অত্যন্ত অবসন্নতা ও মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতাদি লক্ষণে ক্যাম্ফর দুই বিন্দু মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তর, শবীর ঘর্ষাজ্ঞ না হওয়া পর্যন্ত এক একবার দিবে। মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ও অকস্মাৎ টেতত্তলোপ লক্ষণে গ্লানয়েন ব্যবহা করিবে। মুখমণ্ডলের আবদ্ধতা ও প্রলাপাদি মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণে বেলেডোনা উপযোগী। আক্ষেপাদি জন্মিলে হাইয়োমায়োমাস ব্যবহেয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে এই বোগে গ্লানয়েন অমোষ। কেবল মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় হইলেই তিনি বেলেডোনা ব্যবহার করিতে ব্যবহা দেন।

(৭) স্মৃতিক জ্বর—পিউয়ারপারাল ফিবার।

প্রসবান্তে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। জবাযুগ্মিত অমরাব (ফুলের) ছিন্নাংশ প্রভৃতি গলিত পদার্থ দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া ইহা প্রকাশ পায়। স্মৃতিকাজ্বর সন্নিপাত জ্বরের শ্রেণীভূক্ত। প্রসবের পর যদি কম্প, গাত্রোত্তাপ ও ঘর্ষাবস্থা যথানিয়মে উপস্থিত হইয়া ঘর্ষশ্রাবের পর বোগিনী স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে এবং তাহার স্তন স্ফীত হয় ও প্রসবান্তিক শ্রাব বিমুক্ত ভাবে নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা হইলে কোন আশঙ্ক্য কারণ থাকে না, প্রসবান্তিক জ্বর

সম্ভবতঃ পরবর্ণিত দুইজরে পরিণত হয়। কিন্তু যদি ঘর্ষ নিঃসরণের পরেও জ্বর উপশমিত না হয়, অপিচ, স্তন কোমল ও ক্ষুদ্র হয়, প্রসবাস্তিক আশ্রাব নিঃসরণ হ্রাস পড়ে অথবা একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায় এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে ১০০ বাব হইতে থাকে তবে হৃতিকাজর হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিতে পারে। এতৎসহকাবে শারীরিক শক্তির অবসন্নতা, শ্বাসকষ্ট ও স্তম্ভরোধ থাকিলে নিশ্চয়ই হৃতিকাজর বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। নিম্নোদরে বেদনা ও স্পর্শদ্রব, মলিন জিহ্বা ও দুর্গন্ধি নিশ্বাস প্রশ্বাস, মলিন মুখমণ্ডল এবং উদরানয় এই জরের সুস্পষ্ট লক্ষণ। হৃতিকাজর স্পর্শ-সংক্রামক। ধাত্রী দ্বারা এক প্রসূতি হইতে অল্প প্রসূতিতে সংক্রামিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—এই জরে প্রথমেই একোনাইট ব্যবহৃত হয়; মস্তিষ্ক-লক্ষণ না থাকিলে কেবল এই ঔষধেই জ্বর আরোগ্য হয়। স্তনের ক্ষীণতা ও যাতনা এবং বক্ষঃস্থলে বেদনাদি লক্ষণ থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া; মস্তকে রক্তসঞ্চয় বশতঃ শিরঃপীড়া, অত্যন্ত অস্থি-বতা, মানসিক যন্ত্রণা, অক্ষিতারের পরিবর্তনাদি প্রলাপেব পূর্ব লক্ষণে বেলেডোনা ও উহার সহিত মধ্যে মধ্যে পর্যায়ক্রমে একোনাইট ব্যবহার্য। জ্বর-লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে একোনাইটের পরিবর্তে ব্যাপ্টিসিয়া ও অল্প-লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনার পরিবর্তে রসটক্স ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। রোগেব প্রবর্তিত অবস্থায় মারকুরিয়স, হাইয়োসায়েনাস, ট্র্যামোনিয়ম, ওপিয়ম, ভেরেট্রুম-ভিরিডি, ফসফরিক এসিড, আর্সেনিক, ব্রাইয়োনিয়া, রসটক্স, নক্সভমিকা, ল্যাকেসিস, কলোসিস্ আদি ঔষধ লক্ষণানুসারে আবশ্যকীয় হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—রোগীকে বারংবার শীতল জলপান করিতে দিবে। যবেব মণ্ড ও দুগ্ধাদি পুষ্টিকর লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জল পান করিলে বমন উপশমিত হইতে পারে। দ্রবদুগ্ধ জলে গামছা ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে গা মোছাইয়া দেওয়া উচিত। নিম্নোদরে ক্ষীণতা ও বেদনা থাকিলে, ত্বসির উষ্ণ পোন্টিশ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

[৮] দুহু জ্বর—মিষ্ক-ফিবার।

সন্ধান প্রাপ্ত হইবার পরে দুহুপ্রাব হইতে আরম্ভ হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রসবের ২৪ ঘটিকা পরে দুহু প্রবাহিত হয়, কিন্তু কোন কোন প্রসূতির বিশেষতঃ প্রসবান্তে শীত লাগিলে দুহু নিঃসরণে বিলম্ব হইয়া কম্প, গাত্রোত্তাপ, ক্রতনাড়ী, স্তনবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সময়ে সময়ে এই প্রকাবের জরে গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ উৎপন্ন হয় এবং উহাতে কণ্টক-ভেদন যাতনা ও কণ্ডুয়ন থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে ঘর্ষ হয়।

• চিকিৎসা।—জরের প্রথম অবস্থায় শীত ও কম্প লক্ষণে চায়না বা ভিরেট্রম-ভিরিডি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শীত ও কম্প না থাকিয়া গাত্রের রুদ্ধতা, উত্তাপ; পিপাসা এবং অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট উপযোগী। ঘর্ষ নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হইলে ও দুর্বলতা থাকিলে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থা কর্তব্য।•

পথ্যাপথ্য।—অন্নমণ্ড, আবারুট, সাগু বা ধবেব মণ্ড প্রভৃতি ঈষদুষ্ণ তরল পথ্য ব্যবহৃত হয়। মানসিক উত্তেজনা পরিত্যজ্য।

[৯] পৌনঃপুনিক জ্বর—রিল্যাপ্সিং ফিবার।

এই জরকে দুর্ভিক্ষ জ্বরও বলে। পূর্বে ভারতবর্ষে এই জ্বর ছিল না, কিন্তু এক্ষণে মধ্যো মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ব্যাপক আকারেই ইহা আক্রমণ করে এবং পূর্বলক্ষণ ব্যতীত সহসা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।—পৌনঃপুনিক জ্বরের প্রারম্ভে শীত, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা এবং অবসন্নতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হুই তিন ঘটিকা এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিয়া সহসা গাত্র উত্তপ্ত ও রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং শিরোবেদনা ও গাত্রবেদনা বৃদ্ধি পায় এবং পিপাসা জন্মে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে ঘর্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রোগের লক্ষণ সকল উপশান্ত হয় না। এই জ্বরে চক্ষু কোন প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয় না,

কিন্তু সহসা বা ক্রমে ক্রমে পাণ্ডু প্রকাশ পায়। ইহাতে গাত্রতাপ ১০৪ হইতে ১০৮ অংশ এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে ১১০ হইতে ১২০ বার হয়। প্রথমতঃ জিহ্বা আর্দ্র ও পীতবর্ণ দেখাযায় থাকে, পরে শুষ্ক ও মধ্যস্থলে কণিষবর্ণ হয়। এই জ্বরে সাধারণতঃ কোষ্ঠরুদ্ধ থাকে। শ্রীহা ও বক্তৃৎ প্রদেশে বেদনা, স্পর্শ-দ্বেষ ও বিবর্দন এবং মস্তক ও গাত্রে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। কিন্তু কদাচিৎ প্রলাপ প্রকাশ পায়। সচবাচর বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকে, এবং হরিষণ পিত্ত বমন হয়। উৎকট বোগে ক্রমবর্ণ রক্ত ও বমন হয়।

পঞ্চম হইতে সপ্তম দিবসেব মধ্যে সহসা সমুদায় লক্ষণ বিলোপ পায় এবং অতিশয় ঘর্ষ হয়। সময়ে সময়েবা উদরাময় জন্মে এবং নাসিকা ও অন্ত্রাদি হইতে রক্তস্রাব হয়। অতঃপব কয়েক দিন পর্যান্ত জ্বর লক্ষণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত থাকে, জিহ্বা পবিত্রত ও ক্ষুধা প্রত্যাগত হয় এবং বোগী আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে। এ সময় নাড়ী স্বাভাবিক অপেক্ষা মন্দবেগ বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। অনন্তর ৬-৭ দিন পবে অর্থাৎ চতুর্দশ দিবসে অকস্মাৎ সমুদায় লক্ষণ পুনরায় প্রকাশ পায়। এই দ্বিতীয় আক্রমণ ৩ হইতে ৫ দিন বিদ্যমান থাকে, আবার ইঠাৎ জ্বর ছাড়িয়া যায়। কখন কখন তিন চারি বার এই প্রকার পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই এই জ্বকে পৌনঃপুনিক জ্বর বলে। রোগ উপশমিত না হইলে অনিবার্য বমন, চূর্মম্য পিপাসা, অতিক্রান্তনাড়ী, পাণ্ডু ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। এই জ্বরের পরিণামে ফুসফুস-প্রদাহ, বায়ুনলী-ভূজপ্রদাহ, রক্তস্রাব, অত্যন্ত গাত্রবেদনা, চক্ষুপ্রদাহ, মুত্র-শিথোর বাধি, গর্ভস্রাব, গলাবেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভিণী-দ্বিগ্নেষু এই জ্বর হইলে প্রায়ই গর্ভপাত ও গর্ভস্থসন্তানের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

অনুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে পৌনঃপুনিক জ্বরগ্রস্ত বোগীর রক্তে ও লালার এক প্রকার জীবিত কীটাত্ম দেখা যায়। এই সকল কীটাত্ম হস্ত হস্ত সূত্রের জায়। ইহাদিগকে স্পিরিলা বলে। জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থায়ই কেবল রোগীর রক্তে উহারা প্রত্যক্ষ হয়।

কারণ।—অনাহার ও অন্নাহারই এই রোগ উৎপন্ন হইবার প্রধান কারণ। কিন্তু অজ্ঞাত জ্বরের জায় জনতা, বিশুদ্ধ বায়ুসেবনবিহীনতা এবং অজ্ঞাত অস্বাস্থ্যকর কারণ বশতঃ এই জ্বরও বর্ধিত হয়। একবার উৎপন্ন

হইলে অনাহার-পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন অল্প লোকদিগকেও আক্রমণ করিয়া থাকে । সুতরাং ইহা স্পর্শ-সংক্রামক । বিষ গ্রহণের পাঁচ হইতে নয়দিবসের মধ্যে ইহা প্রকাশ পায় ।

বিনির্গয় ।—প্রথমাবস্থায় পৌনঃপুনিক জ্বর অত্যন্ত জ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পাবে । কিন্তু সহসা রোগের আক্রমণ, সত্ত্বর জ্বরের বৃদ্ধি, তৃতীয় বা চতুর্থদিবসে প্রচুর ঘর্ম, পেশীর ও সন্ধিস্থলের বেদনা, এবং কয়েকদিন বিরামের পরে পুনরায় পূর্বলক্ষণাপন্ন জ্বরের আবির্ভাব, এইগুলি ইহার বিশেষ বিনিশ্চয় লক্ষণ । সামান্য সন্তত জ্বরের সহিত ইহার প্রভেদ এইযে সামান্য সন্তত জ্বরে গাত্র-তাপের এত আতিশয্য ও নাড়ীর স্পন্দনের এত আধিক্য, এবং পেশীর এপ্রকার তীব্র বেদনা থাকেনা । স্বল্পবিরাম জ্বরের স্থায় পৌনঃপুনিক জ্বরে স্বল্পবিরাম লক্ষিত হয়না । টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরের স্থায় ইহাতে রোগীর গাত্রে পোড়কা উৎপন্ন হয়না ও মানসিক বৈলক্ষণ্য জন্মেনা ।

প্রজ্ঞান ।—এইরোগে শতকরা দুই চারি জনের মৃত্যু হইয়া থাকে । সাধারণতঃ নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ডিসেন্টারি প্রভৃতি উপসর্গ বশতই মৃত্যু হয় । কাহার কাহারও মূত্রের ইউরিনা নামক উর্গাদান সম্যক্রূপে নিঃসৃত নাহওয়াতে আক্কেপ উপস্থিত হইয়া ও তন্ত্রা-দোষ জন্মিয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে । আকস্মিক মূচ্ছা জন্মিয়াও কখন কখন মৃত্যু হয় ।

চিকিৎসা ।—পৌনঃপুনিক জ্বরে ব্রাইয়োনিয়া ১২, রসটক্স ১২, ও ব্যাপ্টিসিয়া ১ বিশেষ ফলপ্রদ । সঞ্চালনে গাত্রবেদনা বৃদ্ধি পাইলে ব্রাইয়োনিয়া এবং সঞ্চালনে বেদনা হ্রাস পড়িলে রসটক্স একমাত্রা প্রতিদিন প্রাতে ব্যবস্থেয় । পাকাশয়িক লক্ষণ থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহার্য । ব্রাইয়োনিয়া বা রসটক্স প্রয়োগে বেদনা উপশমিত না হইলে ইউপেটোরিয়াম-পারফোলিয়েটম ব্যবস্থা করা কর্তব্য । পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ হাইপোসলফাইট-অব-সোডা দিনে তিনবার ব্যবস্থেয় । ডাঃ কিড্ আয়ারল্যাণ্ডে এই রোগগ্রস্ত অনেকগুলি রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন । তিনি বিবিম্বা, বমন, উদরে স্পর্শদেয়, মলিন ও ব্যাকুলিত মুখমণ্ডল, মস্তকে উদ্ভাপ ও দশদশ, গাত্রে আমবাতেব স্থায় বেদনা ও ঘর্ম লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ডাঃ গুল্ড লিবারপুল নগরে

জলবৎ উদরাময় ও বমন এবং শোথ লক্ষণে রোগের আক্রমণ সময়ে আর্সেনিক ও বিরামকালে নক্স-ভমিকা ব্যবহার করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ডাইস্ ব্রাউন, এয়ারডীন্ নগরে ব্যাপ্টিসিয়া ১ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জেলসিমিনম চায়না ও পডোফিলম্ সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। ডাঃ ডিকিন্সন প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর ও গাত্র-বেদনা লক্ষণে জেল-সিমিনম; গাত্র-বেদনার সান্তিশয় তীব্রতায় জেলসিমিনম ও ব্রাইওনিয়া পর্যায়ক্রমে; বিরাম কালে কেবল ব্রাইওনিয়া; পুনরাক্রমণে পুনরায় জেল-সিমিনম; সন্নিপাত লক্ষণে, অর্থাৎ কপিশবর্ণ পবিত্রক জিহ্বা, দন্তে দন্ত-শর্করা, অতিসাব, ও উদরাধানে রসটক্স; পাণ্ডু লক্ষণে মারকিউরিয়স; কফি-বর্ণের পদার্থ বমনে আর্সেনিকম; বিবমিষা ও ভুক্তদ্রব্য বমনে ইপিকাক; বোগাস্থিক দৌর্জল্যে সিকোনা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। রোগান্তে দৌর্জল্য নিবারণার্থ ফসফরাস ও ফসফরিক এসিডও ব্যবহৃত হয়। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, অপথালমিয়া প্রভৃতি উপসর্গে ফসফরাস, ব্রাইওনিয়া, একোনাইট প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য। ক্যান্সার ও নক্সভমিকা এ রোগের প্রতিষেধক।

পথ্যাপথ্য।—এ রোগে পুষ্টিকর লঘুপথ্য দেওয়া কর্তব্য। অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা ও ঈষদ্ভক্ষ জলে দ্বান নিত্য আবশ্যকীয়। সংক্রমণ প্রতিষেধার্থে তৎপ্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা উচিত।

[১০] পীতজ্বর—ইয়ালো ফিবার।

পীতজ্বর আমাশয়ের উপরে বেদনা, তীব্র শিরঃপীড়া, প্রলাপ, কৃষ্ণবর্ণ বমন ও কৃষ্ণবর্ণ মলশ্রাব এবং পাণ্ডু লক্ষণাপন্ন একপ্রকার বিশেষ অবিরাম জ্বর। ইহাতে চক্ষু ও চর্ম পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীতজ্বর বলে। ইহার তিন অবস্থা। প্রথম বা উপদাহিত অবস্থা, দ্বিতীয় বা প্রদাহিত অবস্থা, তৃতীয় বা পতনাবস্থা। পীতজ্বর সংক্রামক। একপ্রকার বিশেষ বিষ ইহার উৎপত্তির কারণ। সমুদ্র তটপাশে শিরঃপীড়া, জিহ্বার সরের জ্বর ভ্রম আকৃতি, চক্ষুর

সজলতা ও আনন্দতা, বোগেব পপমাবিত্যই মূরে অণ্ডলাগেব বিদ্যমানতা, স্বকের পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বমন, এবং সংক্রামকতা এই ছিল পীতজ্বরের বিনির্দেশ লক্ষণ । এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে অস্বাভাৱ রোগ হইতে, বিশেষতঃ স্থল বিবাম জ্বর হইতে পীতজ্বরের পাতদ হইয়া থাকে । এই জ্বর এদেশে উৎপন্ন হয় না । ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপে, এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন স্থানে জন্মে । অতএব ইহাব বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লিখিত হইল না ।

চিকিৎসা ।—(১) প্রথম অবস্থা ।—কাম্ফর (শীত ও কল্ল), একল ও বেল পর্যায়ক্রমে (তীব্র জ্বর ও মস্তকে বেদনা), জেলস ও ব্রাই পর্যায়ক্রমে (চতুর্থ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে); সিমিসি (পৃষ্ঠ, অঙ্গ ও মস্তকে আমবাতবৎ বেদনা), ইপিথাক (বমন-প্রবৃত্তি বা বমন), এণ্ট-টাট (ইপিথাক সেবনে বিশেষ উপকার না দশিলে); চায়না (রক্তস্রাবের পর অবসন্নতা) । (২) দ্বিতীয় অবস্থা ।—আর্স ও মার্ক পর্যায়ক্রমে, কফি (রাত্রিতে অস্থিরতা); চায়না । (৩) তৃতীয় অবস্থা ।—আর্স ও কোটেলস পর্যায়ক্রমে । তৃতীয় অবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণেব ঔষধ ।—বমন ।—ক্রিয়েজোট, বা আর্জনাইট । নূত্রকটু বা নু : স্তম্ভ ।—কাহ্ন (বক্তবর্ণ বা রক্তময় মূত্র) । ক্যান-শাট (গাঢ়, ষোলামূত্র, অথবা শ্লেষ্মা কর্তৃক মূত্ররোধ); এসিস্ সল্ফ (রক্ত মূত্র); বেল, এসিস্, ডিজি। উদরাময়—মার্ক (রক্তময় মল); ভিরেট-এব (ক্ষুদ্রাঙ্গে আক্ষেপিক বেদনা), পডোফ (কৃষ্ণবর্ণ তবল মল), কার্কে-ভেজি (বমন, মল ও নিখাসে ভর্গজ), এসিড কস । জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বা গর্ভস্রাব ।—আবি (উজ্জল লোহিতবর্ণ বক্ত, গর্ভের প্রথম ২।৩ মাসে); সিকেল (কৃষ্ণবর্ণ রক্ত, গর্ভের প্রাবদ্ধিত অবস্থায়), হেমো (ধীরে ধীরে রক্ত স্রবণ) । ইয়ে (অত্যন্ত অবসাদ) । কাইয়োস (মূত্রশলাপ); ষ্ট্রামো (প্রচণ্ড উত্তপ্ততা) ।

আরোগ্যে মুখ অবস্থা ।—চায়না । প্রতিষেধক ।—একল, সিমিসি, ক্যাপি, অঙ্গারচূর্ণ; উষ্ণ স্নান ।

স্ফোট জ্বর—দি ইরাপ্টিব ফিবার্‌স।

(১) মসুরিকা—বসন্ত—স্নান পত্র।

বসন্ত, আশ্রাবপূর্ণ পীড়কাবিশিষ্ট এক প্রকার সংক্রামক অবিরাম জ্বর। এই রোগ একবার হইলে প্রায় আবার পুনরাবহ হয় না। কচিং এক ব্যক্তিব দুইবারও হয়। এই সংক্রামক রোগে পীড়কা সকল পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্মিলিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট (লেণা) এবং বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট সংমিশ্রিত থাকিলে অর্ধ সংশ্লিষ্ট বসন্ত বলে। বসন্তকালে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে বসন্ত বলে। বসন্তের জবে শীতের স্বরতা, উত্তাপের মুদ্রতা, বেদনা ও বিষমিষাব অমুগ্রতা থাকিলে বিশ্লিষ্ট গুটিকা এবং শীতের আতিশয়া ও পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি, তাপের প্রথবতা, বেদনার তীব্রতা, স্পষ্ট আমা-
শয়ক উপদ্রব, ১০৪ ডিগ্রী বা ততোধিক গাত্র-তাপ থাকিলে সংশ্লিষ্ট গুটিকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বসন্তের চারিটা অবস্থা। যথা, (১) পূর্বরূপ, (২) প্রাথমিক জ্বর, (৩) পীড়কা, (৪) দ্বিতীয়বার জ্বর। বিষমহণের পূর্ব হইতে রোগের প্রকাশ পর্য্যন্ত প্রথমাবস্থা; রোগের প্রকাশ হইতে পীড়কায় উৎপত্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থা; উদ্ভেদোৎপন্ন অবস্থা তৃতীয় অবস্থা; ও দ্বিতীয়বার জ্বর, বা চিপিটিকা পাতাদি চতুর্থ অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়।

লক্ষণ।—বসন্ত বিষ শরীরে সংক্রামিত হইবার প্রায় দ্বাদশ দিবস পরে জ্বর উৎপন্ন হয় এবং শীত, উত্তাপ, শিরঃপীড়া, গাঢ় লেপাবৃত গুল জিহ্বা, আরক্তমুখমণ্ডল, সর্বদিকে ঘূর্ণবৎ বেদনা, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে অতিশয় তীব্র বেদনা, আমাশয়-গহবরে স্পর্শদেয় ও সময়ে সময়ে বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৃষ্ঠবেদনা ও বমন উগ্র আকারের হইলে রোগের অক্রমণ ও উগ্র হইয়া থাকে। উৎকট রোগে মূত্র-বোধ ও উরুস্তম্ভও জন্মে, এবং সাধারণতঃ পীড়কা প্রকাশিত হইলে উহা নিবৃত্ত হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে আরক্ত চিহ্ন জন্মায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পীড়কা সকল প্রকাশিত হয়; এই সকল উদ্ভেদেব আকার মসুরের ত্রাণ বলিয়া এই রোগকে আম্যুর্কেদে, মসুরিকা বলে। প্রথমতঃ কপালে ও মণিবন্ধের সম্মুখে পীড়কা দৃষ্ট হয়। অনন্তর উহা ক্রমে সর্বগণনীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। স্বরস্র, কণ্ঠনালী ও

বায়ুনলীভূজের আবরণ-বিলীতে পীড়কা উৎপন্ন হয় বলিয়া বসন্ত রোগে লালাস্রাব, গলাবেদনা, কাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়কা সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হইলে পূর্বাংগ হইবার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট বসন্তে রোগের লক্ষণের অনেকটা বিবাম দৃষ্ট হয়। নাড়ীর বেগ, গাত্রের তাপ, এবং বেদনা বিলক্ষণ কমিয়া যায়। সংশ্লিষ্ট বসন্তে সর্কাদীন লক্ষণের কতকটা হ্রাস পড়ে বটে কিন্তু বিশ্লিষ্ট বসন্তের ত্রায় স্পষ্ট বিবাম পবিলক্ষিত হয় না। বসন্তের পীড়কা গুলি প্রথমে ফোটকেব ত্রায় রূপগ্রহণ হইতে থাকে এবং মধ্যভাগে অবনত হইয়া পড়ে ও উহা চারিদিকে প্রদাহিত মণ্ডল জন্মে। এই অবনতি বা নাভী ত্রায় আকৃতি বসন্ত-পীড়কার পরিচয়-লক্ষণ। পীড়কাগুলি পাঁচদিন পর্য্যন্ত আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। অনন্তর উহাদের অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ রস পৌতবর্ণ পুষে পরিণত হয়। তখন আব মধ্যস্থল অবনতি থাকে না। পীড়কা ক্ষীত ও অর্দ্ধমণ্ডলাকাব হইয়া উঠে। পীড়কায় পুষ উৎপন্ন হইবার সময় অক্লিপট, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ক্ষীত হয় এবং মুখমণ্ডলের বিকৃতি জন্মে। সংশ্লিষ্ট বসন্তে যোগীর মুখমণ্ডল বিসর্পেব ত্রায় ক্ষীত হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া ফেলে। রোগ অতিশয় তীব্র হইলে হস্তপদাদি, হৃদ-নিম্ন-গ্রন্থি ও কর্ণ-মূল-গ্রন্থি ক্ষীত হয়। কখন কখন প্রলাপও জন্মে। শব্দাবহ-খুঁটন, কণ্ঠ-স্পন্দন, স্থিতি প্রভৃতি অত্যাশ্রয় সন্নিপাত-লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই সময় বসন্তের রোগী গাত্র হইতে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। এই বিশেষ দুর্গন্ধও বসন্তের একটি বিনির্ণয় লক্ষণ। পীড়কা উৎপত্তির পর অষ্টম দিবসে পীড়কা সকল পবিপক হয় ও উহা হইতে আস্রাব নির্গত হইতে থাকে। অনন্তর চিপিটিকা উৎপন্ন হয় এবং শুষ্ক হইয়া ৪ : ৫ দিনে সেই গুলি পড়িয়া যায়। তৎপরে শরীরে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকে, যষ্ট বা অষ্টম সপ্তাহে তাহা বিলীন হয় অথবা ছবপনেগ অঙ্কে চিরদিন শবী কলঙ্কিত থাকিয়া যায়।

এই রোগে নবম হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে পীড়কা পক হইবার সময় দ্বিতীয়বার জ্বর হয়। অল্পকট রোগে দ্বিতীয়বারের জ্বর তিন চারিদিন থাকে, উৎকট রোগে অধিক দিন থাকে। এই জ্বর অতিশয় বিপদ জনক। সংশ্লিষ্ট বসন্তে এই সময় কখন কখন সাংঘাতিক বক্ষঃ-লক্ষণ বা শ্ববহ-প্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা শবীরে নানা ত্রাণ ফোটক জন্মে বা চক্রে ক্ষত

হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হয় । এবং বিসর্প, শ্বাসবোধ, বস্তুর বিগলিত অবস্থা প্রভৃতি হইতে মৃত্যুও হইয়া থাকে । পূর্ববর্ণিত লক্ষণগুলির সহিত সাংঘাতিকতা ও বিগলিততা সংযুক্ত থাকিলে অথবা বসন্তের গুটিকাগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিলে উচাকে সাংঘাতিক বা দূষিত বসন্ত বলে ।

উপসর্গ ।—এই বোগে বজ্রণ ও কক্ষগ্রন্থির ক্ষীণতা, বিসর্প, ত্রণ-শোথ, প্যারিসিয়া, গ্যাংগ্রেন, ফ্লিব্যান্টিস, নিউমোনিয়া, প্লুবিসি, ব্রঙ্কাইটিস, অতিসার, চক্ষু-প্রদাহ, কণীনিকার ক্ষত, ও কর্ণ-শ্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে এবং বোগীর জীবন রক্ষা পাইলেও কোন কোন উপসর্গে সে অন্ধ, বধির, বা থগ্ন হইয়া পড়ে । সঙ্কটাপন্ন বোগে রক্ত-শ্রাব ও বক্ত-মূত্রও ঘন্থে । গর্ভিণীর গর্ভশ্রাব বা অকালপ্রসব হয়, গর্ভস্থ সন্তান সাধারণতঃ মরিয়া যায় এবং গর্ভিণীর জীবন বিপদাপন্ন কবিয়া তোলে ।

ভোগ-কাল ।—বসন্তের আক্রমণাবস্থা দুই হইতে পাঁচ দিন, গীড়-কার অবস্থা পাঁচ দিন, পৃথোৎপত্তির অবস্থা চারি হইতে পাঁচ দিন; এবং শব্দ-পাতের অবস্থা পাঁচ হইতে বায় দিন অনতিদূর ন্যূনতঃ এই রোগের ভোগ-কাল ষোল হইতে সাতাইশ দিনসে পরিমাপ্য হয় ।

কারণ ।—বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ । সংস্পর্শে ও বাতাসে সংক্রামিত হয় । বসন্ত বিষ অত্যন্ত দূষিত বাষ্প অপেক্ষা অধিকতর হুম্ব ও স্থায়ী । বোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদিতে এই বিষ অনেকদিন অবস্থিতি করে । বেগের গাড়ী বা বাস্তাষ যাতায়াতে বোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে বা বাতাসে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । মৃতদেহে বসন্তের বিষ দুই এক বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে । গুটিকা পক্ষাবহার ও চিরিটিকা-পাতের প্রাবল্য-বহুয়ই ইহার অধিক প্রাবল্য দৃষ্ট হয় । সকল বয়সেই এই বোগ আক্রমণ করে । কিন্তু যুবক অপেক্ষা বালকেই ইহা সমধিক সংক্রামিত হয় । কাহার কাহারও সংস্পর্শেও বসন্ত জন্মে না ।

বিনির্গম ।—হাম ও পানী-বসন্তের প্রথমাবস্থার সহিত বসন্তের অনেকটা সাদৃশ্য আছে । অতএব প্রারম্ভাবস্থায় বসন্তরোগের বিনির্গমে ভ্রম জন্মিতে পারে । হামে উদ্ভূত উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রতিজ্ঞাপের লক্ষণ পাবে এবং তৎপূর্বদিনে গীড়কা প্রকাশিত হয় । হামের গীড়কা অক্ষচক্ষাকার

তয় এবং উহা ত স্পর্শে ত্বকেব নিম্নে মন্থব বা ছিটাগুলি সংলিপ্ত বৎ অমুভূত হয় না। বসন্তে অতিশয় কটিবেদনা থাকে, পীড়কা একদিন আগে প্রকাশ পায়, এবং স্পর্শে চর্মের নিম্নে মন্থবসংলিপ্তবৎ অমুভূত হয়। পানিবদ-স্তেব জ্বর মূহু হয়, কটিবেদনা থাকে না, পীড়কা শীঘ্র প্রকাশ পায়, স্পর্শে ত্বকেব নিম্নে মন্থব-সংলিপ্তবৎ অমুভব বিদ্যমান থাকে না, পীড়কা গুলির মধ্যভাগ অবনত হয় না, এবং সকল গুলিতে পুণ্ড জন্মে না।

প্রস্তান।—বসন্ত অতিশয় সাংঘাতিক রোগ। বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। একবৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদিগেব এই বোগে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জনের এবং বৃদ্ধদিগেব পঞ্চাশজনেরও অধিক সংখ্যকেব মৃত্যু হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। বোগীৰ বয়ঃক্রম, বোগের তীব্রতা, গুটি-কাব দ্বিবি বা অদ্বিবি প্রকৃতি, এবং উপসর্গেব তাবতন্যায়সাবে বসন্ত বোগে ‘সাব্যাসাধা’ নিদ্রিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাপ্ত ও সংলিষ্ট পীড়কা; স্ববয়স্ক ও কণ্ঠ নাগীৰ গুলক ও আক্রমণ, বক্ত্রস্রাব, অতিশয় অবসাদ, অপিরত প্রলাপ, অতিস্রাব, এবং নিউমোনিয়া, প্লুবিসি, ও ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি ফুসফুসের উপ-সর্গ এই বোগে অদ্ভুত লক্ষণ। গভাবস্থা ও বিপদজনক, গতিগাদিগেব বসন্ত হইলে বোগীগীর প্রাণ রক্ষা পাইলেও প্রাঘই গভাবস্থা বা অকাল প্রসব হইয়া থাকে এবং গভস্থ সন্তানেব মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।—একোনাইট, বেলডোনা, এপিস, ব্যাপ্টিমিগ, ব্রাইও-নিয়া, হেমেনেলিন, হাইওসাবেমাস, এন্টিমোনিয়ন টার্টাপিকম, ভ্যাকসিনাইন, ভেবিওগাইনন, থুজা, হিপাবসফার ও সাইলিশিবা বসন্তেব প্রধান ঔষধ। একন, জেল, ভিবেট-ভি (প্রবল জ্বর)। এন্ট-টাটি, হাইড্রাস ১৮, থুজা ০, সলফ (স্ফেটাবস্থা)। এন্ট টাটি, মার্ক, এপিস, ল্যাক (পূর্বাবস্থা)। ক্যাম্ফ, সলফ (পীড়কাবিলোপ)। অ্যাস বা ব্যাপ্টি (সান্নিপাতিক লক্ষণ)। সলফ, অ্যাস, কস (সাংঘাতিক ও সংলিষ্ট পীড়কা)। উপসর্গ,—কস, এন্ট-টাটি, (ফুসফুস-প্রদাহ); একন, ব্রাই (ফুসফুসে বক্ত্রস্রাব); ব্রাই, কা-বাইক্রম, এন্ট-টাটি (বায়ুনগীভূজ প্রদাহ); রস (পৃষ্ঠ-বেদনা); মার্ক (প্রস্থির ক্ষীণতা); এপিস, বেল (শোথ, আবদ্ধ চক্ষু, ক্ষীণ গলদেশ); বেল, হাইয়েস, ষ্ট্রাম, ভিরেটভি (প্রলাপ), অ্যাস, ব্যাপ্টি (সহসা অবসাদন ও মূৰ্ছাশয্যা)।

সলফ, স্বেদক জলে বারংবার গাত্র মার্জন (শঙ্কপাত) । পরিণাম,—
সলফ, নার্ক-করো (চক্ষু-প্রদাহ) ; হিপার, ফল, সলফ (ফোটক) ।

প্রধান প্রধান ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ ।

(১) একোনাইট ।—বোগের প্রথম অবস্থায়, গুটিকা উৎপন্ন হইবার পূর্বে কম্প, উত্তাপ, ত্বকের রক্ততা, দ্রুতনাড়ী, অস্থিরতা, পিপাসা, মস্তক-বেদনা, বমনেচ্ছা, বমন, পৃষ্ঠ ও কটি বেদনা প্রভৃতি জ্বরলক্ষণের প্রারম্ভে একোনাইট ব্যবস্থ্যয় । (২) বেলেডোনা ।—বসন্তের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মশূন্য জ্বালাকর উত্তাপ, শিরঃপীড়া, অনিদ্রা, প্রলাপ বা আক্ষেপ লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় । বালকদিগের বোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী । অপব, প্রবল মাস্তিক লক্ষণ, প্রলাপ, আলোকে বিদ্রোহ প্রভৃতি লক্ষণে কয়েক মাত্রা বেলেডোনা সেবন করিলে বসন্ত বসিয়া যাইবার আশঙ্কা নিবারিত হয় । (৩) এণ্ট-টার্ট ।—এণ্ট টার্ট বসন্তরোগের অমোঘ ঔষধি । বোগের প্রকৃতি নিরূপিত হইবামাত্রই ইহা ব্যবহার করা উচিত । পীড়কা উৎপন্ন হইলে এই ঔষধি প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ববর্তী জরেও বিবিধা, বমন ও আক্ষেপ থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয় । ফলতঃ এই বোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল এণ্ট-টার্ট, কিম্বা তৎসহকায়ে পর্য্যায়ক্রমে অল্প কোন ঔষধি ব্যবস্থা কবা যাইতে পারে । বোগ সুসাধ্য হইলে অবকালে একোনাইট ও চিপিটিকাপতন (ডেসকোয়ামেশন) সময়ে পরিণাম ফল নিবারণার্থ সলফার প্রয়োগ কবিলে এণ্ট-টার্ট ভিন্ন প্রায় অল্প কোন ঔষধি ব্যবহার কবা আবশ্যক করে না । ডাঃ ডিক্‌সন ইহাব ওদ চূর্ণ ব্যবহার করেন । (৪) মারকিউরিয়স ।—লালাস্রাব, গলক্কত, কর্ণমূলাদি গ্রন্থির ক্ষীততা, দুর্গন্ধ নিশ্বাস ও রক্তময় বা হরিতাভ আমলময় উদবাসময় লক্ষণে, বিশেষতঃ পুষোৎপাদন সময়ে মারকিউরিয়স উপযোগী । (৫) এপিস ।—বিসর্পবৎ ক্ষীততায়, গলমধোর ক্ষীততায় ও গলা বেদনায় এবং মুখমণ্ডল ও অক্ষিপুটাদির অতিশয় ক্ষীততায় এপিস ফলপ্রদ । (৬) কফি ।—অস্থিরতা ও অনিদ্রায় দুই তিন মাত্রা কফি ব্যবস্থ্যয় । (৭) ব্যাপ্টিসিয়া ।—আকস্মিক অবসন্নতা ও তন্নিবন্ধন মুচ্ছা প্রতিষেধার্থ ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহার্য্য । সারিপাত্তিক প্রকৃতির বসন্তে ইহা

ফলপ্রদ । [৮] ক্যাম্ফর ।—বদি পীড়কা সকল সহস্রা বিলীন হইয়া যায় অথবা সাংঘাতিক হইয়া উঠে ও তৎসহকারে শ্বাসকৃচ্ছ্র, গাত্রের শীতলতা ও মস্তিষ্কেব পক্ষাঘাতেব লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে দুই বিস্কু মাত্রায় ক্যাম্ফর কিঞ্চিৎ ঐষত্ব জল সহকারে পুনব মিনিট অন্তর বারংবার সেবন কবাইবে । গাত্র উত্তপ্ত ও পীড়কা প্রকাশিত হইলে ক্যাম্ফর সেবন বহিত করিবে । এতৎসহ উষ্ণ দ্রব-স্বেদ (হট-বাথ) ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

[৯] ওপিয়ম ।—তজ্জা বা অট্টেতজ্জ ও মশক নিশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষণে ওপিয়ম উপযোগী । [১০] ল্যাকেসিস ।—পীড়কা পক হইবার সময় শরীরে পূব শোষিত হইয়া সান্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ল্যাকেসিস অতিশয় উপকারী । [১১] সলফার ।—বসন্তরোগের গতির বৈধম্য জন্মিলে, গুটিকা সকল বিলীন হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, স্বচ্ছ ও পীত বর্ণ পীড়কাব পরিবর্তে হবিত, ধূমল বা কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবস্থ্যয় । সলফার দ্বারা সম্যক উপকার না দর্শিলে কার্বো-

ভেজিটেবিলিস, নাইট্রিক এসিড বা আর্মে'নিক ব্যবহৃত হয় । অপিচ, জ্বনিবার কণ্ডুয়ন ও পরিণাম ফল নিবারণার্থে সলফার বিশেষ উপযোগী । [১২] কার্বোভেজিটেবিলিস ।—অতিশয় দুর্গন্ধ, গুটিকার কালবর্ণ; অত্যন্ত অবসন্নতা, ক্ষীণ ও ক্রান্ত নাড়ী কার্বোভেজিটেবিলিসেব প্রয়োগ-লক্ষণ । (১৩) রসটক্স ।—সংশ্লিষ্ট বা দূষিত বসন্তে পীড়কার কৃষ্ণবর্ণ, বিদারিত পরিশুদ্ধ জিহ্বা, দম্বে দম্ব শর্কবা, মূত্ৰপ্রলাপ ও অতিসাব লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী । (১৪) ফসফরাস ।—বসন্তে নিউমোনিয়া উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শুষ্ক শ্বাস, ক্রান্ত শ্বাস, ও ফুসফুসেব বিধান-তন্ত্রের নিরেটতা জন্মিলে ফসফরাস ব্যবস্থ্যয় । (১৫) থুজা ।—পীড়কাব পক্ষাঘ-স্তায় ও চিপিটিকা-পাতেব সময় যে জ্বনিবার কণ্ডুয়ন জন্মে থুজা সেবনে তাহা নিবারিত হয় । পীড়কাব মামড়ির নীচে যে ক্ষত জন্মে এবং যে ক্ষতচিহ্ন গুলি পরিশেষে বসন্তের অক্ষরূপে বিদ্যমান থাকে, যথাসময়ে থুজা ব্যবহার করিলে সেই ক্ষত গুলিতে সুন্দর ফল দর্শে ও বসন্ত-চিহ্ন অনেকটা নিবারিত হয় ।

(১৬) ভ্যাক্সিনাইন ও ভ্যারিওলাইনম ।—অনেক চিকিৎসকই এই দুই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন । এতদ্বারা রোগের তীব্রতা মন্দীভূত,

ভোগ-কাল হ্রাসপাণ্ড, বিপদজনক লক্ষণগুলি মজ্বর দ্বীকৃত; এবং শীঘ্র
পুষ্টিোৎপন্ন হয়, ও তৎপার অবিলম্বে চিপিটিকা জন্মে। তথাও উল্লিখিত
আছে যে এই ঔষধে বসন্তের অঙ্কও প্রতিবিদ্ধ হয়। (১৭) হিয়ার।
—ফে টক বা অণ-শোথ জন্মিবাব আশঙ্কা উপস্থিত হইলে হিয়ার সলফার
ব্যবহৃত। (.৮) সাইলিশিয়া!—পুষ্টিোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত
হয়। কিন্তু গুটিকা পাকিলে পুষ্য পেশীর অভ্যন্তরে মীতা না জন্মাইতে পারে
এজন্য শীঘ্র শীঘ্র গালিয়া সাহিব করিয়া ফেলা ভাল। [১৯] কোনারম।
—কর্নিকাম দ্রুত জন্মিলে কোনারম আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রযোজিত
হইয়া থাকে। এক আউন্স পরিষ্কৃত জলে দশবিন্দু কোনারমের অরিষ্ট মিশ্রিত
করিয়া তাহার কয়েক বিন্দু প্রতিদিন তিনবার চক্ষে দিতে হয়।

ষষ্ঠাবিহিত গো মর্গ্যাদানেন বসন্ত পুনর্জ্বার বসন্ত হইলে প্রায়ই উৎপন্ন
(ভেবিওলয়েড) হয় অর্থাৎ পীডকা সকল পূর্ণ হয় না এবং পুষ্টিোৎপাদনের
আলুয়ঙ্গিক দ্বিতীয়বারের অব প্রকাশ পায় না। একপ অবস্থায় কেবল প্রথম
জ্বর ও উহার আলুয়ঙ্গিক লক্ষণ সকলের চিকিৎসাই আবশ্যকীয় হইয়া থাকে।
এ অবস্থায় একোইটি অপেক্ষা বেলেডোনা অধিকতর উপযোগী। সময়ে
সময়ে লক্ষণান্তসাথে জেলুমিনিয়ম, ব্যাপ্টিসিয়া বা ভিরেটুম-
ভিরিডি ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কটিবেদনার অধিক্য
ভিরেটুম-ভিরিডি প্রয়োগ-লক্ষণের মধ্যে একটী প্রধান লক্ষণ। বসন্তের
বিশেষ প্রাবল্য থাকিলে টার্টার এমেটিক ব্যবহৃত। পীডকা উৎপন্ন
হইলেও কেবলমাত্র এই ঔষধ সেবনেই বোগী আবোগোন্মুখ হইয়া উঠিতে
পারে। যাহাদেব টীকা হয় নাই তাহাদেব বসন্ত হইলে প্রথমেই ভ্যাক্সি-
নাইন্ তৃতীয় ক্রম বা টার্টার-এমেটিক তৃতীয় ক্রম সেবন কবান কর্তব্য।
ভ্যাক্সিনাইন্ সেবনে গো মর্গ্যাদানেন স্থাব উপকাব দর্শে। এমন কি
কখন কখন তৃতীয় দিবসেই জ্বর ও পীডকা প্রকাশ পায়। বসন্তের গুটিকা
পারে উৎপন্ন হইবার পবেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে এক দিবসের মধ্যে
গুটিকা সকল না পাকিয়া সঙ্কুচিত ও শুক হইয়া যায়। টার্টার-এমেটিক
সেবনেও প্রায় তদ্রূপ ফল দর্শে। পুষ্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে এই ঔষধ
প্রয়োগ করিলে প্রায়ই পীডকাব পুষ্য জন্মে না ও বোগের তৃতীয় অঙ্ক

উপহিত হইয়া । ভ্যাকসিনাইন বা টার্টার-এমেটিক ব্যবহার করিবার উপযুক্ত অবস্থা অতীত হইয়া থাকিলে বা ঐ ঔষধসম্মে কোন উপকার না দর্শিলে লক্ষণানুসারে মারকিউরিয়াস আদি পূর্কোন্নিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয় ।

প্রতিষেধক ।—সলফার, সিমিসিফা, ভ্যাকসিনাইন, সেরাসিনিয়া এই বোগের প্রতিষেধক ঔষধ । কিন্তু বসন্তের প্রাচুর্য্য সময় গোবীজে টীকা গ্রহণ অথবা সলফারের মূল অরিষ্ট ও বিমল বায়ু সেবন করিলেই এই দাক্ষণ রোগের হস্ত হইতে বিনূক থাকি যায় ।

বসন্ত-চিহ্ন ।—বসন্তের চিহ্ন নিবাবণার্থ মৃথমণ্ডলের পীড়ক। সকল কার্শলিক এসিডে নিমজ্জিত খুচা দ্বারা বিদ্ধ করা কর্তব্য । শূকরের বসা বা অলিত অয়েল লেপন কবিলেও বসন্তের অঙ্ক ও কণ্ডুয়ন অনেক পবিনাণে নিবান্নিত হইতে পারে । পীড়ক। বিদৌর্ণ হইবার পূর্বে সম পবিনাণ মিসিরিণ ও গোলাপজল বোগীর গাত্রে লেপন কবিয়া ততপবি একভাগ টার্টার এমেটিক প্রথম ক্রমে চূর্ণ ও আটভাগ ভায়োশেট চূর্ণ আন্তে আন্তে সংলগ্ন করিয়া দিলে বসন্ত-চিহ্ন নিবাবিত হয় । যতবার প্রয়োজনীয় হয় ততবার এই প্রকার প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে । বোগীর গাত্রে আলোক পতিত না হয় তন্নিমিত্ত এই প্রলেপ বিশেষ উপযোগী । বালকগণ নিদ্রাকালে শবীরে নথ বর্ষণ না কবতে পারে এ জন্ত উহাদেব হস্ত আবদ্ধ কবিয়া রাখা কর্তব্য । কার্শলিক এসিড চাবিভাগ, অলিত অয়েল চল্লিশভাগ, খটিকাব স্ক্রুচূর্ণ ষাটিভাগ একত্র মিশ্রিত কবিয়া বস্ত্র-খণ্ডে নাখাইয়া নাসিকা, মূত্র, ও চক্ষু স্থানে ছিড় করিয়া বাব ঘণ্টা পবে পবে নূতন কবিয়া এক একবার লাগাইয়া রাখিলে এবং হাতে ও বাহতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ড প্রয়োগ কবিলে কণ্ডুয়ন উপশমিত, চিপিটকা প্রবন্ধিত ও অঙ্ক নিবাবিত হয় । পীড়ক। শুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে আর এই প্রলেপ প্রযুক্ত্য নহে ।

পথ্যাপথ্য ।—বোগীকে শীতল দাখা ও উহাব গাত্রবস্ত্রাদি বাবাবাব পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত । বোগীর গৃহে বিস্তৃত বায়ু সঞ্চারিত ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকা আবশ্যক । বিস্তৃত বায়ু এ রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ । স্তবাসিত কার্শলিক এসিড মিশ্রিত কঁষড়জলে কোমল গাত্রমার্জ্জনী সিক্ত কবিয়া

মধ্যে মধ্যে রোগীর গাত্র মার্জনা করা বিহিত । শয্যা-কৃত নিবারণার্থ বারং-বার রোগীর অবস্থান পরিবর্তন করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় । পীড়কা বিদীর্ণ হইলে পুষ শোষণার্থ তথায় তণ্ডুল-চূর্ণ বা গোধূম চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য । রোগের শেষাবস্থায় পরিচ্ছন্নতা, ঈষৎ জলে গাত্র ধোঁত ও মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে স্নান বিশেষ আবশ্যক । জরের শ্রবল অবস্থায় ঔষধই আহাৰে প্রবৃত্তি থাকে না, তখন সামান্য জরের পথ্যই ব্যবস্থের । জ্বর তিবোহিত হইলে পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক পথ্য দেওয়া বিহিত । এ বোগে চা, যবেব মণ্ড, মাগু, আবাকট, তিন ভাগ দুধ এক ভাগ সোডা-ওয়াটার মিশ্র, মাংসের কাথ, স্বাস্থ্যকর সুপক ফল প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে । পানার্থ শীতল জলই প্রশস্ত, সময়ে সময়ে লেমনেড বা সোডা ওয়াটার দেওয়া যায় ।

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক বোগ । বোগীর গাত্র হইতে যখন গন্ধ নিঃসৃত হয়, তখনই বসন্ত-বিষ সমধিক তীব্র ও সংক্রমণশীল হইয়া উঠে । ফলতঃ প্রথম জব হইতে চিপটিকাপাত পর্য্যন্ত সকল সময়েই উহা সংক্রামিত হইয়া থাকে । সংক্রমণ প্রতিষেধক ঔষধ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি হয় দধ্ন করিয়া ফেলা, নয় ২১২ তাগাংথের উত্তম জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্তব্য । গৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত এবং দ্বারদ্বন্দ্ব করিয়া উহাতে গন্ধকেব ধূম প্রদান ও চূণেব জল প্রক্ষেপ করা কর্তব্য ।

—:○*○:—

[২] গো-মসূর্য্যাধান—গোবীজে টীকা ।

ভ্যাকসিনেশন ।

গো-মসূর্য্যাধান অর্থাৎ গো-বীজে টীকাদানই বসন্তের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক উপায় । ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ডাঃ জেনার ইউরোপে এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন । কিন্তু তৎপূর্বে যে এদেশে প্রাচীনকালে গো-মসূর্য্যাধান প্রচলিত ছিল আয়ুর্কেদেব কোন কোন গ্রন্থে তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় । গো বীজে টীকা গ্রহণ করিলেই যে একেবারে এই ভয়ঙ্কর বোগ হইতে নিমুক্ত থাকা

যায় এমন নহে, তবে সফল টীকা হইলে তৎপরে যে বসন্ত উৎপন্ন হয় সে বসন্তে প্রায়ই প্রাণ বিনষ্ট বা অঙ্গাদি বিকৃত হয় না ।

বসন্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত গো-বসন্তের বীজ মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করাইলে যে অব, পীড়কা ও ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট এক প্রকার কৃত্রিম রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে গো-মহুরিকা বা উপবসন্ত কহে এবং এই গো-বীজ প্রবেশ করাইবার প্রক্রিয়াকে গো-মহুর্যাধান বা ভ্যাক্সিনেশন বলে ।

এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সদৃশ চিকিৎসার অন্তর্গত । এতদ্বারা বসন্তের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত থাকা যায়, উহা সাংঘাতিকতা নিবারিত হয় এবং বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইলেও বিশেষ উৎকট আকারে প্রকাশ পায় না ।

গো-মহুর্যাধানের পবে বাহতে যতই অধিক ক্ষত-চিহ্ন থাকে ততই ভাল । চারিটা ক্ষত চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে পুনর্বার বসন্ত হইলে প্রায়ই লোক মরে না । টীকার চিহ্ন না থাকিলে দ্বিতীয়বার বসন্তের আক্রমণে প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে ।

একপে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অনুসারে এতদেশে গোবীজে টীকা দান পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে, অতএব এ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল ।

(১) যে বালকের গণ্ডমালা, কোলিক উপদংশ অথবা অন্য কোন ধাতু-গত দোষ নাই তাহারই “বীজ” দ্বারা অথকে টীকা দেওয়া উচিত । কোন প্রকার পীড়কা বা ত্রণ, গ্রন্থিব ক্ষীণতা ও চক্ষুপ্রদাহ থাকিলে বীজ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ । কারণ, ধাতুহুষ্ট রুগ্ন বালকদিগের বীজে টীকা দিলে সুস্থ বালকদিগের শরীরে ঐ সকল দোষ ও রোগ সঞ্চারিত হইতে পারে ।

(২) পরিষ্কার ছুরিকা ব্যবহার করা নিতান্ত কর্তব্য । নতুবা উপদংশাদি রক্তদোষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে । (৩) অষ্টম দিবসে বীজ গ্রহণ করা উচিত । উহাতে যেন রক্ত কিম্বা অন্য কোন শাণীরিক নিঃস্রব মিশ্রিত না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । (৪) বীজ ছই বাহতে অনান চারি স্থানে সংলগ্ন করা কর্তব্য । (৫) বালক যখন সুস্থাবস্থায় থাকে তখনই উহাকে টীকা দেওয়া বিহিত । প্রথম তিন মাসই টীকা দিবার প্রশস্ত সময় । তখন শিশুর কোন তরুণ রোগ বা চর্মরোগ না থাকিলে টীকা দেওয়া

যাইতে পারে। দন্তোদগম সময়ে ঢীকা দেওয়া উচিত নহে। (৬) ঘোবনের প্রারম্ভে স্বভাবতঃ শারীরিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় বলিয়া তখন পুনর্বার ঢীকা-দেওয়া আবশ্যিক। যদি পূর্বে ঢীকার ক্ষত-চিহ্ন একেবারেই না থাকে অথবা একটি মাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তবে পুনরায় ঢীকা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

চিকিৎসা!—গো-মহর্যাদানে প্রায়ই কোন চিকিৎসা আবশ্যক করে না। কিন্তু ঢীকার ক্ষত স্থান অতিশয় আরক্ত ও ক্ষীত হইলে দুই তিন মাত্রা একোনাইট বা বেলেডোনা ব্যবস্থা করা উচিত। কাহার কাহার ক্ষত-স্থানে পোন্টিশ বা স্ক্রু তণ্ডুল চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যকীয় হইতে পারে। পীড়কাগুলি সাবিয়া যাইবার সময় কয়েক দিন প্রাতে ও রাত্ৰিতে সলফার সেবন করাইলে ধাতুগত দোষ বশতঃ চর্ম-রোগ বা চক্ষু-রোগ জন্মিবাব সম্ভাবনা দূরীকৃত হয়। গো-মহর্যাদানের মন্দফলে লক্ষণাঙ্কসাবে খুজা ও সাইলিশিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যাংকষ্ট বীজবা বা ঢীকাদিনেও সময়ে সময়ে উচা হইতে অসুখকর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ঢীকা দিবার পবে একমাত্রা সলফার সেবন করাইলে প্রায়ই ঢীকার উপসর্গস্বরূপ অল্প কোন বোগ উপস্থিত হয়না। ঢীকান্তে বিদর্প, আক্ষেপ বা অতিসার প্রভৃতি জন্মিলে সাইলিসিয়া প্রয়োগে তাহা আরোগ্য হয়। ঢীকায় পরবর্তী অতিসাবে, ও ঢীকায় অব অতিশয় প্রবল হইলে, অথবা গাত্রে বসন্তের জ্বাশ পুষ্পপূর্ণ পীড়কা জন্মিলে খুজা উপকারী।

[৩] রসগত মসুরিক!—পানি বসন্ত

—জল বসন্ত।

চিকেনপক্স-ভেরিসেলা।

পানি বসন্ত বসপূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট এক প্রকার ঘৎসামান্য সংক্রামক জ্বর। বালকদিগেরই অবিকাংশ এই বোগ হইয়া থাকে। প্রকৃত বসন্তের সহিত ইহার আকাংগত সাদৃশ্য আছে স্ততরাং প্রারম্ভাবস্থায় ইহাকে

বসন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু প্রকৃত বসন্তে ও পানবসন্তে প্রভেদ এই, যে পানবসন্তের জ্বর অতি মৃদু ও পীড়কার মধ্যভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত। এই সকল পীড়কা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে এক প্রকার জলবৎ রসে পূর্ণ হয়; কিন্তু প্রকৃত বসন্তের ছায় উহাতে কখনই পীতবর্ণ পুষ্প জন্মে না। ছয় সাত দিবসেই ইহার ভোগ-কাল পর্য্যবসিত হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে পীড়কাগুলি শুষ্ক হয়। ইহাতে আরোগ্যান্তে গাঁজে চিরস্থায়ী চিহ্ন থাকে না।

চিকিৎসা।—বসটক্সই এরোগেব প্রধান ঔষধ। যদি নিম্নলিখিত কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে কেবল এই একমাত্র ঔষধ সেবনেই নীত্র পানিবসন্ত আযোগ্য হয়। অরলক্ষণে একোনাইট, শিরোলক্ষণে বেলেডোনা; পীড়কার অতি কণ্ডুয়ে এপিস, এবং দুই একটি পীড়কার পূর্ব জন্মিলে মার্কিউরিয়স ব্যবস্থেয়। আমাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্যের আধিক্যে এন্ট-ফুড ও পলসেটিল ফলপ্রদ।

পথ্যাপথ্য।—এ বোগে দ্রব পথ্যই উপযোগী। শীত বা বসন্ত ঋতুর আবস্তে সর্দি লাগান উচিত নহে।

[৪] রোমাত্তী—হাম--মিজলুস।

ইহা এক প্রকার সংক্রামক ফোটজর। হামকে আয়ুর্বেদে রোমাত্তী কহে। হামের দুই অবস্থা যথা, প্রাতিজ্বরিক অবস্থা ও ঔদ্ভেদিক অবস্থা। বাল্যকালেই সাধারণতঃ এই জ্বর আক্রমণ করিয়া থাকে। হামের বিষ সংক্রমণের পবে ১০ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে জ্বর-লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

লক্ষণ। এই রোগের প্রারম্ভে অল্প অল্প জ্বর ও সর্দি, চক্ষু বেদনা ও আশ্রুস্রব, গলাবেদনা, শিরোবেদনা, বমন, হাঁচি, কাশ, কখন কখন অঙ্গবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাহারও অতি-সায়ণ থাকে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইবার পর তৃতীয় দিবসের শেষে বা চতুর্থ দিবসে পীড়কা উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ কপালে, মুখমণ্ডলে

ও গ্রীবাদেশে, অনন্তর দেহে এবং সর্বশেষে হস্ত পদে পীড়কা প্রকাশ পায়। এই সকল পীড়কা গোলাকার ও রক্তবর্ণ, অঙ্গুলী দ্বারা চাপিলে বসিয়া যায় এবং অঙ্গুলী তুলিয়া লইলেই পুনরায় প্রকাশ পায়। পীড়কাগুলি অসম ও অর্ধচন্দ্রাকার স্বূপে স্বূপে উৎপন্ন হয়। পীড়কা প্রকাশিত হইলে জ্বর অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে। নাড়ীর সঘনতা ও দ্রুততা বৃদ্ধি পায়। গাত্র-তাপ ১০০ বা ১০৩ ডিগ্রী হয়। পীড়কা উদ্ভূত হইবার তিন চারি দিন পরে উহার পুনরায় শরীরের সহিত মিশিয়া যায়। বসন্তের জ্বর এ রোগে পীড়কা উৎপন্ন হইলেই জ্বরের বিরাম পড়ে না। কিন্তু পীড়কা বিলীন হইয়া যাইতে আরম্ভ হইলেই জ্বরও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পড়িতে থাকে। কখন কখন আর এক প্রকার দূষিত হাম জন্মে। উহাকে কৃষ্ণবর্ণ হাম বলে। ইহার সহিত সন্নিপাত-লক্ষণ থাকে। পীড়কাগুলি সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না, উহাদের বর্ণ কাল থাকে। রোগীর অতিশয় অবসন্নতা, মুহুপ্রলাপ, বা অস্থি; দন্তে দন্ত শর্কবা, জিহবার নীরসতা ও কণ্ঠশতা এবং নাড়ীর দ্রুততা ও ক্ষীণতা জন্মে। এই প্রকার হামে ফুসফুসের রক্ত-সঞ্চয়, স্বাভাবিক ক্রুপ বা নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপসর্গ প্রায়ই বিদ্যমান দেখা যায়।

উপসর্গ।—হামজ্বরে সময়ে সময়ে বায়ুনলীভূজপ্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, কাশ, উদরায়ম প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, এই সকল উপসর্গ জন্মিলেই রোগ উৎকট হইয়া উঠে।

পরিণাম।—পূরাতন স্বরবন্তপ্রদাহ ও বায়ু-নলী-ভূজ-প্রদাহ; ক্ষয়-কাশ; এবং চক্ষু-প্রদাহ হামের প্রধান পরিণাম।

বিনির্গম।—প্রতিজ্বর, কাস, ও পীড়কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বারা অস্বাস্ত রোগ হইতে সহজেই হামের প্রভেদ করা যায়। আরম্ভ জ্বরে প্রতি-জ্বর, কাশ, ও পীড়কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি থাকে না। রোজিওলা বা কুজিম হামের পীড়কা প্রথমে বক্ষঃস্থলে প্রকাশ পায় এবং উহার সহিত সর্দি ও কাস থাকে না। বসন্তে রোগীর স্বকম্পর্শে সহ্য সংলিপ্তবৎ বোধ হয় ও স্তম্ভীত কটিবেদনা থাকে; হামে এ প্রকার অসুভব বা কটিকেনা বর্ত-মান থাকে না।

প্রজ্ঞান ।—এই রোগে অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করে। তবে হামের সহিত কৈশিকবায়ুনলীভূজ-প্রদাহ অথবা ফুসফুস-প্রদাহ সংসৃষ্ট থাকিলে রোগ গুরুতর হইয়া উঠে। কৈশিক বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ-উপসর্গ সংযুক্ত হাম, অথবা ফুসফুসের ক্ষয় রোগকালে হামের প্রকাশ সুলক্ষণ নহে। হামের আক্রমণের পরবর্ত্তী প্রাচীন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ বায়ুনলী-ভূজ-প্রদাহ, ও চক্ষু-প্রদাহ সহজে আরোগ্য হয় না। যন্ত্রার সম্ভাবনা থাকিলে অনেক সময় হামের পরিণামে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা ।—শরীরের উত্তাপ হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত একোনাইট সেবন করান কর্তব্য। বসন্তের জ্বাঘ এ রোগে পীড়কা উৎপন্ন হইলেই শরীরের উত্তাপ হ্রাস পড়ে না অতএব রোগের ভোগকাল পর্য্যন্ত একোনাইট ব্যবহার করা যাইতে পাবে। জ্বর না থাকিলে কেবল পলসেটিলা সেবনেই এ রোগ উপশমিত হয়। সর্দিজনিত উপসর্গ নিবারণার্থ একোনাইট সহকারে অস্ত্রাভ্র উপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অধিক উপকার দর্শে। চক্ষু ও নাসিকার উপসর্গে ইউফেসিয়া পরম উপকারী। তন্ত্রাদি শিরোলক্ষণে বেলেডোনা উপযোগী। উদরের উপসর্গ অর্থাৎ উদরাময়ে পলসেটিলা কলপ্রদ। বিরক্তিকর কাশে কালী-বাইক্রমিকম বিশেষ উপযোগী। কেহ কেহ বায়োলা-ওডোরেটা ও কাফি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অস্ত্রাভ্র গুরুতর উপসর্গ ও পরিণামফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোগ স্বরূপ। উহাদের বিস্তারিত চিকিৎসা সেই সেই রোগের অন্তর্গত। এস্থলে সংক্ষেপে কতকগুলির বিষয় উল্লেখ করা গেল। পীড়কা সম্যক প্রকারে প্রকাশিত না হওয়াতে অথবা বসিয়া যাওয়াতে যদি গাত্র নীতল হইয়া পড়ে ও অবসন্নতা জন্মে, তবে বারংবার ক্যাম্ফর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে; আক্ষেপ জন্মিলে জেলসেমিনম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিশেষরূপে বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হইলে, এথোনিয়ম কার্বনিকম ১ ক্রম কলপ্রদ; কেহ কেহ ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করেন। ফুসফুস প্রদাহে ফসফরাস উপকারী। মস্তিষ্কের উপসর্গে কুশ্রম্ এসেটিকম ব্যবস্থের। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের রোগ শীঘ্র আবোগ্য না হইলে কিয়ৎকাল সলফার সেবন করান আবশ্যকীয়। রোমাস্ত্রী সাংঘাতিক

আকার ধারণ করিলে আর্সেনিকম প্রয়োগ করা উচিত ।

পরিণাম ।—চক্ষুপ্রদাহে—মার্ক-কবো, সলফ, একন, বেল ; কর্ণপ্রাণ ও বধিরতায়—পলস, সলফ, সিলি, মার্ক, হিপার ; গ্রন্থিৎ ক্ষীণতায়—মার্ক-আইয়োড, ক্যাক, লাইক ; পুরাতন কাশ ও শ্বসনরোগাদি বক্ষঃস্থলের পীড়ায়—কস, হিপার কা-বাই, স্পঞ্জ, আর্স, কঠে, কার্কো, সলফ ব্যবহৃত ।

প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ ।

(১) একোনাইট ।—তীব্র জ্বর, শুষ্ক কাশ । (২) ব্রাইওনিয়া ।

পীড়কা বর্ষা সময়ে প্রকাশিত না হইলে অথবা বসিয়া গেলে এবং তৎসহকারে বর্ষাশূল উদ্ভাপ. শিরোবেদনা, পিপাসা, লেপাবৃত্তি জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয় । অপবহামে ফুসফুস প্রদাহ উপসর্গ উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ উপযোগী । (৩) পলসে টিলা ।—বমন, উদবোদ্ধাদেশে বেদনা, আহাবে অরুচি, ধূসরভ লেপে জিহ্বার গাঢ় আচ্ছন্নতা, মুখ বৈরস্য প্রভৃতি আমাশয়িক লক্ষণেব প্রাবল্যে পলসেটিলা ব্যবহৃত । (৪) এণ্টে-টার্ট ।—হামেব সহিত বায়ুনলী-ভুজ-প্রদাহ উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শ্বাসের হাঁস ফাঁস বা ঘড় ঘড় শব্দ ও প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণ থাকিলে টার্টার-এমেটিক প্রযুক্ত্য ; অপন, দ্রুত শ্বাস, আকর্ণনে আর্দ্র অন্ন অন্ন কেশবর্ষণ-ধ্বনি, ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র লক্ষণে কৈশিক বায়ুনলীভুজপ্রদাহে ও এই ঔষধ উপযোগী । (৫) ইপিকাক ।—প্রতিনিয়ত বিবগিধা, শুষ্ককাশ, আকর্ণনে বায়ুনলীতে হিম্‌হিস শব্দ লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত । (৬) ফসফরাস ।—আবোগ্যোম্মুখ অবস্থায় শুষ্ককাশে, ফুসফুসেব পুরাতন নিরেটতায়, অথবা বক্ষা-সন্তানার এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

পথ্যাপথ্য ।—জ্বরের প্রবল অবস্থায় শীতল জল, গর্দভের জল, যবের কাণ প্রভৃতি শীতল পথ্য ব্যবহৃত । কোন প্রকার উত্তেজক জন্ম দেওয়া বিহিত নহে । জ্বর উপশম পড়িলে দুগ্ধ পথ্য দেওয়া বাইতে পারে । দ্রবদ্রব্য জলে গামছা ভিজাইয়া প্রতিদিন দুই তিন বার রোগীর গাত্র মোছাইয়া তৎক্ষণাৎ আবার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উষ্ণ শুষ্ক করিয়া দিবে । এই বোগে বাৎসরিক রোগীকে বস্ত্র পরিত্যাগ কবান উচিত ।

প্রতিষেধক ।—হামের প্রাচুর্য্যব সময়ে বালকদিগকে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে এক মাত্রা পলসেটিলা ও সায়াঙ্কে এক মাত্রা একোনাইট সেবন করাইলে উহার সংক্রমণ ও আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে ।

[৫] আরক্ত জ্বর—স্কার্লেটফিবার-স্কার্লেটিনা ।

আরক্ত জ্বর এক প্রকার সংক্রামক বোগ । ইহা এদেশে প্রায়ই হয় না । এই রোগে বালকেবাই প্রধানতঃ আক্রান্ত হয় । দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসর বয়সেই ইহাব আক্রমণেব বিশেষ প্রাচুর্য্যব দেখা যায় । এই জরে গাত্রে রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে আরক্ত জ্বর বলে ।

লক্ষণ ।—আরক্ত জ্বরেব পূর্ব্বরূপ পাঁচ দিন বিদ্যমান থাকে । অনন্তঃ কম্প, গাত্রতাপ, ক্রতনাড়ী, পিপাসা, গলাবেদনা, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদন ও বমন প্রভৃতি জ্ব-লক্ষণ সহকারে এই বোগ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় । এই সকল পীড়কা প্রথমতঃ গীবা ও বক্ষঃস্থলে, তৎপরে বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিস্থানে, অনন্তর সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পায় । পীড়কা গুলি অতিশয় ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মগ্র হইয়া থাকে । কিন্তু চক্ষোপরি এত উন্নত হয় না যে স্পর্শ কবিলে অনুভব করা যায় । চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে পীড়কা সকল হ্রাস পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে একেবারেই অন্তর্হিত হয় । এই বোগেও মহাবিকা এবং রোমান্তিকাব ছায উপজক স্থলিত হইয়া থাকে ।

আরক্ত পীড়কা, গাত্র ও রক্তেব অত্যন্ত উত্তাপ (১০৫ তাপাংশ), রক্তবর্ণ ও উন্নত জিহ্বা-কণ্টক, এবং গলাবেদনা আরক্ত জ্বরেব বিশেষ পরিচয়-লক্ষণ ।

আরক্ত জ্বর ও রোমান্তিকাব প্রভেদ এই যে, রোমান্তিকাব পীড়কা অসমগাত্রা । রোগীর স্বকের উপব হাত বুলাইলে এই অগমতা বিলক্ষণ অনুভূত হয় । আরক্ত জ্বরেব পীড়কায় এ প্রকাব বন্ধুরতা থাকে না । রোমান্তিকাব পীড়কা দীর্ঘ কৃষ্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ, আরক্ত জ্বরেব পীড়কা

উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। অধিকন্তু, অশ্রুস্রাব, হাঁচি প্রভৃতি বোম্বাস্তিকার প্রথম অবস্থার লক্ষণ সমস্ত সাধারণতঃ আরক্ত জ্বরে বিদ্যমান থাকে না।

আরক্ত জ্বরে কেবল চর্ম আক্রান্ত হইলে রোগ সহজসাধ্য থাকে। চর্ম ও গলমধ্য আক্রান্ত হইলেও তত উৎকট হইয়া দাঁড়ায় না। কিন্তু চর্ম ও গলমধ্য আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যদি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে রোগ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে এবং ইহাকেই সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর বলে। এই প্রকার আরক্ত জ্বরে কপিশবর্ণ জিহ্বা, মুহূর্ণালাপ অসম্মত পীড়কা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপিচ, পীড়কাগুলি স্বাভাবিক বর্ণ অপেক্ষা একটু মলিন হয় এবং একবার প্রকাশিত ও একবার বিলুপ্ত হয়। গলমধ্য মলিন, কৃষ্ণবর্ণ ও গলিত হইয়া উঠে এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে বোগী পঞ্চম প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার আরক্ত জ্বর একরূপ সাংঘাতিক যে কেবল অত্যন্ত মবল রোগী প্রথম হইতে অচিকিৎসিত হইলে রক্ষা পাইতে পারে।

চিকিৎসা।—(১) সামান্য আরক্ত জ্বরে বেলেডোনা ও একোনাইট পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। আরোগোবুধ অবস্থায় সলফার উপযোগী। (২) গল-লক্ষণ সংযুক্ত আরক্ত জ্বরে গলায় ক্ষত হইলে মার্কিউরিয়াস উপযোগী; অত্যন্ত ক্ষীণতায় এপিস্ বিধেয়। (৩) সাংঘাতিক আরক্ত জ্বরে প্রারম্ভ-বস্থায় এইলাক্সম বারংবার প্রয়োগ করা কর্তব্য। অপিচ, ব্যাপ্ট, আর্স, এপিস্, জেলস্, এসিড মিউন, কন্স, ওপি প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করা উচিত। বেলেডোনা এ রোগের প্রতিষেধক।

ডেঙ্গুজ্বর—ডেঙ্গুফিবার।

শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, শীত, দুর্বলতা, গৃষ্ঠ, অঙ্গ ও সন্ধিস্থলে ক্ষতীয় বেদনা এবং অঙ্গ বা অধিক অবভাষ ডেঙ্গুজ্বরের প্রথম লক্ষণ। ক্রিয়াকাল পরে অর্থাৎ প্রথম পীড়া অম্লভূত হইবার প্রায় দ্বাদশ ঘটিকার মধ্যে গাত্রের রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই পীড়কা প্রায় দুই দিবস থাকে। জ্বর কালীন গাত্রতাপ ১০৩ বা ১০৪ অংশ উদ্ধিত

হয় এবং নাক্তী প্রতি মিনিটে ১২০ বার স্পন্দিত হয়। গাত্রতাপ ও নাক্তীর গতির এই বিবর্তিত ভাব কেবল জ্বরের প্রথম অবস্থায়ই থাকে এবং ইহা সচরাচর সঙ্কটজনক নহে। পীড়কা লীন হইতে আরম্ভ হইলেই জ্বর হ্রাস পড়ে এবং দুই তিন দিন পর্যন্ত জ্বরের প্রায় সম্পূর্ণ বিয়ান থাকে। অনন্তর জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয়বার পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই জ্বরের পীড়কা রোমান্তিকার (হাম) জ্বর। ইহা কতিপয় ঘটিকা অথবা অধিক হইলে দুই দিবস থাকে। কখন কখন দ্বিতীয় বারের পীড়কাগুলি শীত-পিত্তের জ্বর দেবায় এবং উহাতে অতিশয় কণ্ডুয়ন থাকে। দ্বিতীয় বারের জ্বর ও পীড়কার পরে রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অপ্রাক্ষুণ্য হইয়া পড়ে এবং তাহার সন্ধিতানে আমবাতের বেদনার জ্বর বেদনা অমুভূত হয়। ডেস্জুর ব্যাপক ও স্পর্শ সংক্রামক। যুবক, বালক ও শিশু সকল-কেই এই জ্বর আক্রমণ করে। এই জ্বরের গাত্রবেদনা বশতঃ শিশুরা যে চকিত হইয়া উঠে উহা আক্ষেপ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু জ্বরের পরে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেব যে প্রকার যন্ত্রণাকর গাত্রবেদনা থাকে সৌভাগ্যক্রমে বালকদিগের সেরূপ থাকে না।

চিকিৎসা।—প্রথম অবস্থায় প্রাদাহিক লক্ষণে ও গাত্রবেদনার একোনাইট ব্যবস্থেয়। তৎপরে অস্থিবেদনা নিবারণার্থ ইউপেটোরিয়াম্ পার ফোলিয়েটম্ বিশেষ ফলপ্রদ। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে পেশী বেদনা একোনাইটের পরিবর্তে জেলসিমিনম প্রয়োজ্য। পীড়কা উৎপন্ন হইলে শ্লৈষিক ঝিল্লী ও চর্ম্মের লক্ষণে রক্তগ্ন ব্যবস্থেয়। শরীরের নানা স্থানে থলী (খাল) ধরিলে তিরেট্রাম্ এলবম্; গ্রীবা, কক্ষ, বক্ষণ (কুচকী) ও অন্তঃস্থিত হইলে মাক্‌রি ও ক্রিসেটিস প্রয়োজ্য। পরিণাম ফল নিবারণার্থ ফাইটো, আসেনিক ও মলকার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

বিলেপীজ্বর—হৌতিক ফিবার ।

ত্রণ, হুসহুস ও সন্ধি রোগাদি হইতে অধিক পরিমাণ জ্বর নিঃসরণ বশতঃ বিলেপী জ্বর উৎপন্ন হয়। যত দিন আশ্রাব বৃদ্ধ থাকে ততদিন জ্বর সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না; কিন্তু অধিক পরিমাণে বা অনেক দিন

পথ্যাস্ত্র প্রাব নিঃসরণ হইতে থাকিলে জ্বর হইবার আশঙ্কা জন্মে । কোন কোন অবস্থায় ষথা, বক্ষঃস্থলে মস্ত-সঞ্চয় (Effusion) হইলে অর্থাৎ ফুসফুস-বেষ্টের প্রাচীন প্রদাহে শরীরের বহির্ভাগে আস্রাব নির্গত না হইলেও অল্প অল্প বিলেপী জ্বরেব লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে । সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই জ্বর উপস্থিত হয় এবং প্রত্যুষে বিরাম পড়ে । জ্বরেব প্রাবস্তে কম্প ও শীত অঙ্কুভূত হয়, অনন্তর ত্বক্ উত্তপ্ত ও কক্ষ হয়, চক্ষু ও মুখ উজ্জ্বল দেখায় এবং এক মিনিটে ১২০ বাব নাড়ীর স্পন্দন হয় । বোগী আবিগ ও দুর্গন্ধি মূত্র ত্যাগ কবে । প্রথমতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে অনন্তর বারংবার জ্বরের আক্রমণের পর উদবাময জন্মে । জিহ্বাব মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ লেপাবৃত এবং অগ্র ও প্রান্তভাগ পবিকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় । সচরাচর তীব্র শিশিঃপীড়া, অস্থিবতা এবং শবীবের অভ্যন্তরে জ্বালা থাকে । প্রাতে অতি শয ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া জ্বরের বিবাম হয় । কিন্তু ঘর্ম্মপ্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে । দিবাভাগে জ্বব থাকে না । বিলক্ষণ ক্ষুধাব উদ্বেক হয় । বারংবার জ্বর হওয়াতে ক্রমশঃ বোগীর বলক্ষণ ও শীর্ণতা জন্মে । বিলেপী জ্বরগ্রস্ত বোগী সহজে বিমর্ষ ও উত্তেজিত হয় কিন্তু কখনই আঁবোগ্যাশায় নিরাশ হয় না । যতদিন পূয়প্রাব হয় তত দিন জ্বব থাকে । কিছুকাল পরে উদরাময জন্মে । এই উদরাময স্তূলক্ষণ নহে, কেন না এতদ্বারা রোগীর দুর্ব্বলতা বর্দ্ধিত হয় ।

চিকিৎসা । —বিলেপী জ্ববে লক্ষণান্তসাবে চায়না, ফকরিক এসিড, জেলসিমিনম, ফকবাস, আর্সেনিক, টিপাবসলফব, সিলিশিয়া, সলফার, ঠ্যানম্, স্তাষ্টুকস্ আদি ঔষধ ব্যবহেয় ।

সবিরাম জ্বরের রিপোর্টরির সূচীপত্র ।

শীত । উত্তাপ । ঘর্ম্ম । বিরাম ।

অভাব ...	১	৩২	৪৮	৬২
বিদ্যমানতা ..	১	৩২	৪৮	৬২
পূর্বলক্ষণ ...	৪	৩৩	৪৯	...
উপস্থিতির সময়	৫	৩৩।৩৬-অ।	৪৯	...
আরম্ভ-স্থান ...	৯			...
অবস্থান-স্থল .	১০	৩৩।৩৬-অ।	৫৩	...
প্রকৃতি ...	১৩	৩৩	৪৯	...
সতাপ ...	১৪
সকল্প .	১৬	৩৭	৫৯	...
হাসি ...	২৯	৪৭	৫৯	...
বৃদ্ধি ...	৩০	৪৭	৫৯	...
পর-লক্ষণ ...	৩২	৪৮	৬১	...

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

অঙ্গ .	২৪	৪১	৫৭	৬৫
অঙ্গ-মর্দ ...	২৭	৪৪
অট্টেত্ত ...	২৮	৪৫		...
অতিসার ..	১৯	৩৭	৫৬	৬৩
অধিক কথা ..	২৫	৪২	৫৭	...
অঙ্গ .	১৮।২৩	৬২
অপস্মার	৩৮
অবশতা ..	২৫	৪২

শীত । উত্তাপ । ঘর্ম্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

অবসন্নতা	.. ২০	.	৫৬	...
অবস্থান-পরিবর্তন	...	৪২
অঙ্গ	৬৮
অঙ্গসত্তা	... ২৪
অশ্রুস্রাব	... ২৩	৪১
অস্থি	... ১৮	৩৬অ।	৫৬	৬১
অস্থিরতা	...	৪৩	৫৮	৬৭
অস্বচ্ছন্দতা	... ২৮
অক্ষি (চক্ষু দ্রষ্টব্য) ।		
আকাজিকা		৪০।৪১।৪২	...	১৪
আক্ষেপ	... ২৭	৩৭
আড়ামোড়া	... ২৭	৪৪
আবৃত থাকার ইচ্ছা	১৯	৪৫	৫৬	৬৩
" " অনিচ্ছা	১৯	৪৫	৫৯	৬৩
আমাশয়	... ২৭	৪৪	...	৬৪।৬৮
আমাশয়-গহ্বর	.	৪৩
আলোক	... ২৪।২৫	৪১।৪২	...	৬৫
আহার	... ২১	৪০	.	৬৪
উগ্রতা	৬৫
উৎকর্ষা	.. ১৮	...	৫৫	৬১
উৎক্ষেপ	... ২৩
উত্তাপ	৬৫
উদর	... ১৮	৩৬অ।	৫৫	৬১
উদরোর্ক	৩৮
উদগার	... ২০	৬৩.

(৩)

শীত । উত্তাপ । ঘর্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গঃ—

উদ্বেদ	৫৬	...
উপদাহিতা	...	২৩
উরু	...	২৭
উষ্ণতা	...	২৯	৪৭	...
একাকী থাকা	৬১
ওষ্ঠ	...	২৪	৪১	...
কটি	...	২৫	৪২	...
কণ্ঠ	...	২০
কণ্ঠ	৪৫	...
কণ্ঠ	...	২৭
কপাল	...	২২	৪০	...
কম্প	...	২৮	৪৩/৪৫	৫১
কর্ণ	...	১৯	৩৮	৫১
কাতরোক্তি	...	২৫	৪২	...
কাস	...	১৯	৩৭	৫১
কুচকি	৪১	...
কুস্তন	...	২৭	...	৫৬
কৃমি	৭৩
কেশ	...	২২
কোষ্ঠবদ্ধ	৩৭	...
ক্রন্দন	৪৭	...
খলী	...	১৯	৩৭	...
গণ্ড	...	১৮	৩৬/৩৭	...
গলা	...	২৮	৪২/৪৪/৪৫	...
গাত্রোচ্ছ্বাস	...	২৩

শীত। উত্তাপ। বর্ষ। বিরাম।

লক্ষণ বা উপসর্গ :-

ঔষধবায়ু	২৩
গ্রহি	৬৪
গ্রীবা	...	৪০
বর্ষ	৪২	৫০	...	৬৮
বর্ষ (নৈশ)	৬৭
স্বর্গ-অনুভব	১৮	৩৬ আ	...	৬২
চক্ষু	২০	৩৮	৫৬	৬৩
চক্ষুরতারা	২৬	৩৮
অভা	২৪।২৫	৪১	৫৭	...
জল-পান	২৮	৩৭	পিপাসাদ্রষ্টব্য	...
জাহ্নু	২৩	৪১
জিহ্বা	৬২
জন্তু	২২	৪৭	৫২	...
টকার	১২	...	৫৬	৬২
টলিয়াচলা	২৭
তজ্রা	...	৪৪	...	৬৮
তামাক	৬২
তালু	...	৪২	...	৭২
ত্বক্	২৬	৪৩	৫৮	৬৭
দন্ত	২৭।২৮	৪৪	৫৮	৬৪
দৃষ্টি	৩৬ আ	৪২	...	৬৬
দুর্কলতা	২২	৪৭	৫৬।৫২	৭৩
দৃষ্টি	১৮।৫৬	৪৩	৫২	৬১
দুত হওয়া	২৩
বথ	২৫	...	৫৭	...

শীত । উত্তাপ । বর্ষ । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

নাড়ী	... ২৫	৪২	৫৭	৬৭
নাসা	... ২০।২৫	৪২
নিজ্রা	... ২৬	৪৩	৫৮	৬৮
নীরকতা	৬১
পতনামুত্তব...	...	৩৯
পদ	... ২০	৩৯	৫৬	৬৪
পদাঙ্গুলী	.. ২৮	...	৫৮	...
পক্ষাঘাত	৪২
পানাস্তে উপসর্গ	১৯	৪৫
পিপাসা	... ২৭	৪৪	৫৮	৬৯
পৃষ্ঠ	... ১৮।২৯	৩৬আ	৫৮	৬৮
পেশী	... ২৫	৪২	...	৬৩
প্রতিজ্ঞায়	... ১৯	৬২
প্রলাপ	... ১৯	৩৭	৫৬	...
প্রীহা	... ২৭	৪৪	...	৬৮
বক্ষঃ	... ১৯	৩৭	৫৬	৬২
বদন (মুখমণ্ডল)	২০	৩৮	৫৬	৬৩
বধিরতা	৩৭
বর্ষন	... ২৯	৪৬	৫৯	৭৩
বাচালতা	অধিক কথা জটব্য ।	
বাত	৬৭
বায়ু	... ১৮	৩৬আ। ৪৪	...	৬১
বাহু	... ১৮	ঐ
বিবমিষা	... ২৫	৪২	৫৭	৬৬
বিরাম, পরিকার	৬২

শীত । উত্তাপ । ঘর্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :-

" পরিকার নহে	৬২
বৃক্ক	.. ২৩
বেদনা	... ২৫	৫৭	৬৭
" উদরে	১৮ ৩৬আ	৫৬	৬১
" কটিতে...	২৫
"গাত্রঅনাবরণে	২৮ ৪২
" ঘাড়ে ...	৪২	.	৬৬
" ত্রিকস্থানে	২৬
" পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠবংশে	২৭ ৪৪	৫৬	...
" পেশীতে	২৫
" পার্শ্বে	৫৮	৬৭
" প্রসববৎ	...	৪১	...
" বৃক্কে . .	২৩
" ভরপ্রাপ্ত অঙ্গে	...	৪২	...
" মস্তকে	২৩	...	৬৫
" মূত্রমার্গে	২৮
" মূত্রাশয়ে	...	৩৬আ	৬১
" জয়াযুতে	..	৪৬	...
" সন্ধিস্থানে	২৩	...	৬৫
" স্বন্ধে ...	২৬	...	৬৭
বাক্যনেচ্ছা	... ৩৯
ভয়	... ৩৯
মণিবদ্ধ	.. ২৯ ৪৪
মল	... ৪৪
মস্তক	... ২২ ৪০	৫৭	৬৪.

শীত । উত্তাপ । ষণ্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

মস্তক ঘূর্ণন .	২৯	৪৬	৫৯	৭৩
মস্তক	৬২
মাথাধরা .	শিরঃপীড়া দ্রষ্টব্য...			...
মাংস	৬৬
মুখ	... ২৫	৪২	৫৭	৬৬
মুখমণ্ডল (বদন)	২০	৩৮	৫৬	৬৩
মূত্র	. ২৮	৪৬	৫৯	৭২
মূর্ছা	২১	৩৯	৫৬	৬৭
মোহ	... ১৯
যকৃৎ	... ২৫	৪২	...	৬৫
রক্তঃ	৬৬
রক্ত	... ১৮	৩৬জা
রোমাঞ্চ	... ১৯/২২
লক্ষণের বৃদ্ধি, বিরতি		..	৫৮	...
লালা	... ২৫/২৬	৪৩	...	৬৭
শব্দ-শ্বেষ	.. ২৫	৪২
শয্যা	৪০	...	৬১
শয়ন	... ২৪	৪১
শরীর	... ২৫/২৭, ২৮	৪২	৫৬	...
শরীর-শাখা	৩৮
শিরা	. ২৯	৪৬	৫৯	৭৩
শিরঃপীড়া . .	মস্তকবেদনা দ্রষ্টব্য
শিরোরুগ্নন...মস্তক ঘূর্ণন দ্রষ্টব্য ।
শীতপিত্ত	... ২৮	৪৬	৫৯	৭৩
শীত	৪৬	৪৯	৬২

(৮)

শীত । উত্তাপ । ঘর্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

শোধ	৬৩
শাস	... ১৮।১৯।২৬	৩৬মা।৪৩	৫৬।৫৮	৬২
শাস-কষ্ট	... ২৬	৩৮	৫৬	৬২
শাস-লীর্ষ	... ১৮	৪৩	৫৮	৬৭
সন্ধি	... ২৩	৬৫
স্বর্ঘ্যোত্তাপ	... ২৭
স্বক	৪৩
স্বায়বীয়তা	... ২৫	৩৮	৫৭	৬৬
স্পর্শ-জ্ঞান	... ২৬
স্বর	... ২৩	৪১।৪৭
স্বাদ	... ২৭	৬৮
স্বরণ	৪৩
হম্	... ২৮
হস্ত	... ২২	৪০	৫৭	...
হস্ত-পদ	... ২০	...	৫৬	...
হস্তাঙ্গুলী	... ২১	৪০	৫৭	...
হাঁচি	... ২৭	৪৪
জ্বপিণ্ড	... ২৩	৪১	৫৭	৬৫
জুধা	... ১৮।২৩	৩৬মা।৪১	৫৫।৫৭	৬১।৬৫
উত্তম	৫৫	৬১



শুদ্ধিপত্র ।

রিপোর্টারি ।				প্রধান প্রধান ঐষধ ।			
পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
৩	১	শীতোৎপত্তি...জরোৎপত্তি ।		১২	১২	কলাসঙ্কর...কালাসঙ্কর	
৪	১১	খেরিড ... খেরিড ।		১৩	৭	আশক্তি ... অশক্তি ।	
১১	২৭	মোনি ... মেনি ।		১৫	১৬	শীতের ... শীতের ।	
১৪	৬	পলিস ... পলিপ ।		৪১	৭	চায়ন ... চায়না ।	
১৬	১৩	বিকশ ... বিকর ।		৫৯	২	ভিয় ... ভিন্ন ।	
২৬	২০	ত্রিকাহনে...ত্রিকাহনে		৬১	৮	মহের ... মহের ।	
২৬	২৫	দৃষ্টি ... দৃষ্টি ।		৬২	২৫	অবিয়ত ... অবিয়ত ।	
২৭	২৩	গুরু ... গুরু ।		৬৪	২৩	অহতা ... তত্রতা ।	
২৮	৭	পিপার ... পিপাসার ।		৬৯	২	বশেষতঃ...বিশেষতঃ ।	
২৮	১৭	অনাবরণ...অনাবরণে ।		৭৫	৫	বিগুক্তিচিত্ত...বিগুক্তিচিত্ত	
২৮	২১	নঙ্গন ... নঙ্গন ।		৮৭	২৬	জেলসিনিয়মেও...জে-	
৩০	১৮	সেপেনা ... সেনেগা ।				লসিনিয়মেও ।	
৪১	১৫	আরোণিয়া...আরোণিয়া		৯০	২৪	রক্ত : ... রক্ত ।	
৫৮	১০	বস্ত ... বস্ত ।		৯১	৯	সত ... সন্তত ।	
৫৮	১০	পিপসা ... পিপাসা ।		৯৫	১৮	করিবা ... করিয়া ।	
৬০	১৪	বুজিয়া ... বুজিয়া ।					

রিপোর্টরিতে ব্যবহৃত ঔষধের নাম ও সংক্ষিপ্ত নাম ।

আইওডিয়াম (আইওড) ।	এম্ব্রা গ্রিসিয়া (এম্ব্রা) ।
আরেগিয়া (আরেগ) ।	এলষ্টোনিয়া (এলষ্টোন) ।
আর্জেন্টম (আর্জ) ।	এলুমিনা (এলু) ।
আণিকা (আণ) ।	এসাফিটিডা (এসাফ) ।
আর্সেনিক (আস) । [পার্প) ।	এসেগম (এসেব) ।
ইউপেটোরিয়ম পার্পিউবিয়ম (ইউপ [প্যাফো) ।	ওপিয়ম (ওপি) ।
ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটম (ইউপ- * ইউওনিয়ম (ইউন) ।	কাকিউলস (কক) ।
ইয়েশিয়া (ইয়ে) ।	ককিয়া (কফ) ।
ইথুসা (ইথু) ।	কর্নু ফ্লারিডা (কর্ণস) ।
ইপিকাকুয়ানহা (ইপিক) ।	কলচিকম (কলচি) ।
* ইউফরবিয়ম (ইউফর) ।	কলোসিসিস (কলোস) ।
ইলাপ্স (ইলাপ্স) ।	কষ্টিকম (কষ্ট) ।
ইলেটেরিয়ম (ইলোট) ।	কাঞ্চালাগুয়া (কাঞ্চা) ।
একোনাইট (একন) ।	কার্বোএনিমালিস (কার্বো-এ) ।
এগেরিকস (এগের) ।	কার্বোভেজিটেবিলিস (কার্বো ভে) ।
এম্বুটারা (এম্বু) ।	কালাড়িয়ম (কালাড়) ।
এন্টিমোনিয়মকুডম (এন্ট-কুড) ।	কালীআইওডেটম (কালীআইওড) ।
এন্টিমোনিয়মটার্টারিকম (এন্ট-টার্ট) ।	কালী-কার্বানিকম (কালী-কার্ব) ।
* এনাকার্ডিয়ম — (এনাক) ।	কালীবাইক্রমিকম (কালীবাই) ।
এপিস মেলফিকা (এপিস) ।	কিউরেয়ার (কিউর) ।
এমোনিয়ম কার্বোনিকম (এম- কার্ব) । [মিউর) ।	কুপ্রম (কুপ) ।
এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম (এম- ক্যালিয়াম (কোন) ।	ক্যাষ্টস (কাষ্ট) ।
	ক্যাঙ্করিস (কাঙ্ক) ।
	ক্যাল্পিকম (কাপ্স) ।

ক্যাম্ফর (ক্যাম্ফ) ।

ক্যামোমিলা (ক্যাম) । [কার্ফ] ।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা (ক্যালক-
ক্রিয়োজোট (ক্রিয়োজ) ।

* ক্রোকস (ক্রোক) ।

চায়না (চায়) ।

চিনিমসলফিউবিকম (চিন-সল) ।

চেলিডোনিয়ম (চেলিড) ।

* গ্রাফাইটিস (গ্রাফ) ।

* গোয়াজেকম (গোয়াজ) ।

জেলসিমিয়ম (জেলস) ।

জিকম (জিক) ।

টারাক্সিকম (টার) ।

ডলকামারা (ডলকা) ।

ডিজিটেলিস (ডিজি) ।

* ড্রিসা (ড্রস) ।

* ডাফনি-ইণ্ড (ডাফ) ।

থুজা (থুজা) ।

* থেরিডিয়ন (থেরিড) ।

নক্সতমিকা (নক্স-ড) ।

নক্সমশ্চেটা (নক্স-ম) ।

* নাইট্রম (নাইট) ।

নাইট্রিক এসিড (নাইট-এসি) ।

* অট্রম কার্বনিকম (অট্র-কার্ফ) ।

অট্রম মিউরিয়েটিকম (অট্র-মিউ) ।

পডফিলম (পড) ।

পলমেটিল (পলস) ।

পলিপোরস (পলিপ) ।

* পারিস কোয়াড্রিকোলিয়া (পারিল) ।

পেট্রোলিয়ম (পেট্র) ।

প্লান্টেগো (প্লান্ট) ।

ফসফরিক এসিড (ফস-এসি) ।

ফসফরাস (ফস) ।

ফিরম (ফির) ।

* বার্কেরিস (বার্ক) ।

* বেঞ্জিনম (বেঞ্জ) ।

বেলেডোনা (বেল) ।

* বোভিষ্টা (বোভ)

ব্যাপ্টিসিয়া (ব্যাপ্ট) ।

ব্রাইওনিয়া (ব্রাই) ।

ভিরেট্রম এলবম (ভিরাট-এ) ।

ভিরেট্রম ভিরিডি (ভিরাট-ভি) ।

ভেলেবিয়ানা (ভেলের) ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বনিকা (ম্যাগ্নি-কার্ফ) ।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা (ম্যাগ্নি-
মিউর) ।

ম্যাগ্নেনম (ম্যাগ্ন) ।

মারকিউরিয়স (মার্ক) ।

মারকিউরিয়ালিস (মারকিউবিয়াল) ।

মিউরিয়েটিক এসিড (মিউর-এসি) ।

* মেজেরিয়ম (মেজ) ।

মেনিয়াসিস (মেনি) ।

* মেবম ভেরম (মেব) ।

* কুটা (কটা) ।

বসটকি কোডেগু ন (বস) ।

* রোবিনিয়া (রোব) ।

* লরোসিরেসস (লরো) ।	সাইমেক্স (সাইন) ।
লাইকোপোডিয়ম (লাইকো) ।	সিড্রা (সিড) ।
* লেডম (লেড) ।	সিনা (সিনা) ।
লেপ্টাণ্ড্রা (লেপ্ট) ।	সিপিগা (সিপি) ।
লোবিলিয়া (লোব) ।	সিলিশিয়া (সিলি) ।
ল্যাকনাসিস (ল্যাকনা) ।	* সোরিনম (সোর) ।
ল্যাকেসিস (ল্যাক) ।	স্রাবাডিল (স্রাবাড) ।
* ষ্টানম (ষ্টান) ।	* স্রাবিনা (স্রাবিন) ।
ষ্টাক্সেসিগ্রিয়া (ষ্টাক্স) ।	স্রামুকস (স্রামু) ।
ষ্ট্র্যামোনিয়ম (ষ্ট্র্যাম) ।	* স্পাইজিলিয়া (স্পিঞ্জ) ।
সলফার (সলফ) ।	হাইওসায়েনাস (হাইওস) ।
সাইকিউটা (সিক) ।	হিপারসলফার (হিপার) ।
সাইক্লোমেন (সাইক্লো) ।	* হেলিবোরস (হেলিবোর) ।

এই সকল ঔষধের শক্তি বা ক্রম সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ মৎকৃত ভৈষজ্য-তত্ত্বের “মাত্রা ও ক্রম” বিচারে দ্রষ্টব্য। *ষ্টার (তার) চিহ্নিত ঔষধগুলি জরে কচিৎ ব্যবহৃত হয়। এজন্ত উহাদের বিস্তারিত লক্ষণাদি এই পুস্তকে সম্মিলিত হয় নাই। রিপোর্টারিও নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

সবিরাম জ্বরের রিপোর্টারি

অর্থাৎ

ব্যবস্থা-কোষ ।

শীতের অভিধান ।

* এনাক, * এপিস, * আস, * ক্যাধ, কষ্ট, ক্যাম, সিনা, কফি, ইউপ-পার্কো, ফির, * জেলস, হিপ, ইপি, কালী-বা, কালী-কা, ল্যাক-না, লাইক, জাট-গি, নক্স, পেট্রো, বস, ষ্ট্রাস, সলফ, * থুজা ।

শীত ।

একন, ইথ, * এগাব, * এলস, এল্টন, এদ্রা, এম-কা, এম-মি, * এনাক, এঙ্গ, * * এণ্ট, * এণ্ট-টোট, এপিস, * * হান ডা, আর্জ, * * আণ, * আস, এসাফ, এসাব, ব্যাপ্ট, ব্যাবা-কা, বেল, বেঞ্জ, বার্ক, বোভ, ব্রাই, ক্যাষ্ট, কালাদ, ক্যাক, * * ক্যাম্ফ, ক্যাক, * * ক্যান্স, * ক্যাপ্স, কার্বো-এ, * কার্ব-ভে, কষ্ট, * সিড, * ক্যাম, চোনিড, * * চাবনা, * * চিনি-সলফ, সিক, *সিমি, *সিনা, কক, কফ, কলচ বটাস, কোন, করণ, ক্রিয়োজ, ক্রোক, কুপ, কার, সাইক্রে, ডাক, * ডিজি, ড্রন, ডক্স, ইলাট, * ইলাঙ্গ, * ইউপ-পার্কো, *ইউপ-পাপু, ইউকব, ইভন, কিব, গ্যাম্ব, * জেলস, গ্রাক, গোয়াজ, গম-গট, হেল, *হিপাব, হাইরস, *ইথ, আইওড, *ইপি, কালী-বা কালী-কা, * কালী-আইওড, * ল্যাক, ল্যাকনা, লব, * লেড, লোব, * লাইক, ম্যাক্স, মার, *মেনি, ম্যাক্স-কা ম্যাক্স-মি, ম্যাক্স-স, মাবকিউরিয়াল, মার্ক, মার্ক-করো, *মেজ, মিউর-এসি, *নাইট-এসি, * *জাট্টি মি, নাট্টি-কা, *নক্স-ম, *নক্সভ, * * ওপি, পার, পেট্র, ফস-এসি, * ফস, প্লাট, * পড, পলিপ, সোর, * পলস, * * বোব, * * বস, কটা, * * শ্রাবড, শ্রাবি, শ্রাব, শ্রাবা শ্রাস, * * সিকেল, * সিপি, * সিগি, স্পিজি, ষ্টান, * ষ্টাক, * ষ্ট্রাম, * সলফ, * * টার, থেরিড, * * থুজা, ভেভেব, * * ভিরাট ।

ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

গর্ভপাতের আশঙ্কা,—পলস।

অতিসার উৎপাদক উৎকণ্ঠা,—
জেলস।

আর্সেনিক অপব্যবহারের পর,—
ইপিক।

বাততপের পরিবর্তন জনিত,—
* একন।

পুরাতন রোগী,—এপিস, কষ্ট, জেলস,
ছাট-মি।

তরুণ রোগী,—একন, ছাট-মি।

বালক,—* আস', * ক্যাম, * সিনা,
* জেলস, * নক্স-ম, পলস।

স্তন্যপায়ী শিশু,—এনাক, আস',
সিনা, ভিরাট।

ওলাউঠার প্রাচুর্যবাকালে,—
ভিবাট।

সহজে সর্দি লাগে,—* ব্যারা-কা,
কষ্ট, * ডলক, সোব।

কচ্ছু-ধাতু,—* ব্যাবাই-কা, * ক্যাক,
সিনা, * সোর।

ক্লিমিকপ্রদাহের পর,—* ব্যারা-কা,
উদ্বেদের পর,—এপিস।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও নোলিত ত্বক,
—* ক্যাক।

জ্বর, স্বপ্নবিরাম প্রবণতা,—গম-গট
জেলস, ফস, রস।

জ্বর, আরজ জ্বরের পর,—* ব্যারা-কা

জ্বর, সন্নিপাতে পরিণত হইবার
সম্ভাবনা,—* ব্যান্ট, * মেজ,
ফস * রস, * সিকেল।

অতিসার উৎপাদক ভয়,—* জেলস।

নূতন কষিত ভূমির প্রভাব জনিত,
—* ছাট-মি।

পুষ্টিদেহ,—একন।

ক্ষীণদেহ,—এলম।

কোপণতা,—* এছাক, * ইগ্রে, * নক্স।

পারদ অপব্যবহারের পর,—
নাইট-এসি।

বৃদ্ধবৃদ্ধি,—এলম।

কুইনাইন অপব্যবহারের পর,—
* আস', অর্গ, * বেল, ক্যাক,
ক্যাপ, কার্কো-ভে, সিনা, * ফির,
ইগ্রে, * ইপিক, ল্যাক, মার্ক, *
ছাট-মি, নক্স, থলস, শ্রাক,
সলফ, ভিরাট।

গণ্ডমালা,—* ব্যারা-কা, * ক্যাক, *
সিনা।

সমুদ্রকূলে উৎপন্ন,—* আস'।

জ্বকুমার ত্বক,—ডলক।

অনুপস্থানের নিকট বাস,—* সিড,
ছাট-মি।

শীতপিত্ত—ডলক, ইলাট, রস।

ছপশব্দকাসের প্রাদুর্ভাব কালে

—* ড্রস।

জীলোক,—নক্স-ম, *পলস, *সিপি।

জীলোক,রজ্জোবৈলক্ষণ্য,—সিপি।

জীলোক, জরানুরোগ,—সিপি।

ঋতু ও কাল।

শরৎকালে,—আর্স, নক্স।

আর্স ও শীতলকালে,—ক্যাক্স, কা.

কোঁ-ভে, চাঘনা, কাব, ল্যাক,

নক্স-ম,পলস, রস, সল্ফ,ভিবাট।

উত্তপ্ত দিন ও শীতল রাত্রিকালে,

—একন।

বর্ষাকালে,—* আরেণ-ডায়া, সিড,

কাব, ডলক, ফিব, দিক্স।

বসন্তকালে,—আর্স, জেলস, ল্যাক।

গ্রীষ্মকালে,—ক্যাপ্‌স, সিড।

উষ্ণকালে,—এণ্ট, * আর্স, বেল,

ব্রাই, ক্যাক্স, ক্যাপ্স, কার্কো,

সিড, *সিনা, * ইপি, * ল্যাক,

জাট-মি, পল্‌স, * সল্‌ফ, থুজা,

ভিরাট।

আর্দ্র হইবার সময়,—সিপি।

শীতঋতুর অবসানে,—আর্স, ল্যাক,

জাট-মি।

শীতোৎপত্তির কারণ।

ক্রোধ—* ব্রাই, * নক্স।

উৎকর্ষা—জেলস্‌।

উত্তপ্তদিবস ও শীতলরাত্রি,—

* একন। [পলস্‌।

আহারের অনিয়ম,—* ইপিক্স, *

অপস্মারের আক্রমণ,—কুপ্রম।

ব্যায়াম,—আর্স, মার্ক, নক্স, মিলি,

সল্‌ফ।

শীতোত্তাপাদিভোগ,—একন, ব্রাই,

ক্যাক্স, ডলক, রস।

ভয়,—একন, জেলস।

প্রমেহের অবস্থিতি,—থুজা।

শোক,—* জেলস্‌।

নবকর্ষিতভূমির প্রভাব,—*জাট-মি

অনূপপ্রদেশের প্রভাব,—সিড।

ঘর্ম্মরোধ,—একন।

বিশ্রামকাল,—জ্র।

গ্রহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি,—আর্স

গ্রহের উষ্ণতা,—ডলক, ক্রটা।

সমুদ্রকূলে গমন,—*আর্স্‌।

সূর্য্যোত্তাপভোগ,—ক্যাট্‌।

অনূপস্থানে গমন,—জাট-মি।

উপদংশের বিদ্যমানতা,—থুজা।

অন্যের স্পর্শ,—স্পিজি।

উষ্ণদেশে বাস,—*সিড।

বিচরণ,—জ্বাট স।

আর্দ্র হওয়া,—একন, আবেগিনা,
বাবা-কা, ব্রাই, কাক, ডগক,
* রস, সিপি।

শীতের পূর্বে,—

শৃষ্ঠে বেদনা,—কার্কো-ভে, ইপিক,
** পডো, বস।

অস্থিতে বেদনা,—চায়না, * ইউপ-
পার্কো, ইউপ-পার্লু, জাট-মি,
থোবিড। [পার্কো।

অঙ্গে বেদনা,—আর্স, ইলাট, ইউপ-
বক্ষে বেদনা,—আর্স, প্লাট মেজ।

শীত শীত অনুভব,—ইলাট, থুজা।

উদর বেদনা,—চায়না।

কাস,—এপিস, * বস, কমেয়া, * জ্যাম্ব।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা,—ইউপ-
পার্কো।

দুর্বলতা,—আর্স, চায়না, কবণ-ফ।

অতিসার,—আর্স, পলম।

শীতেব কিছুকাল পূর্বে জলপানেব
ইচ্ছা—ক্যাম্প, * ইউপ-পার্কো।

জলপানান্তে বমন,—* ইউপ-পার্কো।

জ্বরেজ্ঞান,—সিড।

চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল,—
* সিনা।

চক্ষে জ্বালা,—বসটজ। [পার্কো।

চক্ষু-গোলকে স্পর্শ ঘেষ,—ইউপ-
মুখমণ্ডলে উত্তাপ,—ট্রামো।

মুখমণ্ডলে পাণ্ডুরতা,—* আর্স, সিনা
জ্বব,—সিড, লাইক, * নজ।

আবশ্যিক উপদ্রব,—এণ্ট।

শিবঃপোড়া,— আর্স, * ব্রাই, কার্কো-
ভে, সিড, চায়না, করণ, ইলাট,
ইপিক, * জাট-মি, প্লাট-মে, বস,
থুজা।

মস্তকে উত্তাপ,—ট্রামো।

মস্তকে গুরুত্ব,—ক্যাক।

উত্তাপ,—সিড, লাইক, * নজ।

উত্তাপাবেশ,—লাইকো।

হৃদবক্ষ,—চায়না। [ষ্টাক।

ক্ষুধা,—চায়না, সিনা, * ইউপ-পার্কো।

সন্ধিতে আকৃষ্টতা,—ক্যাক।

আলস্য,—জাট-মি।

অঙ্গে আকৃষ্টতা,—আর্স, ব্রাই, * নজ।

অঙ্গে উর্দ্ধে আকৃষ্টতা,—আর্স।

অঙ্গে গুরুত্ব,—(নিম্নাঙ্গে),—সিমি।

অঙ্গে বেদনা,—কার্কো-ভে, ইলাট,

ইউপ-পার্কো, ছাট-মি, *নক্স, রস ।

অঙ্গে দুর্বলতা,—নক্স ।

বিষাদ,— ** এন্ট, সিড ।

শ্লেষাবমন,—* পলস ।

বিবমিষা,—আর্ণ, চায়না, সিনা, *ই-

উপ-পার্কো, +ইপি, লাইকো, ছাট-

মি, পলস, শাঙ্ক ।

অস্থিবেষ্টে বেদনা,—* আণ ।

পাটলিকা,—আর্ণ (?) ।

লালাস্রাব,—ইপিক, রস ।

কম্প,—ইগ্রে, ল্যাক । [সিড ।

নিদ্রালুতা,—আর্স, কবণ, পলস, থে-

নিদ্রালুতা, জ্বরাবেশেব পূর্বরাত্রিতে

—* আর্স ।

নিদ্রাহীনতা—এনা-য় ।

জ্বরাবেশেব পূর্বরাত্রিতে অস্থি

নিদ্রা,—আর্ণ, * চায়না ।

ঠাঁচি,—চায়না ।

অঙ্গমর্দ (আড়ামোড়াভাঙ্গা)

—এন্ট-টার্ট, আর্ণ, *আর্স, ব্রাই

* ইউপ-পার্কো, ইগ্রে, ইপিক, *

ছাট-মি, *নক্স, স্ট্রাণ্ট-নেজ, রস ।

ঘর্ম্ম,—করণ, * নক্স, শাঙ্ক, ভিবাট ।

ঘর্ম্ম, পরিশ্রমাস্তে,—করণ ।

উরুতেবেদনা,—নক্স ।

শিপিমা,—এলঠন, এম-মি, এক, *

*আর্ণ, বোবাক্স, *ব্রাই, *ক্যাপস,

** চায়না, সিনি, *ইউপ-পার্কো,

ল্যাক, লোন, ছাট-মি, নক্স, পলস,

শাঙ্ক, *সলফ ।

দন্ত-বেদনা,—কার্কো-তে ।

শিবোঘূর্ণন,—আর্স, ব্রাই, ছাট-মি ।

বমন,—সিনা, * ইউপ পার্কো, ফির,

লাইকো, ছাট-মি, পলস, সিকেল ।

বমন, পিত্ত,—সিনা, ইউপ-পার্কো ।

বমন, ভুক্তদ্রব্য,—সিনা, ইউপ-পা-

র্কো, ফিব ।

বমন, শ্লেষ্মা,—* পলস ।

বমন, জল,—* ছাট-মি ।

দুর্বলতা,—আর্স, ছাট মি, থুজা ।

জ্বন্তু,—এন্ট-টার্ট, আর্ণ, * আর্স,

ইলাট, * ইউপ-পার্কো, ইগ্রে,

ইপিক, * ছাট-মি, নিক, *

নক্স, রস ।

শ্রীত প্রকাশের সময় ।

অপরাজে,—এলন এনাক, এন্ট, আর্জ,

* আর্ণ, * আর্স, ব্যারা-কা, *

বোবাক্স, ব্রাই, চেলিড, চায়না,

সিক, কক, ক্রোক, ডিজি,

* ইউপ পার্কো, জেলস, কালী-

বা, ল্যাক, লাইকো, নাবকি-

উনিয়াল, নাইটাব, নাইট এসি,
* নক্স, পেট্রো, ফস-এসি, ফস,
পলস, বাথ-ব, রোব, সিলি,
সলফ, থুজা ।

শয়নকালে,—অলম, এম-কা, আর্স,
অর, বোরাক্স, বোভ, ব্রাই, কার্কো-
এন, ক্যাক, চায়না, ড্রস, ফির,
হিপ, লরো, মার্ক, নক্স, * ফস,
রোড, টার্ট-এসি ।

সমস্ত দিবস,—এলম, ** সিলি ।

নিবসের বে কোন সময়,—* আর্স,
ক্যাক, কালী কা, প্লাস্ট-মেজ, সাস ।

সায়াক্সে,—একন, এগার, * এলম,
এম-কা, * এম-মি, আরেগ-ডা,
* আর্গ, আর্স, অর, বেল, ব্রাই,
* বোভ, * ক্যালাড, ক্যাক,
কার্কো এ, কার্কো ভে, ক্যাম,
চেলিড, চায়না, * সিনা, কক,
সাইক্সে, ডলক, ভিব, জেলস,
গ্রাক, গোয়াজ, গম-গট, হিপার, *
ইয়ে, কালী-বা, * কালী-কা, * ল্যাক,
ল্যাকনা, * লাইকো, ম্যাক্স, মার্ক,
ম্যাগ-কা, ম্যাগ-মি, ম্যাগ-স, নেজ,
আট-নি, আট-স, * নাইট-এসি,
নক্স, * পেট্রো, ফেল, * ফস, ফস
-এসি, প্লাট, পড, সোর, * পলস,
রটি, * রস, আধু, সারা, *
সিপি, সিলি, ষ্টান, ষ্টাক, ট্রল,

* সলক, ট্যাবাক, টার্ট-এসি,
টিউক্সি, টিলিয়া ।

পূর্বরাহ্নে,—এম্বা, এঙ্গ, * আর্স, ক্যাক,
কোন, কোশ, ইউক. গোবাক্স,
লেড, ** আট-মি, ** নক্স, সিলি,
ষ্টাগ, ট্রল ।

চতুর্দশদিন অস্তুর,—আর্স * ক্যাক,
চায়না, পলস ।

অনিয়মিত,—ইয়ে, মেনি, সিপি ।

—, দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে,—
সিপি ।

মধ্য রাত্রির পর,—থুজা ।

প্রাতঃকালে,—এঙ্গ, * এগিস, * আর্গ,
* ব্রাই, ক্যাক, কোন, সাইক্সে, *
ড্রস, * * ইউগ-পার্কো, * ফির,
ফেলস, গ্রাক, * হিপার, কালী-কা,
লেড, * লাইকো, নার্ক, আট-মি,
আট-স, * নক্স, ফস, ফাইটো, *
গড, ** সিপি, সিলি, স্পিজি,
থোবিড, থুজা । [লাইকো ।

প্রাতে-শয্যায় — * আর্গ, গ্রাক,
রাত্রিতে,—এলম, এম্বা, * এগিস.

আর্জ, বেল, বোভ, কার্কো-এ,
কার্কো-ভে, কষ্ট ফির, গম-গট,
হিপার, আইরিস, * কালী-আই-
ওড, ম্যাগ-স, * মার্ক, মিউর-এসি,
* নক্স, ওপি, * ফস, সিলি, ষ্টাক,
সলফ. টার্ট-এসি. থুজা ।

রাত্রে কখনও নয়,—* চায়না ।

সকল সময়েই,—*এন্ট-টার্ট,*আর্স,

ব্রাই, চেলিড, চায়না,সিমি,ডিজি,
হাইওন, ইয়ে, মার্ক, সিকেল,
ট্রাম, সলফ ।

প্রতিদিন একই সময়ে,—এন্ট,

এপিস, * আবেণ-ডা, বোভ, *
ক্যাষ্ট, * * সিড, চায়না, *সিনা,
কোন, * জেলস, গ্রাফ, হেল,
হিপ,কালী-কা,লাইকো, ম্যাগ-মি,
ফস, জাবাড, স্পিজি, ট্যাণ,
টোক, থুজা ।

একদিন অন্তর একদিন একই
সময়ে,—আরেন-ডা ।

নিম্নান্তে,—* আর্গ ।

সূর্যাস্তকালে,—ইয়ে ।

প্রতিবৎসর,—* আস, কার্কো-ভে,
* ল্যাক, সলফ, থুজা ।

পূর্বাহ্ন ১টার সময়,—আর্স, ক্যাঙ্ক,
পলস, সিলি ।

পূর্বাহ্ন ২টার সময়,—* আস,
ক্যাঙ্ক, হিপ, সিডি ।

পূর্বাহ্ন ৩টার সময়,—এন-মি,
ক্যাঙ্ক, * সিড, লেড, জাট-মি,
সিলি, থুজা ।

পূ-৪টার সময়,—একন,এম মি,আণ,
কোন, জাট-মি, সিলি ।

পূ-৫টার সময়,—চায়না, কোন, ড্রস
জাট মি. পলিপ সিলি ।

পূ ৬টার সময়,—* আর্গ, বোভ,ড্রন,
গ্রাক, * হিপ, জাট-মি, নক্স,
সিলি, ট্রাম, * * ভিবাট ।

পূর্বাহ্ন ৭টার সময়,—বোভ, ট্রস,
*ইউপ-পার্কো, ফিব গ্রা ফ, *হিপ,
জাট মি, নক্স-ম, নক্স, * * পডো,
সিলি, ট্রাম ।

পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত
একদিন,১২টার সময় পরদিন
—* ইউপ-পার্কো ।

পূর্বাহ্ন ৮টার সময়,—বোভ, কক,
ড্রস, * ইউপ-পার্কো, লাইকো,
মেজ, জাট মি, পলস, সলফ ।

পূর্বাহ্ন ৯টার সময়,—এলটন, *
ইউপ-পার্কো, ইপিকা, কালি-কা,
ম্যাগ-কা, মেজ, জাট-মি, ফস-
এসি, সিপি, টাক, সলফ ।

পূর্বাহ্ন, ১০টার সময়,—এলটন,
আর্স, ক্যাঙ্ক, কার্কো-ভে, চি-
নিন-সলফ, ইউপ পার্কো, লেড,
* * জাট-মি, পেটো, ফস-এসি,
পলিপ, রস, জাক, সিপি, সিলি,
টান,সলফ, থুজা । [ক্যাঙ্ক ।

পূর্বাহ্ন ১০০টার সময়,—মোব,
পূর্বাহ্ন ১১টার সময়,—* ক্যাঙ্ক

কার্কোভে, কাম, চিন সলফ, হাইওস, ইপিকা, লোব, ** ত্রাট-মি, ** নক্স, ওপি, পলিপ, পলস, * সিপি, সিলি, সলফ ।

পূর্বাহ্ন ১১টার সময় একদিন অ-পরাহ্ন ৪টার সময় পরদিন.
—ক্যাক ।

পূর্বাহ্ন ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত.—কালী-কা, কোবা-ট ।

পূর্বাহ্ন ১২টার সময়.—এন্ট, ই-নাট, ইউপ-পার্কো কিব, কাক, মার্ক-সল, নক্স, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ১টার সময়.—* আর্স, ক্যাক, ক্যাক, সিনা, টলাট, লাক, মার্ক-সল, নক্স-ম, কস, পলিপ, পলস, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত.
—আর্স, ইউপ-পার্কো, ত্রাট-মি ।

অপরাহ্ন ২টার সময়.—* আর্স, * ক্যাক, ক্যাক, সিক. ক র, * ইউপ-পার্কো, জেনস, প্লান্ট মেজ, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ৩টার সময়.—* * এজ, * এন্ট টাট, * এপিস, আর্স এগাক, ক্যাক, ** সিড, * চিন সলফ, সিক, কক, কোন, কার, ফির, লাইকো, পেট্রো, পলিপ, আবাড, আব, সিলি, টা, থুজা ।

অপরাহ্ন ৪টার সময়.—এনাক, * এপিস, আর্স, এগাক, বোভ, ক্যাক, কক, * সিড, ক্যাম, কোন, গম-গট, জেনস, গ্রাক, হেল, হিপ, হাপকা, কালী-আইওড, লাইকো, নাগ-মি, ত্রাট মি, * নক্স, পেট্রো, কস এগি, পলিপ, ** পলস, আব, সিপি, সিলি ।

অপরাহ্ন ৫টার সময়.—এনাক, এন-মি এপিস, আর্স, বোভ, ক্যাক, ক্যাক, কার্কো-এন, * সিড, চাফনা, কোন, গম-গট, জেনস, গ্রাক, হেল, হিপ, * কালী-কা, কালী-আইওড, নাগ-কা, ত্রাট-মি, নক্স-ম, * নক্স, রস, আবাড আব, সাবাসি, সিপি, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত.—* কালি কা, কস, সলফ ।

অপরাহ্ন ৬টার সময়.—এন-মি, এন্ট টাট, আর্জ-না, আর্স, বেল, বোভ, ক্যাক, ক্যাক, কার্কো এ * সিড, গ্রাক, গম-গট, হেল হিপ, * কালী-কা, কালী-আইওড, লাইকো, নাগ-মি, ত্রাট মি, * নক্স, নক্স-ম, * পেট্রো, ক এগি, কস বস, আব, সিপি, * সিলি, সলফ, থুজা ।

অপরাহ্ন ৭টার সময়.—এনাক.

গি, আর্স, *বোভ, ক্যাক, ক্যাহ,
কার্কো-এন, *সিড, গ্রাক, *গম-
গট, হেল, হিগ, কালী-আইওড,
লাইকো, মাগ-কা, মাগ-মি,
জাট-মি, নল্ল, পেটু, কস-এসি,
কস, **রস, মিলি, সলফ, থুজা ।

অপরাহ্ন ৮টার সময়, —এলম, আর্স,
বাবা-কা, * বোভ, ক্যাহ, কা
র্কো-এন, কক, ইলাপ, গ্রাক,
গম-গট, হেল, হিগ, কালী-আই-
ওড, মাগ-কা, মাগ-মি, নল্ল,
কস-এসি, রস, মিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ৯টার সময়, —আর্স, *বো-
ভ, ক্যাহ, কার্কো-এন, গম-গট,
জেলস, মাগ-কা, মারকিউরি
বাগ, নল্ল-ভ, নল্ল-ম, কস-এসি,
রস, মিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ১০টার সময়, —আর্স, *বো-
ভ, ক্যাহ, কার্কো-এন, চিনি-
সলফ, ইলাপ, কালী-আইওড,
মাগ-কা, পেটো, কস-এসি,
জাবাড ।

অপরাহ্ন ১০টার সময়, —আর্স, *
ক্যাক, ক্যাহ, কার্কো-এ, সলফ ।
অপরাহ্ন ১২টার সময়, —আর্স,
ক্যাহ, কট্ট ।

শীতের আরম্ভ ।

উদরে, —*এগিস, কার, *ইথে, ভিরাট
জামু ও গুলফের মধ্যস্থানে, —*
চারনা, ল্যাক, পলস ।

বাম বাহুতে, —নল্ল-ম ।

দক্ষিণ বাহুতে, —*মারকিউরিয়াল ।

দক্ষিণ বাহুতে ও বুকের দক্ষিণ
পার্শ্বে, —* মারকিউরিয়াল ।

বাহু দিয়ে, —* বেল, ডিঞ্জ, হেল, *
ইথে, মেজ, প্লাট । [সোয় ।

বাহুব উর্দ্ধভাগে ও উরুদেশে, —
— — — — — ও তথা হইতে

বুকে পিঠেসম্প্রসারণ, —*ইথে
পৃষ্ঠে : —আর্জ-মে, ব্যাপ্ট, বোভ,

ক্যাক, ক্যাহ, * * ক্যাপ্স, ডলক,
* ইউপ-পার্ফো, * ইউপ-পার্প,

জেলস, * গম-গট, কালী-আইওড,
* ল্যাক, পেড, * লাইকো, জাট-
মি, * * পলিগ, মারাস, মিলি, স্পঞ্জ ।

পৃষ্ঠে, কটিদেশে : —* ইউপ-পার্প,
জেলস, ল্যাক, জাট-মি ।

পৃষ্ঠে, কক্ষাহির মধ্যবর্তী প্রদেশে :
—* ক্যাপ্স, পেড, * * পলিগ,
মারাস, * মিলি ।

বক্ষঃস্থলে : —* এগিস, আর্স, *
কার্কো-এ, সিক, সিনা, মারকি-
উরিয়াল, নল্ল, * মিলি, স্পঞ্জ ।

বক্ষঃস্থলে, দক্ষিণ পাথে :— *

মারকিউরিয়াল ।

মুখমণ্ডলে :— ব্যাঃ-কা, বাক্স, * কষ্ট,

ক্রিয়োজ, পেট্রো ।

পদে :— এপিস, আর্গ, * চেলিড,

সিমি, জেলস, * হাইওস, কালী-

বা, ম্যাগ-কা, ** ছাট-মি, নক্স-ম,

* নক্স-ভ, স্ত্রাবাড, * সিপি, সলফ ।

পদতলে :— ডিজি ।

হস্তাঙ্গুলীতে :— * ব্রাই, ডিজি, মেনি,

• ছাট মি, * সিপি, সলফ ।

হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগে :— * ব্রাই ।

হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীতে :— * ব্রাই,

ডিজি, মেনি, ছাট-মি, * সিপি,

ষ্টান, সলফ । [স্ত্রাবিন ।

দক্ষিণ পদে :— চেলিড, লাইকো,

হস্তে :— * চেলিড, ডিজি, ইউপ-পার্কো,

জেলস, * নক্স, স্ত্রাবাড, সলফ ।

বামহস্তে :— * কার্কোভে, নক্স-ম ।

হস্তের তালুতে— ডিজি ।

হস্তে ও পদে :— এপিস, ব্রাই,

কার্কোভে, চেলিড, ডিজি, জেলস,

* ছাট-মি, নক্স-ম, ওপি, স্ত্রাবি,

স্ত্রাবু, সলফ ।

মস্তকে :— ব্যাঃ-কা, ছাট-মি, ষ্টান ।

জ্ঞানুতে :— এপিস ।

জজ্ঞায় :— চায়না, কালী-বা ।

মিন্‌জাজে — * নক্স-ম ।

ওঠে :— * ব্রাই ।

ঘাড় :— ষ্টাফ, ভেলেন ।

নাসিকায় :— সল্‌ফ, ট্যারোজ ।

আমাশয়-গহ্বরে :— * বেল, ক্যাফ ।

উরুতে :— * থুজা, থেরিড ।

পদাঙ্গুলীতে :— * ব্রাই, * ছাট-মি *

সিপি, সল্‌ফ ।

পদাঙ্গুলীর প্রান্তভাগে :— ব্রাই ।

— • —

শীতের অবস্থান ।

উদরে :— * ইথ, * এপিস, ক্যালাড,

ক্যান, চেলিড, কার, * ইথে, *

মেনি, * মারকিউরিয়াল, * মার্ক,

মেজ, * ওপি, পার, * ফস-এসি, *

পলস, সল্‌ফ, ভিরাট ।

উদর হইতে পদ ও হস্তাঙ্গুলী

পর্য্যন্ত :— ক্যালাড ।

বাহুদ্বয়ে :— * বেল, ক্যাফ, ক্যাম,

সিক, ডিজি, হেল, ইথে, কালী-

বা, * মেজ, ওপি, * পলস, * সিলি,

সল্‌ফ, ভিরাট । (* রস ।

বাহুতে, বাম :— * কার্কোভে, * নক্স-ম,

বাহুতে, দক্ষিণ :— মারকিউরিয়াল ।

উপরে উত্থান :— * একন, এম-মি,

বেনজিন, কষ্ট, সিনা, ককি, ইউপ ।

পার্কো, জেলস, *হাইওস, কালী-
বা, *স্তাবাড, *সলফ ।

উপরে উত্থান, পদ হইতে বন্ধ:
পর্য্যন্ত :—একন, বেনজিন ।

উপরে উত্থান, পদ হইতে গ্রীবা
পর্য্যন্ত :—কফি, বেনজিন ।

উপরে উত্থান, উর্দ্ধদেহ হইতে মস্তক
পর্য্যন্ত :—সিনা ।

পৃষ্ঠে :—এগার, এলম, এস, এপিস,

আর্স, বেল, বোড, * ক্যাষ্ট,
ক্যান্ড, ক্যাঞ্চ, * ক্যাথ, ক্যাপ্স,
কার্কো-এন, সিড, কামো, চেলিড,
কক, ককু কোন, ক্রোক, ডক,
ইউপ-পার্কো, *ইউপ-পার্প, জেলস,
হাইওস, ইথে, ইপিক, কালী-
বা, কালী-আইওড, *ল্যাক, *লেড
লোব, * লাইকো, মাগ-কা, *
মেনি, *নক্স, *আট-মি, ওপ, ফস,
*পলিপ, *পলস, স্তাবাড, স্তাবা,
সিপি, ষ্টাক, *ষ্ট্রামো, * * সলফ,
ভেলের, তিবাট ।

পৃষ্ঠে, যেন জলনীচে নামিতেছে—
এগার ।

পৃষ্ঠে, কক্ষান্তির মধ্যবর্তী প্রদেশে :—
*ক্যাপ্স, *পলিপ, স্তাবা, সিপি ।

পৃষ্ঠে, নিম্নদেশে :—লেড ।

পৃষ্ঠে, নীচে অবনমন :—এগার, এপিস,

বেল, ক্যাঞ্চ, *ক্যাথ, কার্কো-এ
চেলিড, কক, ক্রোক, ইউপ
পার্কো, ইপিক, ফস, লোব, ষ্টাক,
* ষ্ট্রামো, ভেলার ।

পৃষ্ঠে, আমাশয় গহ্বর পর্য্যন্ত অব
নমন :—বেল ।

পৃষ্ঠে, উর্দ্ধে গমন :—এম-মি, আর্স, ই-
উপ-পার্কো, *জেল, *হাইওস, ইপিক
কালী-বা, কালী-আইওড, ল্যাক,
মাগ-কা, পলস, স্তাবাড, সলফ ।

সমস্ত শরীরে :—এলম, এনাক, এণ্ট-
টার্ট, আর্গ, আর্স, *ক্যান্ড, ক্যাথ,
কার্কো-এ, * কার্কো-ভে, সিড,
চেলিড, * * চায়না, চিনি-সলফ
সিক, সিম, কক, কোন, কিউর,
ডিজি, ডলক, ইউপ-পার্কো, ফির,
গ্যাথ, জেলস, গ্রাক, হিপ, হাই-
ওস, *ইথে, কালী-আইওড, ল্যাক,
লাইকো, মেনি, *নারকিউরিয়াল,
মার্ক, মেজ, *নক্স-ম, * * নক্সভ, *
ওপ, *পেট্রো, ফস-এসি, পলস, *
রস, সিকেল, * সিপি, * ষ্টাক, *
ষ্ট্রামো, *ভিরাট ।

মুখমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয় ব্যতীত
শরীরে :—এম ।

শরীরের সম্মুখভাগে :—*ক্যাথ ।

পশ্চাৎভাগে :—ইথে ।

উর্দ্ধাংশে :—* মোনি, ফস, রস ।

বক্ষস্থলে:—* এপিস, কার্কোএ, নিক,

সিনা, ইথে, * মাঝকিউরিয়াল,
পার, সিলি, * সলফ।

অবনমন:—এগাব, ব্যাবা-কা, কষ্ট,

নিক, * ফস, ** ভিরাট।

অবনমন মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী
পর্যন্ত—ভিবাট।

উদরোর্ত্তে:—আর্গ, ব্যাবা-কা, বেল।

শাখা হইতে মুখমণ্ডল ও মস্তকে—
একন, * জেলস।

মুখমণ্ডলে:—ব্যাবা-কা, বার্ক, কষ্ট,
ক্রিয়াজ, পেট্রো।

মুখমণ্ডলের বানপার্শ্বে, মধ্যরাত্রির
পর:—ড্রস।

পদে:—এলস, চেলিড, হাইওস, ইথে,
* নেজ, * ওপি, * সিলি, * সিলি।

পদতলে:—ভিবি।

জননেশ্রিয়ের বরফবৎ শীতলতা:—
* * সলফ।

হস্তে:—* ক্যাষ্ট, চেগিড, * নেনি,
* নার্ক, * ওপি (শীতাবস্থার
লক্ষণ প্রদর্শ্য)।

হস্তপদ শীতল, শরীরের অবশি-
ষ্টাংশ উষ্ণ:—* নেনি।

মস্তকের পশ্চাৎপ্রদেশে:—ডলক,
ষ্টাফ। [ভিরাট।

মস্তক হইতে শাখা পর্য্যন্ত:—

বক্ষস্থলে:—* মেজ।

দক্ষিণবক্ষস্থলে:—* মারকিউরিয়াল।

দক্ষিণ জাম্বু, বরফের ন্যায়
শীতলতা:—চেগিড।

জাম্বুদ্বয়ে:—* এপিস, * কার্কো-
ভে, ইথে, * ফস, * সিলি।

জজ্বায়ে:—কষ্ট, নিক, কক, কফ,
ইথে, * মেনি, * নক্স, * ওপি,
পাব, পলস, * রস, সিকেল,
সিলি, * ট্রানো, সলফ।

বামজজ্বায়:—* কার্কো-ভে।

দক্ষিণ জজ্বাব বরফের ন্যায়
শীতলতা:—চেগিড, * স্তাবিন।

জজ্বা হইতে পৃষ্ঠে উত্থান:—কষ্ট।

দক্ষিণ অঙ্গ শীতলজলে থাকার
ন্যায় শীতল:—স্তাবিন।

কটিদেশে:—ক্যাম্ফ, * পলস, থুয়া।

গ্রীবা হইতে নিম্নে অবনমন:—
ভেলব।

একাক্ষে:—এব্রা, আর্গ, বেল, ব্রাই,
* কষ্ট, ক্যাম্ফ, হিপ, * ইথে,

ক্রিয়াজ, * লেড, লাইকো, *
নক্স, পার, * পলস, রস, * সিলি,
সিলি, * স্পিজি, ভিরাট।

ত্রিকাহিতে:—পলস, * সলফ।

স্বাক্ষ:—কালী-বা, ভিবাট।

পাশ্চাত্যে :—মেনি ।

একপাশ্বে :—আর্ণ, ব্যাংকা, *

বাই, *কার্কো-ভে, *কষ্ট, চেলিড,

ডিজি, ইলাট, ফিব, ল্যাক, *

লাইকো. নাইট-এসি, গ্রাট-মি,

নকস, * পার, পলস, * বস, *

থুজা, ভার্ক ।

* বামপাশ্বে :—* কার্কো ভে. * *

কষ্ট, ইলাট, ফিব, ল্যাক + *

লাইকো, + বস, থুজা ।

দক্ষিণ পাশ্বে :—আর্ণ, + বাই, কষ্ট,

গ্রাট-মি, নকস. * পাব, বস, থুজা ।

দক্ষিণপাশ্বে, বামপাশ্বে'ব উষ্ণতা

সহ :—শার, বস ।

ষেপাশ্বে' শয়ন করা যায় :—আর্ণ ।

আমাশয়-গহ্বরে :—আর্ণ, বেল ।

শীতের প্রকৃতি ।

* শীত ।

শীতলতা :—একন, ইণ, * এগাব,

এথ, * এলম, এম-মি, * এনাক,

* * আবেণ-ডা, আর্ণ, আস,

এসার, অর, ব্যাবা-কা, বেঞ্জ,

বোরাজ, বোভ, বেল, ক্রস,

* বাই, ক্যাই, * ক্যাক, * ক্যাক্ফ,

ক্যান, ক্যাহু, * ক্যাম্প, কার্কো-

এ * কার্কো-ভে, ক্যাই * কষ্ট *

সিড, * চেলিড, * চায়না, * সিক,

সিনা, কক, কফ কলোস, কোন,

সাইক্রে, * ডিজি, ড্রোস, ডলক, * ই-

লাপ্স, ইউজেন, * ইউপ-পার্কো,

ইউপ পার্ফ, ইউফ্রে, ফিব, জেলস,

গ্রাফ, গ্রাট, হেল, * হিপ, * ইথে,

অতিওড, * ইপিক, জেট্র, কালী-

বা, * কালী-কা, * কালী-আইওড,

ক্রিয়োজ, ল্যাক, -মো, লেড,

* লাইকো, মাগ-কা, * মেনি,

মার্কিউবিয়াল, মার্ক, মার্ক-কবো,

* মেজ, মক্ফ, নিক. নাইটাব, *

নাইট-এসি, * গ্রাট-মি, গ্রাট-স,

* * নক্স-ম, নক্স-ভ, ওলিন. ওপ,

পাব, * পেট্রো, ফস এসি, * ফস,

প্লাণ্ট-মেজ, * পড, সোস, * পলস,

বাণ-বন্ধ, রাট, * * রস, * স্তানড,

তাহু, ত্রাবা, ত্রাস, * * সিকেল,

সিপি, * * সিলি, স্পিজি, টাফ,

* ট্রামো, * সলক, ট্যাবাক, টিউক,

থুজা, * * ভিরাট, ভার্ক. ভাইওলাটি ।

শয্যা পবিত্র্যাগে শীত, শয্যায়

উত্তাপ :—মেজ ।

একাজ হইতে অন্যাজে শীতের

পরিবর্তন :—* পক্স । [মেজ ।

গাত্রে শীতলজল প্রক্ষেপের ন্যায়

শীত :—চেলিড, লেড, মার্ক,

বাহ্যিক শীত : — *এলম, *এন্ট-টার্ট, আর্গ, আর্স, ব্যারা-কা, ব্রাই, ক্যাক, ক্যাক্স, চায়না, ডিজি, গম-গট, ইগে, *ইপিক, মেনি, মেজ, নক্স ম, শ্রাবাড, সিকেল, সিলি, *ভিরাট ।

বাহ্যিক শীত, আন্তরিকতাপ : — ক্যাক, ইগে । [শ্রাবাড ।

স্পষ্টবিবাকশীল শীত : — নক্স ম.

আন্তরিক শীত : — এলম, এনার্জ, আর্গ, *আর্স, *চায়না, শ্রাট-মি, শ্রাট-স, *পাব, পেট্রো, সোর, *রস, **সলফ, থুজা, **ভিরাট ।

আন্তরিক শীত, বাহ্যিক উত্তাপ : — আর্গ, বেল, কক, ডিজি, ড্রস, ইগে, শ্রাট মি, থুজা ।

আন্তরিক ও বাহ্যিক উষ্ণতা সহ শীত : — *চায়না, কফি ।

উত্তাপ সহকারে শীত ।

বাহ্যিক শীত, ও আন্তরিক তাপ : — ক্যাক, ইগে ।

জরের কম্পসহ শীত : — চায়না, *ড্রস, গ্রাফ; *হিপ, মেনি, পেট্রো, *পডো, পলস, *রস, ভিরাট ।

যুগপৎ একাঙ্গে শীত ও অন্যাঙ্গে উত্তাপ সহ শীত : — চায়না ।

পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ বিশিষ্ট শীতাবস্থা : — *এম-মি, *আর্স, ব্যারা-কা, *বেল, ক্যাক, চায়না, কক, ডিজি, *ইলাপ্স, *হাইওস, আইওড, কালী-কা, লরো, লাইকো, *ফস পলিস, সোব, শ্রাবাড, *ভিরাট ।

পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ বিশিষ্ট শীতাবস্থা, এবং উত্তাপ কালীন আবর্ত ও ক্ষীত মুখমণ্ডল : — *এম-মি ।

পর্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ষশূন্য জ্বালকব উত্তাপ : — *বেল ; শীতোত্তাপ বিমিশ্রিত : — *আর্স, ক্যাক, ক্যাপ্স, কার্কো-ভে, চায়না, ড্রস, ইপি, শ্রাবাড ।

মস্তক হইতে শাখা পর্যন্ত উত্তাপাবেশ সহ শীত : — একন ।

প্রাচ্যে উত্তাপাবেশের অবনমনসহ শীত : — কক । [সিড ।

মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেশসহ শীত : — আন্তরিকশীত, বাহ্যিক উত্তাপ : — * আর্গ, আর্স, বেল, কক, ডিজি, ড্রস, ইগে, শ্রাট-মি, থুজা ।

বক্তৃৎসব বিশিষ্ট শীত : — *এগিস, * * আর্গ, + বেল, ক্যাক্স,

ক্যাম্ব, * হাইওস, ** মল্ল, **
ওপি, ** ভিরাট ।

গাত্রাবরণে উপশমিত হয়না এরূপ

শীত :—* ক্যাস্ট, ক্যাহ্ নল্ল ।

একই সময়ে একাঙ্গে শীত,

অন্যাঙ্গে উদ্ভাপ :—চায়না ।

অধিকক্ষণস্থায়ী শীত :—এন্ট-টাট.

** আরে-ডা, ** ক্যাম্ব, **

ক্যাহ্, গম-গট, * ভিবাট ।

শীতের প্রাবল্য :—** এন্ট, *এন্ট-

টার্ট, ** আরেগ ডা, বোভ, *

ক্যাম্ব, * ক্যাহ্, ক্যাপ্স, সিড,

সিনা, ডুস, * গম-গট, হিপ,

লাইকো, ** মেনি, শ্রাট-মি, **

শ্রাবাড, ষ্ট্রীফ, থুজা, ভিবাট ।

কম্পকর শীত :—একন, এগার.

এম-কা, এনাক, এন্ট, * এন্ট-

টার্ট, আর্স, বেল, বাক্স. * ব্রাই,

ক্যাক্স, * ক্যাম্ব, ক্যাহ্, ক্যাপ্স,

কাষ্ট, কষ্ট, * চেলিড, ** চায়না,

** চিনি-সলফ, কক, কুগ্রাম,

ডলক, * ইলাপ্স, ইউপ-পার্কো, *

ইউপ-পার্পু, জেলস, গ্রাফ, *

গম-গট, * হিপ, ** ইথে, আই-

ওড, ইপি, * কালী-আইওড,

ক্রিয়োজ, * লরো, * লেড, *

লাইকো, লোব, ম্যাগ-ক, ম্যাক্স,

মেনি, মার্ক, * মিউর-এসি. * +

শ্রাট-মি, শ্রাট-স, ** নল্ল, * ওপি.

* পেট্রো, ফেল, * ফস-এসি

ফস, * পড, পলস, * রস, শ্রাবাড,

শ্রাব, * সিকেল, সিপি, ** সিলি

* ষ্টাফ, ষ্ট্রামো, ** থুজা, ভিরাট ।

শীত, অল্পকালস্থায়ী :—* এন্ট টার্ট,

* ইপি, পলস ।

শীত, অল্প অল্প :—ইউপ-পার্পু, লিড,

লাইকো, ভিবাট ।

শীত, ঘর্ষসংযুক্ত :—এন্ট, আর্স, *

কষ্টে. ডিজি, ইউপ-পার্কো, * ইউক্রে,

ল্যাক, ওপি, পেট্রো, সোর,

পলস, মাঝা, * ষ্ট্রাম, সলফ,

ভিবাট ।

শীত, দ্রুতসংঘর্ষণ সহ :—আস, ক্যাক্স,

* ক্যাম্ব, ক্যাপ্স, চেলিড, ইলাপ্স.

ইউপ-পার্কো, গম-গট, * হিপার,

ইথে, * ল্যাক, ** শ্রাট-মিউ, *

শ্রাট-সলফ. * নল্ল, প্লাট, কস,

বাণ-বল, রস, শ্রাবাড, টাবাক, *

* থুজা । [দ্রষ্টব্য ।

শীত, পানিশূন্য :—শীতের অভাব

কম্প :—একন, * এনাক, এক্স, এন্ট,

আরেগিয়া, * অ্যাক্স, * আর্স, ব্যারা-

কা, বেল, ক্যালাড, ক্যাক্স,

ক্যানাব, * ক্যাপ্স, কাক্সো, কষ্ট,

সিড, * ক্যাম, চেলিড, * চিন, *

সিনা, কক, কফ, কোন, কিউর,

ডিজি, ডক, ইভন, ফের, হেল, হিপ, হাইওস, ইথে, * ইপিক, কালী-বা, * কালী-কা, কালী-আইওড, লবো, * লেড, লাইকো, মাথে কা মাথে-স, মেনি, * মার্ক, মার্ক-কবো, মন্ত, ত্রাট-কা, ত্রাট সল, * ত্রাট-নিউ, * নক্স, নক্স-মশ্চ, * ওলিএণ্ড, ** ফস, * ফস-এসি, প্লাণ্ট-মেজ, প্লাট, পলস, রিউম, * বস, * কটো, সাবড, * স্তাবিন, স্তামু, * সিকেল সেনেগা, সোরি, সিপি, * সিলি, * সলফ, স্পিজি, ট্রাম, টাবাক, টিউক, থুজা, ভিবাট, বার্সা, ভাইলা, জিক্স । [ডিজি ।

কম্পপৃষ্ঠে:—এণ্ট, এপিঙ্গ, কষ্ট, সিড,

কম্প, শীতলজল নিষ্ক্ষেপজনিতবৎ

—এনাক, এণ্ট-টার্ট, আর্গ, আস, * ব্যারা-কা, ব্রাই, * চিন, সিগ, লেড লাইকো, * ম্যাগ-কা, * মার্ক, * মেজ কস, পলস, * * বস, * সাবড, ট্রাম, স্পিজি, থুজা, ভিরাট, বার্স । (শীতল জল জনিত শীতেব ত্রায় শীত দ্রষ্টব্য) ।

কম্প, দাহ পরিশূন্য, শীতেব পব

ষষ্ঠ্য সংযুক্ত;—কষ্ট, ক্যাপ্স, নাই-

মেজ । (উত্তাপভাব দ্রষ্টব্য) ।

কম্প, রৌমাঞ্চ সহ:—এক, ব্যারা-কা, চিন, ইথে, নক্স । (পরবর্তী পবিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।

কম্প এক পার্থক্য:—বেল, কষ্ট, লাইক, নক্স, পলস, * বস, থুজা * বার্স ।

কম্প আংশিক:—* আস, ব্রাই, ক্যাপ্স, কষ্ট * চিন, কক, গ্রাফ, হেল, হিপ, ইথে, * পলস, বস, স্তাবি, স্তামু, স্পিজি, স্পিজ, টাক থুজা, ভিবাট ।

কম্প একাঙ্গীন:—ক্যাম, চিন :

কম্প, স্থানবিকশশীল:—নক্স ।

উত্তাপ সহ কম্প ।

কম্প উত্তাপ সহ পর্যায়ক্রমে:—

* আস, ক্যাক্স, বেল, * দুস, কালী বা, কস-এসি, * নক্স ।

কম্প, পর্যায়ক্রমে কম্প ও মুখমণ্ড

লের উত্তাপ:—ক্যাম, * সিনা ।

কম্প উত্তপ্ত মস্তক ও আরক্ত মুখ,

মণ্ডমলসহ:—* আর্গ ।

কম্প ও উত্তাপ বিমিশ্রিত,—* ক্যাম,

* সিনা, সোব ।

কম্প, পরবর্তী উত্তাপব্যতীত,—এম-

নিউ, কক ।

জ্বরের প্রকার ।

অগ্রগামী ;—*আস', * ব্রাই, চিন,

চিন-সলফ, ইগ্নে, ছাট-মিউ, *নক্স ।

পশ্চাদগামী :—চিন, সিনা, গম, ইগ্নে,

ইপি ।

পরিবর্তনশীল :—ইগ্নে, মেনি, পলস ।

রক্তসঞ্চিত বা দূষিত :—এপিস, *

*আর্ণ, * বেল, ক্যাক্ট, * ক্যাম্ফ,

হাইওস, * নক্স, ওপি, ভিবাট ।

পাক্ষিক :—আস', * চিন, পলস ।

(শীতের সময় দ্রষ্টব্য) ।

মাসিক :—নক্স, *সিপি ।

বার্ষিক :—*আস', *কার্কো-ভে, *ল্যাক

*সলফ, থুজা ।

আহারান্তিক :—মেবম ।

ঋতুর পরবর্তী :—নক্স ।

অনিয়মিত আবেশ :—*আস', নক্স ।

*পলস, স্ত্রাষ ।

শুষ্ক বিরাম সদৃশ :—চিন-সলফ ।

প্রাত্যহিক :—একন, আরেণ, আস',

এসাক, বেল, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাক্স,

ক্যাম্প, কার্কো, চিন, সিক, সিনা

* কিউর, ড্রুস, ইলাপ্স, জেল,

গম, গ্রাফ, ইগ্নে, ইপি, কালী-

কা, ল্যাক, লাইকো, ছাট মিউ,

নাইট-এসি, *নক্স, পেট্রো, কম.

পলস, রস, সাবড, সারা, স্পিজি,

টান, হাফ, ট্রাম, সলফ, ভিরাট ।

প্রাত্যহিক দ্ব্যৌকালীন :—বেল,

চিন, *ইলাট, গ্রাফ, লেড ট্রাম,

সলফ ।

দ্ব্যাহিক :—এলম, এনাক, এন্ট,

আরেণ, * আস', *বেল, বোর, *

ব্রাই, ক্যাম, ক্যাক্স, * ক্যাহ,

ক্যাম্প, কার্কো-এ, কার্কো-ভে, *

চিন, * চিন-সল, সিক, সিনা,

কোট, ডাক, ড্রুস, ডক্স, *ইউপ-

পার্কো, ফের, জেলস, হাইওস,

ইগ্নে, *ইপি, ল্যাক, *লাইকো, *

*মেজ, * * ছাট-মিউ, নক্স-ম, **

নক্স, *পলস, রস, সাবড, সারাক,

সলফ, ভিরাট ।

দ্ব্যাহিক দ্ব্যৌকালীন :—আস', চিন,

ডলক্স, ইউপ-পার্প, গম, লাইক,

নক্স-ম, *বস ।

ত্র্যাহিক :—একন, এনাক, আর্ণ, *

আস', বেল, ব্রাই, কার্কো, সিনা,

ক্রিম, ইলাট, *হাইওস, * ইগ্নে, *

আইওড, ইপি, ল্যাক, লাইকো,

*মেনি, ছাট-মিউ, নক্স-ম, ন-ক্স, *

পলস, রস, *সাবড, *ভিরাট ।

ত্র্যাহিক দ্ব্যৌকালীন :—আস', চিন,

ডলক্স, ইউপ-পার্প, গম-গট, লাই-

কো, নক্স-ম, রস ।

সাধারণত এক অবস্থা পরিশূন্য :

—*আর্স*।*

অতিশয় অনিয়মিত অবস্থাসম্পন্ন :

—আর্স, ইপি, নক্স, ওপি ।

শীতকালীন লক্ষণ ।

উদরের স্ফীততা :—সিনা, *কালী-কা

উদরের শীতলতা :—ইথু, এপিস, আর্স

ক্যাম, চেলিড, *চায়না, মেনি, ফস
এসি, সিকেল ।

উদরের বেদনা :—আরেগিয়া, আর্স,

বোভ, ব্রাই, কালাড, ক্যাক,
চায়না, কফি, ইউপ-পার্কো, ইথে,
লাক, মেক, মাবকিউরিয়া, মার্ককরো,
নাইট-এসি, নক্স, প্যালাড, ফস, পডো, পলাস, রস,
কমেজ, সিপি । [*পলাস ।

বায়ু অতিবিক্ত উত্তপ্ত অনুভব :—

বায়ু অতিবিক্ত শীতল অনুভব—

* ব্যাংরাই-কা, * ক্যাক, ক্যাম্প,
কষ্ট, কফি, সাইক্রে, * ডিজি, ইলাপ্স
* হিপার, কালী-কা, মার্ক * মেজ *
পেট্রো ।

উষ্ণ বায়ু শীতল অনুভব, —*থুজা ।

উৎকর্ষা—একন, আর্স, ক্যাক,

ক্যাম্প, নক্স, পলাস, ভিরাট ।

উত্তম ক্ষুধা—চিনি, সলফ ।

বাহ্যর শীতলতা, —বেস ।

বাহ্যর পক্ষাঘাতবৎ দুর্বলতা ;—

ফস এসি । [মেনি

বাহ্যর শিরা প্রসারণ ;—* চেলিড,
পৃষ্ঠের খঞ্জতা ;—ককু ।

পৃষ্ঠের বেদনা ;—এপিস, আর্স, বেল

কাক, * ক্যাম্প, কার্কো ভে কষ্ট,
* চিনি-সলফ, ইলাট, * ইউপ-
পার্কো, হাইওস, ইথে, ল্যাক, মক্স,
ফ্রাট-মিউ, * নক্স, প্যালাড,
পলাস, জিঙ্গ ।

দৃষ্টিহীনতা :—পেট্রো ।

রক্ত যেন সঞ্চালিত হইতেছে না

একুপ অনুভব :—বোব ।

রক্ত যেন শীতল হইয়াছে একুপ

অনুভব :—* রস ।

অস্থিতে বেদনা :—আরেগিয়া, আর্স,

* ইউপ-পার্কো, * ইউপ পাপু,
ফ্রাট-মিউ, * নক্স, * সাবাড ।

অস্ত্রে বেদনা :—ইথু ।

শ্বাস শীতল :—* কার্কো-ভে, ভিরাট

শ্বাস উত্তপ্ত :—এনাক, ক্যাক, ক্যা-
মো, * রস ।

শ্বাস দীর্ঘগ্রহণের ইচ্ছা :—সিম ।

ঘৃষ্টবৎ অনুভব :—* আর্গ ।

এক গালের উত্তাপ :—* একন,
আর্গ ।

এক গালের আরক্ততা :—* একন

আর্গ, * ক্যাম, ইপি ।
 এক গালের আরক্ততা, অপর গা-
 লের পাণ্ডুরতা ও শীতলতা :
 * একন, ক্যাম, ইপি ।
 গণ্ডদ্বয় শীতল :—চেলিড, * সিনা,
 * পেট্রো, * রস, সিকেল ।
 গণ্ডদ্বয় মলিনারক্ত :—* এলম ।
 গণ্ডদ্বয় উত্তপ্ত :—* একন, ব্রাই,
 ক্যাক, ক্যাম, * চায়না, * সিনা,
 * লেড, পলস, হোফ ।
 গণ্ডদ্বয় আরক্ত :—এলম, * আর্গ,
 * চায়না, মারকিউরিয়াল ।
 বক্ষঃস্থল ভারবোধ :—* এপিস, *
 ব্রাই, সিম, ডাফ, ইপি, ল্যাক,
 মারকিউরিয়াল, * মেজ, * গ্রাট-
 মিউ, পলস ।
 বক্ষঃস্থলে বেদনা :—আর্স, বেল,
 ল্যাক, * সাবাড, * রস, সিনেগা ।
 বক্ষঃস্থলে স্পর্শদ্বৈষ :—ল্যাক ।
 বক্ষঃস্থলে সূচী-বেদন :—* * ব্রাই,
 ইউপ-পার্কো, কালী-কা, ল্যাক,
 * রস, * কমেজ, সাবাড ।
 উদর-বেদনা :—*** ককু, * লেড ।
 মোহ :—বেল, * হিপার, গ্রাট-মিউ ।
 টঙ্কার বা দঢ়কা :—* ল্যাক, মার্ক,
 নক্স ।
 প্রতিক্ষায় :—কালাদ, ইলাট ।

কাস :—এপিস, * * ব্রাই, ক্যাক,
 সিনা, ক্রিয়োজ, কস, সোর, * *
 রস, কমেজ, ** সাবাড, * সাধু,
 সলফ ।
 কাস জলপানে উৎপন্ন :—** সোর
 আরক্ত থাকিতে পারা যায় না :
 —ক্যাম্ফ ।
 আরক্ত থাকিতে ইচ্ছা :—আর্গ, ক্যা-
 ফ, ইউপ-পার্কো, গ্রাট-মিউ, *
 নক্স, ফস, * ট্র্যামো ।
 আরক্ত হইলেও অনুশ্রবণম :—*
 ফস, রস ।
 থল্লী :—* সিলি ।
 রোমাঞ্চ :—* মারকিউরিয়াল ।
 প্রলাপ :—* আর্গ, বেল, গ্রাট-মিউ,
 নক্স, সলফ, ভিরাট । [ভিরাট ।
 অতিসাব :—আর্স, ইলাট, ফস, রস,
 পানাস্তে কাস :—সিম ।
 পানাস্তে শিবোবেদনা :—সিম ।
 শ্বাস-কষ্ট :—* এপিস, আর্গ, * গ্রাট-
 মিউ, নক্স, পলস ।
 কর্ণ-বেদনা :—গ্রাফ, গম-গট ।
 কর্ণ শীতল :—সিক, গ্রাট-মিউ ।
 কর্ণ উত্তপ্ত :—একন, * ইগ্রে, রাগ-
 বহ ।
 কর্ণ আরক্ত :—বেল ।
 কর্ণে শব্দ :—চিনি-ন-সলফ ।

কণ্ঠে বেদনা :—এক, * পডো।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—ক্রি-

বোজ।

রক্তের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট

উদগার :—এসাক।

অবসন্নতা :—এছা, আবেগিয়া, ইপি,

মার্কিউরিয়াল।

হস্তপদের শীতলতা ও নীলবর্ণ :

* ক্যাম্ফ, ষ্ট্রামো।

হস্তপদে খল্লী :—সিড, কুপ।

চক্ষু স্থির :—একন।

চক্ষে বেদনা :—সেনেগা।

চক্ষে আলোকে অনুভবাধিক্য :

—নক্স।

চক্ষে কনকনি :—সিড।

বদন স্ফীত :—* এম-মিউ, বেল।

বদন নীলবর্ণ :—জাট মিউ, * নক্স,

পেট্রো, * ষ্ট্রাম।

বদন শীতল :—* ক্যাম্ফ, চেলিড,

* সিনা, * ড্রস, * হিশাব,

ইথে, * নক্স, * পেট্রো, * প-

লস, রস, * সিকেল, * ষ্ট্রাম,

* ভিরাট।

বদন শীতল ও পতনাবস্থা প্রাপ্ত :

* ক্যাম্ফ, * ভিরাট।

বদন উত্তপ্ত :—একন, এগার, এ-

নাক, এলন, এছা, * এশিস,

* আর্গ, বেল, বার্ব, ব্রাই,

ক্যাক, ক্যানাব, সিড, ক্যাম,

চায়না, কলোস, ডিজি,

* ড্রোস, ইউফ, * ফির, জেলস

হেলি, * হাইওস, জেট, ক্রি-

য়েস, ল্যাক, ল্যাউ, লেড,

লাইকো, মার্ক, মার্কিউরি-

য়াল, মেজ, মিউর-এসি, জাট-

কা, নক্স, ওলিও, পলস,

রাগ-বব, * বস, জাবাড, মার্,

সেনেগা, ষ্ট্রাক, * সলফ।

বদন কেবল উত্তপ্ত :—আর্গ।

বদন পাণ্ডুবর্ণ :—এন্ট-ট্যাট, সেন,

* ক্যাম্ফ, ক্যাক, চায়না, চিনি-

সলফ, * সিনা, * ড্রস, * হিশাব,

ইথে, নক্স, * নক্স-ম, * পলস,

* সিকেল, সলফ, ** ভিরাট।

বদন পাণ্ডুবর্ণ শয়ন কালে :—বেল।

বদনের বামপার্শ্বে বেদনা :—

ড্রোস।

বদনের দক্ষিণপার্শ্বে উত্তপ্ত ও শুষ্ক

:—ড্রোস।

বদনের আরক্ততা :—* একন, *

এম-মিউ, আর্গ, আর্স, বেল,

ব্রাই, ক্যাম, চায়না, ডিজি, ফির,

* হাইওস, ** ইথে, ক্রিয়োজ,

লেড, লাইকো, মার্কিউরিয়াল,

মার্ক, নক্স, অক্স-এসি, পলস, * রস,

ষ্ট্রাম, সলফ।

বদনের পর্যায়ক্রমে আবর্ততা ও

পাণ্ডুরতা:—রস ।

মূচ্ছা:—*ভেলব ।

পদে একবার জ্বালা একবার শীত-

লতা:—গ্রাফ ।

পদ শীতল:—একন, এলম, এক

এণ্ট,*এপিস, এসাফ, * ব্যারাই-

কার্ক,* বেল, বার্ক, বোভ.ব্রোম,

ক্যান্ফ, * ক্যান্থ, কার্কো-এ, *

কার্কো-ভে,*কষ্ট, সিড, চেলিড,*

চিন, সিম, কফ, কপ, ডিজি,

ড্রোম, ইউপ-পার্প,*ফেব, জেলস,

গ্রাফ,*হিপার,*হাইওন,আইওড,

ইপি, কালী-বা, কালী-আইওড,

ক্রিয়োজ, ল্যাক,*লাইকো, ম্যাথ-

কা, ম্যান্ড,** মেনি, মার্ক,* মেজ,

জাট-মিউ, * নাইট-এসি, নক্স-গ,

*ওপি, পালাড, পাব, পেট্রো,

* * ফস, প্লাণ্ট মেজব, পলিপ, *

মোর, *পলস, রস, সাবাড,*

সাধু, সারাক,*সিকেল,** সিপি,

সিলি, ষ্টাণ, ষ্ট্রাম, গাফ, * থুজা,

* * ভিরাট ।

পদ শীতল ও গাত্রবিস্তারিত:—এণ্ট ।

পদে খল্লী:—ইলাট,*নক্স ।

পদে অসাড়তা অনুভব:—সিম,*

পলস, ষ্ট্রাম ।

পদে শোথজনিত স্ফীততা:—ইউপ-

পার্কো, কালী-আইওড ।

পদে উত্তাপ:—কালড, কালী-ক্রোব

পদতলে উত্তাপ:—মার্ক । [এসি ।

পদের ববফবৎশীতলতা:—*নাইট-

পদেব নীলবর্ণ:—ষ্ট্রাম ।

পদেব অবশতা:—ফেব, লাইকো,

নক্স-গ, পলস, সিপি, ষ্টান ।

একপদ শীতল অন্যপদ উত্তপ্ত:—

পলস ।

পদে বেদনা:—কোপ ।

পদ আর্দ্রবৎ অনুভব:—ইপি,*সিপি

পদ যেন শীতল জলে রহিয়াছে

একপদ অনুভব:—জেলস, মার্ক,

সিপি ।

হস্তাঙ্গুলী নীলবর্ণ:—*পেট্রো ।

হস্তাঙ্গুলী পর্যায়ক্রমে শীতল ও

উত্তপ্ত:—পাব ।

হস্তাঙ্গুলী শীতল:—এক্স, * এপিস

ক্যান্ট, সিড, ডিজি, মেনি,

জাট-মিউ, নক্স, পার, ফস-এসি,

প্লাণ্ট-মেজ,* সিপি, সলফ, টাব,

ভিবাট ।

হস্তাঙ্গুলীর আচ্ছন্নতা:—ফেব ।

আহারে অরুচি:—কালী-কা ।

আহারে দাদশৃঙ্গতা:—আস ।

কপালে শীতলঘর্ষঃ—চায়না,*সিনা

কপালে উত্তপ্ততাঃ—*একন,ক্যাক,

চায়না,*লেড, ছাটু-সল ।

কপালে বেদনাঃ—ইউপ-পার্শ্ব,*

ছাটু-মিউ । [ডিজি ।

কপালে ঘর্ষঃ—ব্রাই, চিন, সিনা,

জুস্তগঃ—এলম, সিম, ইলাট, *লাউ-

কো, *নক্স ।

রোমাকঃ—এক্স, ব্যাবাই-কার্ক, বেল,

ব্রাই, ক্যাক্স, ক্যানাব, ক্যাক্স,

কার্কো-এ, ক্রোক, ক্রোটন,হেলি,

লরো, *লাইকো, *ছাটু-মিউ,*

নক্স, পায়,ফস,প্লাণ্ট-মেজ,সাবাদ,

ষ্টাক, থুজা ।

কেশ কণ্টকিতঃ—* ব্যাবাই-কার্ক,

ডকা, গ্রাট, মেনি ।

হস্ত নীলবর্ণঃ—জেলস, জেট্র, ছাটু-

মিউ, * * নক্স,* ষ্ট্রাম ।

হস্ত শীতলঃ—একন, এগার, এক্স,

এপিস, *আর্ণ,*ক্যাক্স,* ক্যাক্স,*

ক্যাক্স,*কার্কো-ভে, *চেলিড,*

টিন, সিড, কফ, কোন, ডিজি,*

ভুস, ইউপ-পার্শ্ব, ইউফ্রে,*ফের,

জেলস,* হিপার, * হাইওস,

আইওড,* ইপি, কালী-বা,*

লেড,* লাইকো,ম্যাক্স,* মেনি,

*মার্ক,*মেজ, ছাটু-কা, * ছাটু-

মিউ,* নাইট-এসি, নক্স-ম,*নক্স,

ওলিএণ্ড,*ওপি, পালাড, পেট্রো,

ফস-এসি,** ফস,*পলিপ,*পলস,

* রস,* সাধু, সাবাদ, সারাক,**

সিকেল,*সিপি, ষ্টাণ, ষ্টাক,*ষ্ট্রাম,

সলফ,*টার,*থুজা,** ভিরাট ।

হস্ত কুঞ্চিতঃ—সিম ।

হস্তের উত্তাপঃ—এপিস, সিড, সিনা,

ইপি, কালী-কা,*মেজ, ছাটু-কা,

ছাটু-সল, সাবাদ, সিপি ।

হস্তের শ্যাববর্ণঃ—ষ্ট্রাম ।

হস্তের অবশ্যতাঃ—সিম,ফির,লাইকো,

নক্স-ম,*পলস, সিপি ।

হস্ত একখানা শীতল অপর ঋষি

উষ্ণঃ—চিন ।

হস্তের তল আর্দ্রঃ—নিক ।

হস্তের আর্দ্রতাঃ—কালী-কা ।

হস্তে শীতল ঘর্ষঃ—সিনা ।

হস্তের শিরাবিলোপঃ—ইউফ্রে ।

হস্তের শিরাপ্রসারণঃ—*চেলিড,

* মেনি, * ফস ।

হস্ত আর্দ্রবৎ অনুভবঃ—ইপি ।

মস্তক উত্তপ্তঃ—একন, এলম, *

আর্ণ, এসার, বেল, বার্ক, ব্রাই,

সিড, চায়না, সিনা, ইউপ-পার্শ্ব,

জেলস, ল্যাকনা, ম্যাক্স, মেজ,

জাট-সল, নক্স, ওপ, রোড, *
ট্রাম, ভিরাট ।

মস্তক নিরবচ্ছিন্ন উত্তপ্ত :—*আর্গ ।

মস্তক বাহিরে ব্যথিত :—হেলি ।

মস্তকে সূচী-বেধ :—এসফ ।

মস্তকে ঘর্ষ :—ওপি ।

মস্তকের মূর্দ্ধাদেশ আকুঞ্চিত অনু-
ভব :—* কালী-বা ।

মস্তক বেদনা (মাথা ধরা) —

একন, এনাক, এন্ট-টার্ট, * আ-
রেণিয়া, * বেল, বার্ক, বোর,
ব্রাই, ক্যাপ্স, কার্কো, চিন, চিন-
সলফ, সিম, সিনা, কোর-র, ডাক,
ড্রস, ইলাট, ইউফ-পার্কো, * ই-
উপ-পার্পু, ফের, গ্রাফ, ইণ্ড, ইথে,
ক্রিয়োজ, ম্যাক্স, মেজ, ** জাট-
মিউ, নক্স, পেট্রো, * পলস, সাক্স,
** সিপি, সলফ ।

মস্তক-বেদনা, খোলা বাতাসে উ-
পশমিত :—* আরেণিয়া ।

মস্তক-বেদনা, কশালে :—ইউপ-
পার্পু, ** জাট-মিউ ।

মস্তক-বেদনা, একপাশে :—ইথে ।

জংপিণ্ড স্পন্দন :—জেলস, ফস-
এসি ।

জংপিণ্ডপ্রদেশে আক্ষেপ ও বে-
দনা :—ক্যাক ।

ধৃত হইবার ইচ্ছা :—জেলস,
ল্যাক ।

দৃঢ়রূপে ধৃত হইবার ইচ্ছা :—
*ল্যাক । [**ল্যাক ।

ধৃত হইয়া নীচে থাকিবার ইচ্ছা
দ্রবভঙ্গ :—হিপার ।

গাত্রে যেন চুল চলিয়া ফিরিতেছে
একরূপ অনুভব :—* ব্যারাই-
কা, মেনি, সোর, সারা ।

ক্ষুধা :—*সিনা, নক্স, ফস, **সিলি।
গুম্বাবায়ু :—* ইউপ-পার্পু ।

বরফে যেন শয়ন করিয়া রহিয়াছে
একরূপ অনুভব :—**লাইকো ।
অস্ত্রে জলপানান্তে শীতলতা :—
চেলিড ।

উপদাহিতা :—এনাক, ক্যাপ্স, *
সিনা, জেলস, হাইওস, ইথে,
কালী-বা, ক্রিয়োজ, * নাইট-
এসি, প্লাস্ট-মেজ ।

উৎক্ষেপ :—ট্রাম ।

সন্ধিহলে বেদনা :—* সিম, হেল,
* গড, রাফ ।

বৃককে বেদনা :—মিলিফো ।

জানুর শীতলতা :—*এপিস, * কা-
কো, * ইথে, * ফস, * সিলি ।

অশ্রুস্রাব :—ইলাট ।

অলসতা :—এছা, আরেণ, কার্কো,

কষ্ট, মারকিউরিয়াল, ন্যাট-মিউ।

বাম জজ্বার শীতলতা :—*কার্কো-

ভে। [স্তাবিন, সিপি।

দক্ষিণ জজ্বায় শীতলতা :—ইলাপ্স,

জজ্বায় অতি-য় শীতলতা :—

** মেনি, সিকেল, ট্রাম।

জজ্বায় খল্লী :—ইলাট, * নক্স।

জজ্বায় গুরুত্ব :—থেরিড।

জজ্বায় খঞ্জত্ব :—ইমে। [*নক্স।

জজ্বায় অবশতা :—* ইউপ-পাপু,

জজ্বায় অবস্থান পরিবর্তন শীলতা

সিম।

জজ্বা প্রসারণে অসমর্থতা :—*সিম

জজ্বায় স্পর্শ-ধ্বংস :—বেল।

জজ্বায় শ্রান্তি অনুভব :—জেলস,

রস।

জজ্বায় দুর্বলতা :—সেনেগা।

শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা :—* ব্রাই,

সিড, ড্রস, ফের, * ল্যাক, মার্ক,

নক্স; পলস, * সিপি, * সিপি.

থেরিড।

আলোকে আতঙ্ক :—বেল।

অঙ্গের শীতলতা :—একন, ইবু. এ-

ছা, এণ্ট-টার্ট, আর্গ, আর্স, অবন,

* বেল, বার্ক, ক্যালড, ক্যান্স,

ক্যান্স, কান্স. কার্কো এ, কার্কো-

ভে, কষ্ট, ক্যান্স, চেলিড, চায়না,

সিক, কলোস, কোন, ডিজি,

গ্রাফ, হেলি, হাইড্রোসা, হাইওস,

ইপি, জেট্ট, কালীকা, লরো,

লেড, লাইকো, * মেনি, মার্ক,

* মেজ, 'স্মাট-মিউ, নাইট-এসি,

* নক্স, * ওপি, পিয়ন, ফস, প্লাট-

মেজ, * পলস, বস, সিলা, * *

সিকেল, সিপি, * ট্রাম. সলফ,

খুজা, ভিবাট, ডার্ক। (শীতের

অবস্থান দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গের আকৃষ্ণন :—ক্যান্স, সিম।

অঙ্গের বেদনা :—একন, আর্স, বেল,

ব্রাই, সিনাব, ডাক, ইলাট,

ইউপ-পার্কো, ইউপ-পাপু, গ্রাফ,

হেলি, ল্যাক, লেড, লাইকো,

মারকিউবিয়াল, * মেজ, স্মাট-

মিউ, নাইটার, * নক্স, ওপি, * পলস

* বস, * স্তাবড, সিপি, সলফ।

অঙ্গের পক্ষাঘাত :—* ট্রায়ো।

অঙ্গপ্রসারণ ও অবনমন :—এলম।

অঙ্গ কাম্পন :—বেল, * চিনি-সলফ,

কোন, স্তাবড।

অঙ্গ স্পন্দন :—* নক্স, ট্রাম।

ওষ্ঠ নীলবর্ণ :—* চিনি-সলফ, *

ইউপ-পাপু, ইপি, ** স্মাট-মিউ

* নক্স, * সিকেল।

বহুদেশে বেদনাঃ—আর্স, ব্রাই,*

চায়না, নক্স,*পডো, ভিরাট ।

কটিদেশে বেদনাঃ—আর্স, ক্রিয়োক,

ল্যাক, নক্স, ভিরাট ।

অধিক কথা বলাঃ—*পডো ।

কাতরোক্তিঃ—*ইউপ-পার্কো ।

মুখের শুষ্কতাঃ—*মেজ, * পেট্রো,
থুজা ।

মুখের পশ্চাষ্টাগের শুষ্কতা, সম্মুখ
ভাগে লালান্ সঞ্চয়ঃ—*মেজ ।

মুখে ফেনাঃ—সিনা, থেরিড ।

শ্লেথ্মা বমনঃ—*পলস ।

পেশীতে বেদনাঃ—*আর্গ ।

নখের নীলবর্ণঃ—এপিস,আর্গ, আর্স,

*এসাক, অবম, * কার্কো ভে,

*চিন-সল, কক, কোন, *ড্রস,

ইউপ-পার্পু, ইয়ে, ইপি, মেজ,

**আটি-মিউ, **নক্স, *পেট্রো,

ফস-এসি, সলফ, *থুজা ।

হাতের নখের হেতবর্ণঃ—সিলি ।

বিবমিষাঃ—আর্জ-নাই, * আর্স,

অরম, বেল, ব্রাই, চেলিড, চিন,

সিনা, *ইউপ-পার্কো, *ইউপ-

পার্পু, ইয়ে, ইপি, কালী-বা, কালী-

কা, কোবান্ট, ল্যাক, লাইকো ।

* লোন, মার্ক সল, * আটি-মিউ,

পেট্রো, পলস, রস, ক্রমেজ, *

আবাত, আক, সিপি, ভিরাট ।

বিবমিষা, জলপানাস্তে :—* আর্স.

আর্গ, * ইউপ-পার্কো ।

বিবমিষা, জল গিলিলে উপশম

প্রাপ্ত :—* লোব ।

স্নায়বীয়তা :—কক, ইউপ-পার্প ।

শব্দে বিদ্রোহ :—*বেল,* ক্যাম্প, *

হাইওস ।

নাসা, শীতল :—এপিস, এন্ট, সিড.

চেলিড, আইওড, মেনি, * পলিপ,

সিলি, সলফ, * টাব ।

নাসাগ্র, শীতল :—* সিড ।

নাসা, আরক্ত :—বেল ।

নাসায় শীতল ঘর্ষ :—সিনা ।

অবশতা :—চিন, ফের, লাইকো,

পলস, * সিপি ।

শরীরের যেখানে ভর দিয়া থাক

যায় সেইস্থানে বেদনা :—

ব্যাপ্ত ।

বেদনার আবেশ :—আর্স, চিন

ইউপ-পার্কো, নাইটার, পলস, রস

জজায় পক্ষাঘাতেরতায় অনুভব

—আর্স, ইয়ে ।

আলোকাতঙ্ক :—হিপ ।

লালাশ্রাবঃ—ক্যাম্প ।

নাড়ী, পূর্ণ :—এন্ট-টার্ট, চিন সলফ ।

নাড়ী, কঠিন :—চায়না ।

নাড়ী, সপর্য্যায় :—একন ।

নাড়ী, বিষম :—চায়না ।

নাড়ী, দ্রুত :—চায়না ।

নাড়ী, মন্দগতি :—মেনি ।

নাড়ী, সূত্রবৎ :—একন, এপিস,
চেলিড ।

নাড়ী, দুর্বল :—সিড, জেলস ।

চক্ষের তারা কুঞ্চিত :—একন,
জেলস । [বেল, ইপি ।

চক্ষের তারা প্রসারিত :—একন, *
স্মরণ করিতে অসমর্থতা :—আর্স,
ক্যাস, ট্রাম ।

হৃদয়, আয়াসিত :—এপিস, আর্স,
জেলস, কালী-কা, * মেজ, জাট-
মিউ, পলস, সেনগা, *থুজা, জিক ।

হৃদয়, দ্রুত :—থুজা ।

অস্থিরতা :—* আর্স, বেল, প্লান্ট-
মেজ, ইউপ-পার্পু, রস ।

ত্রিকাঙ্কনে বেদনা :—আর্স, গম গট,
হাইওস * * নক্স, ভিরাট ।

লালা নিষ্ঠীবন :—এলম, ক্যাস, রস ।

স্বক্কাঙ্কির নীচে বেদনা :—ইলাট ।

স্পর্শজ্ঞান-বিলোপ :—ল্যাক ।

দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতা :—বেল, সিক.
হাইড্রোসা-এসি, সাবাউ ।

ত্বক নীলবর্ণ :—চায়না, মার্ক, জাট-
মিউ, নক্স-ম, *নক্স ।

ত্বক নীলবর্ণ ও দাগ দাগ বিশিষ্ট :—
* * নক্স ।

ত্বক শীতল, আর্দ্র ও আঠাআঠা :—
ল্যাক, * * ভিরাট ।

ত্বক, বরফবৎ শীতল :—* সিকেল
ত্বক, আকুঞ্চিত অমুভব :—পার ।

ত্বক, শুষ্ক :—আর্স, এসাক, আইওড ।
ত্বক কণ্ডূয়ন :—* হিপার; * পেট্রো ।

ত্বক, ব্যথিত :—* নক্স ।

ত্বকে স্পর্শ দ্বেষ :—ক্যাস্ক ।

ত্বকে জ্বল বেধ :—* হিপার, সাধু ।

ত্বক, স্পর্শে উষ্ণ :—আর্স, ইলাপ্স,
গম-গট ।

নিদ্রা :—এম্ব্রা, এন্ট-টার্ট, * এপিস,
সিম, জেলস, * কালী-আইওড,
লাইকো, মার্ক, মেজ, * জাট
মিউ, নক্স-ম, নক্স, * ওপি, পডো
সোর, সিলি ।

নিদ্রা, গভীর, নাক-ডাক বিশিষ্ট :
—* ওপি ।

নিদ্রালুতা :—ইথু, জম্ব্রা, বোরাক্স,
সাইমেজ, ডাক, হেলি, কালীবা,
* কালী-আইওড, মেজ, * জাট-
মিউ, *নক্স-ম, নক্স, ওপি, ফস, টার ।

হাঁচি :—অম্ল-এসি ।

স্পর্শ-দেবামুভব :—* আর্গ ।

আক্ষেপ :—* ক্যাক, ক্যাক্স, ভিরাট ।

আক্ষেপ ত্বরিত :—ক্যাক্স ।

পৃষ্ঠবংশে প্রচাপনে বেদনা :—*

চিন-সল ।

প্লীহাশ্রদেশে বেদনা :—* ব্রাই,*

চিন-সল, * ইউপ-পার্কো,*পডো ।

প্লীহায় সূচী-বেদ :—* ব্রাই ।

প্লীহারক্ষীততা :—ক্যাক্স, পেট্রো ।

টলিয়া টলিয়া চলা :—ক্যাক্স ।

একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা :—সিক ।

শরীরের বৃদ্ধতা ও আটটতা :—ওপি ।

আড়ামোড়া ভাঙ্গা :—এলম, আর্স,

ব্রাই, ক্যাক্স, সিম, কফ, ইলাট,

* ইউপ-পার্কো, ইপি, ক্রিয়োল,

লরো, মেরম, মিউর-এসি, নাইট-

এসি, নক্স, পেট্রো, পনিপ, *রস ।

আমাশয়ে উত্তাপ :—লোবি ।

আমাশয়ে বেদনা :—আর্স, ইউপ-

পার্কো, লাইকো, মারকিউরিয়াল,

সিপি, সলফ ।

আমাশয়ে তুরুত্ব অমুভব :—*বেল :

সূর্য্যোস্তাপ্রাপ্তির ইচ্ছা :—কোন ।

স্বাদ, তিক্ত :—এলম, আর্স, ইউপ-

পার্কো, হিপ ।

স্বাদ, শূন্য :—অরম । [গট ।

কর্তনদন্তে শীতলতামুভব :—গম-

কওরা অতিশয় ইন্দ্র অমুভব :—*সিম

কুহন :—মার্ক-করো ।

উরুর উত্তাপ :—* থুজা ।

উরুর দুর্বলতা :—ভিরাট ।

পিপাসা :—একন, * এলম, এমন-

মিউ, * * এসিস, আরেণ, * *

আর্গ, * আর্স, বেল, বোর, *

ব্রাই, ক্যানাড, * ক্যাক, ক্যাক্স,

ক্যানাব, * * ক্যাক্স, * কার্কো-

ভে, চিন, * চিন-সল, কর-ক,

ডলক, ইলাট, ইলাপ্স, ইউজেন,

* ইউপ-পার্কো, * ইউপ-পার্কো, *

ফির, গম-গট, গ্রাক, * * ইথে,

কালী-কা, কালী-আইওড, ল্যাক,

ল্যাকনা, লরো, * লেড, লোব,

ম্যাথ-সল, মার্ক, মেজ, মিউর-এসি,

নাইট-কা, * স্টাট-মিউ, স্টাট-সল,

নাইটর, নক্স, প্লাট-মেজ, সোর,

পলস, রাণ-ব, * রস, * সিকেল,

* সিপি, থুজা * * ভিরাট ।

পিপাসার আধিক্য :—* এলম, *

এসিস, * আর্গ, * ব্রাই, * ক্যাক্স,

* ইউপ-পার্কো, গম-গট, গ্রাক,

* * ইথে, লেড, মেজ, * * স্টাট-

মিউ, পলস, রস ।

পিপাসায় এক একবারে অধিক
পরিমাণে জলপান ও তদ্বারা

শান্তি :—বাই, * * ছাট মিউ।

পিপাসায় বারে বারে অল্প অল্প
জলপান :—* আর্স, * ইউপ-
পাকো।

পিপার অভাব :—এগাব, * এঙ্গ,

এম মিউ, এনাক, * এণ্ট, * এণ্ট-

টার্ট, * আরেগিয়া, আর্স, এসার

অরম, বারাই-কা, * বেঙ্গ, বোভ,

* ক্যান্ডি, ক্যালান্ড, * ক্যান্ড, *

ক্যাঙ্ক, * কার্কো-এ, কষ্ট, * সিড,

* ক্যাম, চেলিড, * চিন, * সিন,

* সিনা, * কক, কফ, কলোস,

কিউর, মাইক্রে, * ড্রোস, ডলক,

ইলাঙ্গ, ইউফ্রে, জেলস, গ্রাক,

হেলি, হিপার, হাইওস, * ইপি,

কালী-বা, ল্যাক, লাম, 'লাইকো,

ম্যান্ড, মেনি, মার্ক, মিউর-এসি,

নাইট-এসি, ছাট-মিউব, ছাট-

কার্ক, ছাট-সল, নক্স-ন, নক্স-ভ,

ওলিএণ্ড, পেট্রো, ফস-এসি, ফস,

পডো, * পলস, রস, * সাবড,

সাম্ব, সিলি, স্পিজি, * ষ্টাফ, ট্রাম,

সলফ, থেরিড।

গলায় ঘড়ঘড় শব্দ :—ক্যান্ড।

শরীরের অভ্যন্তরে দপদপ :—

জিঙ্ক।

পদাঙ্গুলীর শীতলতা :—* ফের, *
মেনি।

পদাঙ্গুলীতে বেদনা :—এঙ্গ!

দন্ত-বেদনা :—কার্কো-ভে, কালী
কা, গ্রাক, রস।

বোগাক্রান্ত পাদ্ধের নিশ্চেষ্টতা :—
পলস।

কম্প :—এগনস, এনাক, এণ্ট টার্ট,

আস, বোরাক্স, * সিনা, কক,

কোক, কোন, * ইউপ-পার্কো,

ফের, জেলস, মার্ক-আইওড, *

গাব, * পেট্রো, প্রাট, স্তাবড,

টিউক, * জিঙ্ক।

হনু শুষ্ক :—ল্যাক।

অচৈতন্য :—বেল, ক্যান্ড, * হিপাব,

* ছাট-মিউ, নক্স, ওপি, পলস।

গাত্র অনাবরণ বেদনা :—ষ্ট্রাম।

অশুদ্ধতা :—ক্যান্ড, ক্যানাব, ক্যান্ড,
হাইওস, সিলি।

মূত্র-মার্গে বেদনা :—* ক্যান্ড।

মূত্রত্যাগ বাবংবার :—ক্যান্ড, মেফ,
মার্ক।

মূত্র, অঙ্গ :—সিপি।

মূত্র, কপিশ :—সিপি।

মূত্র, মলিন :—ভিবাট।

শীতপিত্ত :—* * হিপার।

শিরা প্রসারিত :—আর্স, আই.

ক্যালাড, ক্যাপ্স, কষ্ট, সিনা, সিম,
ইলাট, টউপ-পার্কো, গম-গট,
কোবান্ট, লবো, লাইকো, মেরম,
* মেনি, মার্ক, মেজ, মিউবেজ,
শ্চাট-মিউ, শ্চাট-সল, ওলিয়াও,
পার, বস, পালপ, সিলি, থুজা ।

পৃষ্ঠের কশেরুকায় বেদনা :—* *
চিন-সল ।

শিরোধূর্ন :—এলম, ক্যাক, ক্যাপ্স,
চিন, কালী বা, লবো, শ্চাট-মি,
নক্স, ফস, পলস, বস, সলফ, তিবাট ।

বমন :—এলম, আর্গ, * আর্স, এসাক,
বোরিক্স, — ইউপ-পার্কো, ফেন,
গম-গট, ইগে, ইপি, ল্যাক, লাইকো,
শ্চাট-মিউ, নক্স, পলস, বাণ, বস,
তিবাট ।

বমন, পিত্ত :—আর্গ, চিন, সিনা, *
ইউপ-পার্কো, ইগে ।

বমন, জলপানাস্থে :—আর্গ, * আর্স
* ইউপ-পার্কো, নক্স ।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—ফেব, ইগে ।

বমন, শ্লেষ্মা :—ক্যাপ্স, ইগে, * পলস ।

বমন, অম্ল :—* লাইকো ।

উষ্ণতার আকাজক্ষা অথচ তাহাতে

শাস্তি জন্মে না :—এলম, আরেণ,
ক্যাক্স, সিক, সিনা, কক, হিপ, *

* ল্যাক, লাইকো, মেনি, নক্স, ফস,
পডো, সিলি, তিরাট ।

উষ্ণতায় অমিচ্ছা :—মেজ ।

উষ্ণতা, বাহ্য অসহ্য :—* পলস, *
সিলি ।

দুর্বলতা :—এথ্রা, আর্স, আরেণ,
বোরাক্স, ক্যাক, কার্কো, কষ্ট,
ডুস, * ইপি, ল্যাক, মারকিউরি-
বাল, * শ্চাট-মিউ, ওপি, ফস, সোব ।

মণিবন্ধে ছিন্নকর বেদনা :—ফস-
এসি, পডো ।

জ্বস্তগ :—* আর্স, আই, ক্যালাড,
ক্যাপ্স, কষ্ট, সিম, * সিনা, ইলাট,
* ইউপ-পার্কো, গম-গট, কোবান্ট,
লবো, লাইকো, মেবম, * মেনি,
মার্ক-সল, * মেজ, * মিউর-এসি,
মিউবেজ, * শ্চাট-মিউর, শ্চাট-সল,
* ওলিয়াও, পার, ফস, পালপ,
সিলি, * থুজা ।

শীতের হ্রাসপ্রাপ্তি,—

খোলা বাতাসে :—* গ্রাফ, * ইপি,
ফস, পলস, সলফ-এসি ।

শয্যায় গাত্র আবরণে :—* কালী-
আইওড, * পডো, বস ।

শয্যা হইতে উঠিলে :—লাইকো, *
তিরাট ।

শস্যের উত্তাপে :—কালী-আইওড ।

গাত্রাবরণে :—মারকিউরিয়াল, পডো,
রস ।

মাধ্যাহ্নিক আহারের পূর্বে :—বার্ক ।

পান্যাস্তে :—*কষ্ট, *গ্রাফ, *ইপি ।

আহারাস্তে :—এব্র, *কিউর, ছাট-
কার্ক, ফস ।

খোলা বাতাসে ব্যায়ামে :—ক্যাম্প,
ম্যাগ-কার্ক, পলস, টাক, মলফ-এসি ।

তত্ত্ব ইঞ্জির তাপদানে :—ক্যাম্প,
ল্যাকনান ।

দৃঢ়রূপে ধৃত হইলে :—*ল্যাক ।

শয়নাস্তে :—*কালী-কা, মারকিউ-
রিয়াল, রস, মলক ।

নড়িলে চড়িলে :—এপিস, আর্গ,
এসার, বেল, ক্যাম্প, সাইক্লো,
মার্ক, মেজ, নাইট-এসি, নক্স,
পডো, রস, সিলি, স্পিজি ।

উপরে চাপ দিলে :—ল্যাক ।

উত্থানে :—রস ।

উপবেশনে :—ইয়ে, নক্স ।

নিদ্রাস্তে :—ব্রাই, ক্যাম্প ।

নিদ্রাকালে :—রস ।

রৌদ্র সেবনে :—এনাক, কোন ।

অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে :—*ক্যাম্প ।

বাহ্য উত্তাপে :—*আর্স, ব্যারা কা,

ক্যাম্প, ক্যাম্প, কার্বো-এ, *চিন,
সিক, কোন, কোর-ক্স, হিপো,
*ইয়ে; *কালী-কা, *ল্যাক,
মেনি, *মেজ, নক্স-ম, নক্স, *
সাবাড, মলক ।

গাত্রবস্ত্রাবৃত করিলে তৎপরে তীব্র
উত্তাপ ও ঘর্ষণ :—সিলি ।

শীতের বৃদ্ধি প্রাপ্তি ।

বায়ু-প্রবাহে :—ক্যাম্প, কার্বো-এ,
ডলক, *নক্স ।

অনাবৃত বায়ুতে :—এনাক, এগার,
এন্ট-টাক, *আর্স, ব্যারা-কা,
ক্যাম, চেলিড, চিন, *সাইক্লো,
ডলকা, *হিপার, কালী-ক্লোর,
মার্ক, মার্ক-করো, মক্স, নাইট-
এসি, *নক্স-ম, *নক্স-ভম, পেট্রো,
প্লাট, *পলস, রাথ-বন্ড, রস,
সেগেনা, সিলিয়া, জিক ।

ঘুম ভাঙ্গিলে :—*এমন-মিউ ।

শয্যাভাগে :—*কাহ, **নক্স,
*সিলি । [*ক্যাক ।

আর্দ্রতাভোগে :—আরেগিয়া,

শীতলদিনে :—*আরেগিয়া, ক্যাম,
ইয়ে ।

বৃষ্টিদিনে :—*আরেগিয়া, কিউর ।

জলপানে :—এলম, *আর্স, এসার,
ক্যানাব, **ক্যাপ্স, *চিন, কক,
*ইলাপ্স, ইউপ-পার্কো, *লোবি,
লাইকো, মেজ, * *নক্স, *রস,
সিলি, টার, *ভিরাটি । [ক্যাম ।
উষ্ণ পানীয় পানাস্তে :—এলম,
আহারাস্তে :—কার্কো-এ, কক,
ইউফ, *গ্রাফ, ** কালী-কা,
*রস, টার । [* রস ।
আহার কালীন :—ইউফ, লাইকো,
সায়াক্রে :—কার্কো-ভে, *কালী-কা,
পলস ।
শ্রমকালে :—*আর্স, মার্ক, নক্স,
সিলি, সলফ ।
নড়িলে চড়িলে :—*একন, এগার,
এলম, *এন্ট-টার্ট, *এপিস, আর্গ,
ক্যাম্ফ, *ব্যাস্ফ, সিড, চিন, কফ,
কিউর, ইউপেট-পার্কো, *হিপার,
*কালী-কা, *নাইট-এসি, *
*নক্স, * *রস, * *সিপি, * *
সিলি, সলফ, থুজা ।
বিশ্রামকালে :—ড্রস ।
অবশীর্ষাবস্থা হইতে উত্থানে :—
মার্ক-করো ।
গৃহের অভ্যস্তরে :—আর্স, ব্রাই ।
ধূমপানে :—কক ।

উষ্ণ চুল্লীর নিকটে :—এলম,
এপিস, চিন, নক্স, সিপি ।
স্পর্শকরিলে :—*একন ।
অনারৃত হইলে :—*একন, এগার,
*এম-মিউ, আর্গ, বেল, কার্কো-এ,
ক্যাম, ক্রিম, কোর-ক, *সাইক্রে,
মার্কিউরিয়াল, *নাইট-এসি,
নক্স-ম, * *নক্স, ট্রায়, *থুজা ।
কাপড় ছাড়িবার সময় :—ক্যামো ।
অনারৃত বায়ুতে বিচরণে :—এলম,
এম-কা, *আর্স, কষ্ট, ডেলিড,
চিন, কালী-ক্লোর, মার্ক, মার্ক-
করো, নাইট-এসি, * *নক্স,
পেট্রো, রস, ট্যাবাক ।
উষ্ণতায় :—এলম, এনাক; এপিস,
এন্ট, আর্স, বেল, ব্রাই, বোভ,
ক্যাম্ফ, কষ্ট, সিক, চিন, সিনা,
সিনাব, কক, ডলক, গ্রাট,
আইওড, *ইপি, ক্রিয়োজ, ল্যাঙ্ক,
ল্যাম, লরো, ম্যাথ-মিউর, মেনি,
মার্ক, মেজ, স্ফাট-মিউ, নক্স-ম,
নক্স, ফস, পলস, রিউম, রস,
* রুটা, সিপি, সিলি, ট্রাক, স্পঞ্জ ।
শীতলজলে স্নানে :—*আরেনিয়া ।
শীতল বাতাসে :—কিউর ।
আত্ম ধাতুতে :—কিউর ।

শীতাবস্থার পরে;—

পিত্তবমন :—* ইউপ-পার্কো, কালী-

কা, * ছাট-মিউ ।

হস্ত ও ষদনের স্নেহিততা :—লাইকো ।

বক্ষস্থলে বেদনা :—কালী-কা ।

কাসি :—সিম ।

চক্ষের আয়ুক্ততা :—সিড ।

চক্ষের পাতায় কণ্ঠ্যন :—সিড ।

মুখমণ্ডলের উত্তাপ :—ড্রস ।

পদের শীতলতা :—পেট্রো ।

হস্তাঙ্গুলীতে আকৃষ্টতা :—লাইকো ।

মস্তকের গুরুত্ব :—ড্রস ।

মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা :—

সিড, * ছাট-মিউ ।

মস্তকের পশ্চাৎভাগে বেদনা :—ড্রস ।

গাত্র-কণ্ঠ্যন :—পেট্রো ।

ওষ্ঠের শুষ্কতা :—কালী-বা ।

মুখের শুষ্কতা :—কালী বা ।

বিবিধি :—একন, * ইউপ-পার্কো ।

নাসাগ্রের শীতলতা :—সিড ।

বেদনা :—কালী-কা ।

অস্থিরতা :—এপিস, ক্যান্ধ ।

কম্প :—লাইকো, সিপি ।

চর্ম-কণ্ঠ্যন :—পেট্রো ।

নিদ্রা :—* এপিস, আর্স, ক্যান্ধ, লা-

ইকো, মেজ, নগ্ন-ন, * নক্স, স্তাবিন ।

যন্ত্র :—* ক্যান্স, * কষ্ট, ডিজি, কালী-

কা, * * লাইকো, রস, * থুজা ।

পিপাসা :—আর্স, * ব্যারাই-কা, *

চিন, * সিম, ড্রস. হিপ, কালী-বা,

ক্রিয়োজ, ম্যাগ-সল, ছাট-কা,

পলস, * সাবান্ড, থুজা ।

শীতপিত্ত :—এপিস ।

বমন :—* ইউপ পার্কো, কালী-কা,

* লাইকো, * ছাট মিউ ।

বমন. পিত্ত :—* ইউপ-পার্কো, কা-

লী-কা, * ছাট-মিউ ।

বমন, অগ্নি :—* লাইকো ।

দুর্বলতা :—* আর্স, লাইকো ।

শ্রান্তি :—সিম, লাইকো ।

মণিবন্ধে আকৃষ্টতা :—লাইকো ।

উত্তাপাবস্থার অভাব ।

এম-মিউ, * আরেগিয়া, * বোভ,

ক্যান্ধ, * ক্যান্স, * কষ্ট, সিম, কক,

* হিপ, * লাইকো, মাগ্নে-কা, মেজ,

কস-এসি, রস, * স্তাবান্ড, * * টাক,

** সলফ, * থুজা, * ভিরাট ।

উত্তাপ ।

** একন, ইথু, এগাথ, এলটোপ,

এলম, এথ্রা, এম-মিউ, এনাক, এন্স,

এন্ট, ** এন্ট-টার্ট, * এপিস, আরেগিয়া

* আর্শ, * আর্স, এনাফ, ব্যান্ট, *
 ব্যারাই-কা, ** বেগ, বেজ, বোর,
 বোড, * ব্রাই, ** ক্যান্ট, ক্যান্ড,
 ক্যানাড, ক্যান্ফ, ক্যান্ধ, * ক্যান্ধ,
 * ক্যান্স, কার্শো-এ, কার্শো-ভে,
 কষ্ট, * সিড, * কামো, * চেলিড, *
 চিন, ** চিন-সল, সিক, সিম, সিনা,
 * কক, * কফ, কোন, করণ, ক্রোক,
 কুপ, * কিউর, সাইক্রে, ডিজি, ডোস,
 * ডলকা, ইলাটি, * ইলাপ্স, * ইউপ-
 পার্কো, ইউপ-পাপু, * ইউফর, * ফের,
 জেলস, * গ্রাফ, গম-গট, * হেলি, *
 হিপ, * হাইওস, * ইয়ে, * আইওড.
 * * ইন্সি কালী-বা. কালী-কা, * *
 কালী-আইওড, ল্যাক, লাকনান. *
 লক্সো, * লেড, লোব, * * লাইকো,
 মার, * ম্যাথ-কা, ম্যাথ-সল, মেনি, *
 মারকিউরিয়াল, * * মেজ, * মার্ক,
 * মক্স, * মিউর-এসি, নিক, ** স্ফাট-
 মিউ, * নাইট-এসি, * নক্স-ম, ** নক্স,
 * ওপি, পার, পেট্রোফস, * ফস-এসি,
 প্লাট, পডো, পলিপ, সোর, * পলস,
 রোড, ** রস, রোব, স্তাবাড, * স্ফা-
 বিন, * স্ফা, * সারাক, * সিল, **
 সিকেল, * সিপি, * সিলি, * ষ্টাণ, * ষ্টাফ,
 * ট্রাম, সলক, টারাক্স, থুজা, ভেলের,
 ডিরাট।

উদ্ভাপের পূর্বে, —

কাস :—কাক।

বিবমিষা :—ট্রাম।

তিক্তাহাদ :—হিপার।

পিপাসা :—চিন, * ইউপ-পার্কো,

স্ফাট-মিউ, পলস, * স্তাবাড।

বমন :—* লাইকো, ট্রামো। (শীতের
 পরে দ্রষ্টব্য)।

বমন, অন্ন :—* লাইকো।

জ্বরণ :—কাক।

উদ্ভাপের প্রকৃতি, সময়, ও
 অবস্থান।

উদরে :—* ক্যান্ট। (পরবর্তী পরি-
 ক্ষেপ দ্রষ্টব্য)।

অপরাহ্নে :—* এনাফ, আর্স, বার্ক,

ব্রাই, ক্যান্ধ, চিন, কোপ, * ইউপ-

পার্কো, গ্রাফ, * ফের, * ইয়ে,

কালী-বা. ল্যাক, লাইকো, * স্ফাট-

মিউ, স্ফাট-সল, পলস, সারাক,

* সিলি, স্পিজি, ষ্টাণ।

অপরাহ্নে, শীতশূণ্য :—* এনাফ।

সর্বশরীরে প্রতিপন্ন মিনিট অ-
 স্তর :—এছ।।

অগ্রগামী :—* নক্স।

উর্দ্ধগামী :—এলম, এম, * সিনা,

হাইওস, * জাট মিউ, * কস * *

মিপি, * তিরাট।

পৃষ্ঠে :—কিউর, ডলকা, হাইওস,

মেনি, কস।

শয্যায় :—আর্জ, হেল, কালী-কা,

ম্যাথ-মিউ, ম্যাথ-সল, সলফ-এসি

শয্যায় না থাকা কালীন শীতানু-

ভব :—মার্ক। [রস।

শরীরের বামপাশে :—* * মেজ,

বামপাশে উত্তাপ, দক্ষিণ পাশে

উষ্ণতা :—রস। [পলস।

দক্ষিণ পাশে :—* এলম, মেনি, *

উর্দ্ধাংশ :—এনাক, * পলস।

সমগ্র শরীরে :—* ক্যান্ড, ইপি, *

ইথে, কালী-কা, লেড, মেনি, *

নাইট-এসি, * নক্স, * ওপি, পেট্রো,

সামু।

বুকের উপর :—* এপিস, * সিক।

জ্বালা :—* একন, * এপিস, আর্গ,

এন্ট-টার্ট, * আর্স, ব্যারা-কা, *

বেল, ব্রাই, ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্ক, ক্যান্স,

* ক্যাম, চেলিড, কিউর, *

ডলক, * ইলাপ্স, হেল, * হিপ, *

হাইওস, ল্যাক, লরো, লেড, লাই

কো, মারকিউরিয়াল, মার্ক, * মা-

য়ে-কা, মক্স, নক্স, * ওপি, কস,

* * পলস, জাবিন, জারাক, *

সিল, সিকেল, টাফ, টান।

জ্বালা, রোগীর অনুভূত হয় না :

—ক্যাঙ্ক।

জ্বালা, বাহ্যিক আরক্ততা ব্যতীত

:—হাইওস।

শীতশীত অনুভব, শীত, ও শীতলতা

সংযুক্ত উদ্ভাপ।

উত্তাপে শীত শীত অনুভব :—*

এপিস, * আর্গ, * কই, কিউব, *

ইলাপ্স, কালী-বা, * কালী-কা,

কালী-আইওড, ল্যাক, * কনা, *

মার্ক, * নক্স, পেট্রো, কস, * পডো,

পলস, * রস, জাবাদ, জাবিন,

সিকেল, মিলি, সলফ।

একবার শীতানুভব একবার উত্তাপ,

কিন্তু স্পর্শে উত্তাপ অনুভূত

হয় না :—মার্ক।

শীতানুভব, দিবাভাগে :—ড্রস।

শীতানুভব, শয্যাবস্ত্রের বাহিরে

হাত রাখিলে :—আর্গ, * ব্যারাই-

কা, * * নক্স, ট্রাম।

শীত সঙ্কপ্ত :—* * সিকেল।

শীতলতা, মুখমণ্ডল ও মস্তক

ব্যতীত :—বেল, ওপি, ট্রাম।

শীতলতা বাহ্যিক, উত্তাপ আভ্য-

ন্তরিক :—বেল, আইওড, ফস ।

শীতলতা, স্পর্শে সর্বত্র শরীরে :—

* কার্বো, * ফের ।

দিবসে পর্যায়ক্রমে :—সিলি ।

উত্তাপ, শুষ্ক (মস্তৃশূন্য) :—একন, *

এপিস, আর্গ, * আস, এরম-ট্রিফ, ব্যারাকা, ব্যারা-মিউ, * বেল, * ব্রাই-ক্যাট্ট, * সিড, কক, কফ, কলোস, কোন, * ডলক, কের, গ্রাফ, হেল, * হিপ, হাইওস, নাইট, নাইট-এসি, স্কাট-সল, * নক্স, ওপি, * ফস, ফস-এসি, * পলস, রস, * সারাক, সিল, সিকেল, সিপি, ট্রান ।

শুক, আবৃত অঙ্গে :—থুজা ।

সন্ধাকালে :—এম, এলম, এম্বা,

এস, আরেণ, * বার্ক, কার্বো, * চায়না, ড্রস, কের, হেল, * হিপার, হিপো, হাইওস, ল্যাক, লাইকো, ম্যাথ-কা, মার্ক, মক, মিউর-এসি, নিক, ওল-এন, ফস, ফস-এসি, * মোর, রাণ, সাক, সাস, ** সিলি, সলফ, * থুজা ।

বদনের উপর :—* একন, এম্বা, *

ক্যাট্ট, সিনা, ড্রস, * লাইকো, ট্রান । (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

উত্তাপাবেশ থাকিয়া থাকিয়া :—

এম, এম্বা, এম-মিউ, আর্গ, ব্যারা-কা, বিসমথ, বোরাক্স, * ক্যাট্ট, ক্যাক, কার্বো-এ, কার্বো-ডে, চেলিড, চিন, চিন-সল, কক, কফ, কলোস, ক্রোক, কুপ, ডিজি, * ইলাস, গ্রাক, গম-পট, হিপ, ইয়ে আইওড, * কালী-বা, ** কালী-কা, * কালী-আইওড, ক্রিয়োক, ল্যাক.লাইকো, * মেনি, ম্যাথ-কা, স্কাট-কা, স্কাট-মিউ, ** নাইট-এসি, নক্স-জুগ, নক্স, ওলিয়াও, * পেটো, ফস, পলস, কমেস, কুটা, স্কাভাড, সাবি, সেনেগ, * সিপি, সিলি, স্পজ, ট্রান, সলফ-এসি, * সলফ, টিউক, থুজা, ভেলের ।

উত্তাপাবেশ, ঘর্ষে পরিসমাপ্ত :—

এম-মিউ ।

উত্তাপ, পূর্ববাহে :—বার্ক, কালী-কা,

স্কাট-মিউ, নক্স, রস, সাস, থুজা ।

প্রধানতঃ মস্তৃকে :—সিনা, কিউর,

ড্রস, মার্ক, সাভাড । (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।

উত্তপ্তজলের ন্যায় অনুভব, বন্ধ :

স্থলে, বাহতে, জজ্বায়, ও কর্ণে :—সিকিউ ।

উত্তপ্তজলের ঝাপটার ন্যায় অনু-

ভব :—পলস, রস, সিপি ।

উত্তাপ, তীব্র :—* একন, * একট-টাই,

* আর্গ, আর্স, * হেল, ব্রাই,
ক্যাট্ট, ক্যাঙ্ক, ক্যাপ, * চিন-সল,
জিঞ্জি, ইউজেন, হিপ, কালী-আইওড,
লাইকো, ম্যাথ-কা, মার্কিউরি-
রাল, ** মেজ, ** ভাট-মিউ,
নক্স-স, * নক্স, পলস, ** রস, *
সিকেল, সিলি, ষ্টাফ, ট্রাম।

উত্তাপ, আভ্যন্তরিক :—* একন,
* আর্গ, আর্স, * বেল, * ব্রাই,
ক্যাঙ্ক, ক্যাপ, ক্যাম, চেলিড, চিন,
সিক, কোন, ফেরি মিউর, হেল,
আইওড, * কালী-কা, * ম্যাথ-
কা, নাইট-এসি, নক্স, কস, * কস-
এসি, পলস, * রস, * সাবাড,
সিকেল, সিলি, স্পিজি, ষ্টান,
ভিরাট, দিক।

উত্তাপ, দীর্ঘস্থায়ী :—* এন্ট-টার্ট, *
ক্যাট্ট, * হিপ, * সিকেল, * সিলি।

উত্তাপ, দুই প্রহর রাত্রির সময় :—
রস, * ট্রাম।

উত্তাপ, দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে :—
এন্ট, ইউজেন।

উত্তাপ, প্রান্তে :—* আর্গ, বোরাল,
টউকর, কালী-কা, ম্যাথ-কা, নক্স,
রস, * সলফ, খুজা।

উত্তাপ, প্রান্তের প্রাকালে :—* কট।

উত্তাপ, রাত্রিতে :—এলস, এন্ট, আর্স,
ক্যাম-কা, বার্ক, ব্রাই, * ক্যাঙ্ক,

কার্কো-এ, কার্কো-ভে, কট্ট, সিউ,
ক্যাম, সিক, সিনা, কক, কফ,
কিউর, * ড্রস, ডলক, গ্রাক, *
হিপ, কালী-বা, ল্যাক, লরো, *
ম্যাথ-কা, ম্যাথ মিউ, ম্যাথ-সল,
মার্ক, সিক, নাইট, ভাট-মিউ,
নাইট-এসি, * পেট্রো, ** কস,
কস-এসি, পলিগ, গোর, **
পলস, রাণ-বল, রোড, বস, ভাবিন,
* সারাক, ** সিলি, ষ্টাফ, ট্রাম,
ট্রাম, সলফ, খুজা, ভাইগুয়াট্রি।

উত্তাপ, মধ্যাহ্নে :—ট্রাম। ট্রাম।

উত্তাপ, মধ্যাহ্নে, ও মধ্যরাত্রে :—

উত্তাপ, রুগ্মস্থানে :—* আর্গ, ব্রাই,
সলফ।

উত্তাপ, আবৃতস্থানে :—খুজা।

উত্তাপ, আভ্যন্তরিক স্থানের ভিত-
রে জ্বালা, বাহিরে শীতানু-
ভব :—বেজ।

উত্তাপ, একই সময়ে একাঙ্গে
উত্তাপ ও অনাগ্নে শীত :—
চিন।

উত্তাপস্থল স্পর্শে শীতল :—আর্গ।

উত্তাপের প্রাবল্য :—বেল, ক্যাট্ট,
* ইপি।

(দীর্ঘ স্থায়ী ব্রহ্মক)।

উত্তাপ, কম্পাসহ :—একন, এনাক,
এন্ট-টার্ট, * এলিস, * আর্গ, বোড,

উদ্ভাপের প্রকৃতি, সময়, ও অবস্থান ।

- ক্যাক, * কষ্ট, ক্যাম, চিন, কার্কো-
ভে, * কিউর, সাইক্রে, * ইলাপ্স,
ইউপ-পার্কো, জেলস, ইয়ে, হিপ,
ল্যাক, সেনি, **নক্স, পেট্রে, ফস-
এসি, পডো, রস, সাবাড, *সলফ ।
- কম্প ও উদ্ভাপ পর্যায়ক্রমে :—
বোভ, কষ্ট, চিন, সাইক্রে, *
ইলাপ্স, হিপ, ল্যাক, মার্ক, ফস-
এসি, সাবাড । [নক্স ।
- কম্প, পান্নে :—ইউপ-পার্কো, * *
কম্প, নড়িলে চড়িলে :—এপিস,
*আর্গ, **নক্স, পডো, ট্রাম ।
- কম্প, উদ্ভাপ মিশ্রিত :—একন,
এনক্স, এণ্ট-টার্ট, এপিস, ক্যাক,
*কষ্ট, ক্যাম, পেট্রা, পডো, বস ।
- কম্প অনাবৃত হইলে :—*আর্গ,
এপিস, ব্যাবা-কা, **নক্স ।
- উদ্ভাপ, অল্পকাল স্থায়ী :—*এণ্ট-
টার্ট, আরেগিয়া, নাইট-এসি ।
- উদ্ভাপ, যৎসামান্য :—লোব,
লাইকো, নক্স-ম । [হাইওস ।
- উদ্ভাপ, পৃষ্ঠবংশের উপরদিয়া :—
উদ্ভাপ, ঘর্ম্মসহ :—*এলম, এম-
মিউ, এণ্ট, ক্যাম্ফ, ক্যাম্প, সিড,
**কোন, ইউপ-পার্কো, ইপি, কানী-
আইওড, ম্যাগ্নে কা, *ওপি, ফস,
পডো, সোর, পলস, *রস, *সাবাড,
*সিপি, ষ্টাফ, ট্রাম, তিরাত ।
- উদ্ভাপ, মস্তক ব্যতীত :—এক ।
- উদ্ভাপ, রাত্রি তিনটার সময় :—
এক । [সিপি ।
- উদ্ভাপ, রাত্রি চারিটার সময় :—
উদ্ভাপ, পূর্বাহ্ন নয়টার সময় :—
কালী-কা ।
- উদ্ভাপ, পূর্বাহ্ন দশটার সময় :—
শাট-মিউ, *বস, খুজা ।
- উদ্ভাপ, পূর্বাহ্ন এগারটার সময়
:—শাট-মিউ, খুজা ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন দুইটার সময় :—
**পলস ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন দুইটা ও তিনটার
মধ্যে :—কিউব ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন তিনটার সময় :—
কিউর, লাইকো, নিক ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন চারিটার সময়
:—*এনাক, গ্রাফ, কালী-বা ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন পাঁচটার সময়
:—কালী-বা, কালী-কা, পেট্রা ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন ছয়টার সময় :—
কষ্ট, নক্স, পেট্রো ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন ছয়টা হইতে রাত্রি
দুই প্রহর পর্যন্ত :—ল্যাক ।
- উদ্ভাপ, অপরাহ্ন সাতটার সময় :—
নক্স ।

উত্তাপ কালীন লক্ষণ ।

উত্তাপ, রাত্রি ১২টা ও ৩টার
মধ্যে :—কালী-কা ।

—————

উত্তাপকালীন লক্ষণ ।

উদরের শীতলতা :—জিহ্বা ।

উদরের উত্তাপ :—এপিস, * ক্যাঙ্ক,
ক্যাঙ্ক, চিন, * সিক, ফির, ল্যাক,
সেলেন, স্পিজি ।

উদরের স্ফীততা :—আর্স ।

উদরের বেদনা :—আর্স, ক্যাম্প,
কার্কো-ভে, সিনা, ইলাট, ইমে,
নক্স, * রস ।

উদরের স্পন্দন :—কালী-কা ।

শীতল বায়ুতে অনুভবাত্মক :—
* ব্যারা-কা, ক্যাম্প, * কক ।

উষ্ণবায়ুতে অনুভবাত্মক :—* কক ।

বোধহয় যেন নিশ্বাসগ্রহণার্থ বায়ু
নাই :—প্লাট-মেজ ।

অুখাহীনতা :—চিন, ল্যাক ।

আতাদিতক্ষণে স্পৃহা :—এণ্ট-টার্ট ।

বাহ্যর শীতলতা :—কালী-কা ।

বাহ্যর শিরার প্রসারিততা :—চিন-
সল ।

পৃষ্ঠে,কটিদেশে উত্তাপ :—সারাক ।

পৃষ্ঠে ও নিতম্বেজ্বালা :—ক্যালমিয়া ।

পৃষ্ঠে বেদনা :—এলটোন,আর্গ,আর্স,
ক্যাম্প, কার্কো ভে, চিন-সল, *

ইউপ-পার্কো, হাইওস, ইমে,
কালী-কা, ল্যাক, লরো, লাইকো,
জাট-মিউ, ** নক্স, পলস, রস ।

বিয়ারনামক আসবপানের ইচ্ছা :—
নক্স ।

মূত্রাশয়ে বেদনা :—ক্যাঙ্ক ।

রক্তে উত্তপ্ততা অনুভব :—*আর্গ,*
বেল, ** রস ।

রক্তবহা নাড়ীর প্রসারিততা :—
*বেল, ক্যাম্প, চিন,পলস,চিন-সল ।

শরীরের আরক্ততা :—ক্যাঙ্ক ।

অস্থিতে বেদনা :—আর্স, * ইউপ-
পার্কো, ইমে,ম্যাগ-কা, জাট-মিউ,
পলস । [পলস ।

শ্বাস, ব্যাকুলিত ও দ্রুত :—একন,
শ্বাস,গভীর :—ল্যাক । [সিলি

শ্বাস, হ্রাস :—ক্যাঙ্ক,সিনা,কোন, *

শ্বাস, আশ্বাসিত :—এপিস, আর্স,
বোভ,ক্যাঙ্ক,কার্কো,*সিম,ইলাপ্স,
* ইপি, * কালী-কা ।

ঘৃষ্টবৎ অনুভব :—* আর্গ ।

একগালের উত্তাপ ও আরক্ততা :

—* ইমে, * ইপি, পলস ।

বাম গালে আরক্তচিহ্ন :—লাইকো

গালের জ্বালা ও মলিন আরক্ততা
:—চেজিড, মারকিউরিয়াল ।

গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা :

—কার্কো-এ, চেলিড, * সিনা, *
কক, ডিজি, *ইউপ-পার্কো, ফেরি,
কালী-কা, ল্যাক, লাইকো, *
মেনি, মার্ক, নক্স, রস, রোব, *
ভিরাট ।

গাল রোগীর নিকট আরক্ত ও
উত্তপ্ত অনুভব, কিন্তু বাস্তবিক
উষ্ণ নয় :—* চিন ।

এক গালের আরক্ততা ও অপর
গালের পাণ্ডুরতা :—একন,
ব্যার-কা, ** ক্যাম, কফ, *
ইপি, * পলস ।

বক্ষঃস্থলে জ্বালা :—এম-মিউ, *
এপিস, ক্যাম, পলস, সেনেগ,
সলফ ।

বক্ষঃস্থলে ভারবোধ :—একন, **
এপিস, আর্স, বার্ক, বোভ, কা-
র্কো-ভে, ইপি, কালী-কা, * ল্যাক,
মার্ক, প্লাণ্ট, পলস ।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—আর্স, ক্যাম্প,
কার্কো-ভে, চিন, সিনা, কালী-
কা, নক্স ।

বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ :—একন, *
ব্রাই, কালী-কা, নক্স ।

উদর-বেদনা :—ক্যাম্প, কার্কো, ই-
লাট, রস ।

প্রায় জ্বাঃশূলতা :—কফ-এসি ।

কোষ্ঠবদ্ধ :—চিন-সল, লাইকো, ক্রা-
ট-মিউ, নক্স ।

আক্ষেপ :—কিউর, হাইওস, * ট্রাম ।

আক্ষেপ, অপস্মারবৎ :—ট্রাম ।

কাস :—* একন, ব্রাই, ড্রস, ইউপ-
পার্কো, * ইপি, সলফ ।

কাস, বমনজনক :—ইপি ।

খল্লী :—কিউর ।

বধিরতা :—ল্যাকনান ।

প্রলাপ :—** আর্গ, আর্স, বেল,
বিউফো, কার্কো, চিন, * চিন-
সল, সিনা, কফ, জেলস, হিপ,
হাইপার, ইথে, ল্যাক, ল্যাকনা,
** ক্রাট মিউ, নাইট-এসি, নক্স,
ওপি, *পডো, *সোর, সাবাড,
শাক্স, মারাক, সিকেল, স্পঞ্জ, *
ট্রাম, ভিরাট ।

অতিসার :—* সিনা, কোন, ইলাট,
পলস, * রস থুজা ।

জলপানে বিতৃষ্ণা :—নক্স ।

জল অতিরিক্ত শীতল অনুভব :
—বেল । [লাইকো ।

শীতল জল পানাস্থে বিবমিষা :
জলপান, এক একবার অল্প অল্প
:—* আর্স, চিন, লাইকো ।

উষ্ণজল পানে প্রবৃত্তি :—সিড ।

শ্বাস-কষ্ট :—একন, এনাক, *এপিস,

*জাণ, অর্স, বোভ, ক্যাক্ট, ক্যাম্ফ,

কার্কো, সিম, ক্রোট, ইলাপ্স, ইথে,

ইপি, কালী-কা, লোব, লাইকো,

ফস, গলস, ক্রটা, সিপি ।

কর্ণের শীতলতা :—ইপি ।

কর্ণের উত্তাপ :—* ক্যাম্ফ, চিন,

ডিজি, ইলাপ্স, ল্যাক, লাইকো,

* মেনি ।

এক কর্ণের উত্তাপ :—* ইথে ।

কর্ণে গুণ্ উণ্ শব্দ :—নয় ।

কর্ণে বেদনা :—ক্যালাড ।

কর্ণের আরক্ততা :—ক্যাম্ফ, সিষ্ট,

ইলাপ্স ।

কর্ণে গর্জ্জনধ্বনি :—নয় ।

উদবোদ্ধি দেশে পূর্ণতা :—আরেনিয়া

অপস্মার :—** হাইওস, ট্রাম ।

জ্বায়বীয় উত্তেজনা :—*একন, কোন

শরীর শাখায় বেদনা :—ইলাট, *

ইউপ-পার্কো, * বোব ।

শরীর শাখায় স্পন্দন :—জেলস,

* ইথে বোব ।

চক্ষের পাতা মেলিতে পারা যায়

না :—* জেলস ।

চক্ষের পাতার উত্তাপ :—চেলিড ।

উপরেব চক্ষের পাতাব ক্ষীততা :

—এপিস, কালী-কা । [বাট ।

চক্ষের তাবা সঙ্কুচিত :—ওপি, ডি-

চক্ষের তাবা প্রসারিত :—*বেল ।

চক্ষু ঘর্ষণ :—সিন ।

চক্ষের দুর্বলতা :—কার্কো, *জাট-

মিউ, সিপি ।

মুখমণ্ডলে জ্বালা কিন্তু আবৃত্ততা

নয় :—প্লাট ।

মুখমণ্ডলে, শীতলতা :—এস, ইপি,

পলস, মিউম ।

মুখমণ্ডলে উত্তাপানুভব :—*থুজা ।

মুখমণ্ডলে, আহারান্তে উত্তাপানু-

ভব :—কষ্ট, ক্যাম ।

মুখমণ্ডল, উত্তপ্ত :—এনাক, পেল,

ক্যাক্ট, ক্যাম্ফ, ক্যাম্ফ, * কার্কো,

কষ্ট, ক্যাম, চেলিড, চিন, সিক, *

*সিনা, কক, * কফ, ডিজি, *

ইউপ-পার্কো, * জেলস, ইপি,

কালী-বা, কালী-কা, ল্যাক, লরো,

* লাইকো, * ম্যাথ-কা, মেনি,

মারকিউরিয়াল, মার্ক, নাইট-

এসি, ফস-এসি, ফস, প্লাট-মেজ,

* পলিপ, রস, স্রাবাড, স্রাবিন,

* স্রাব, * স্রাবাক, সিপি, সলক,

টার, * ভিরিট । (পূর্ববর্তী প-

রিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।

মুখমণ্ডল, পাণ্ডুর :—আর্স, ব্রাই,
ক্যাপ্স, সিনা, ক্রোক, * ইপি,
লাইকো, রস, রোব, সিপি ।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর উত্থানকালে :—
* একন ।

মুখমণ্ডল, আরক্ত :—একন, এলম,
এমন-মিউ, ব্যাবাই-মিউব, * বেল,
ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাক্স, ক্যাক্স,
ক্যাপ্স, * কার্কো, সিড, চেলিড,
* চিন, * চিন-সল, সিক, কক,
কফ, কেন, ক্রোক, সাইক্রে,
ডলক, ইলাপ্স, ইউফর, * ফেরি,
গ্রাট, হিপাব, হাইপার, * ইগে,
কাল্ট-আইওড, ক্রিয়োজ, * ল্যাকনা,
লাইকো, মাগে-কা, মাগে-সল,
মেনি, মার্ক, ত্রাট-মিউ, নক্স-ম,
নক্স, ওপি, * পেট্রো, * পলিপ,
* পলস, রস, স্রাবাড, সারাক,
* সিপি, ** সিলি, স্পিজি,
স্পঞ্জ, ট্রাম, * সলফ, টার, ভিরাট ।

মুখমণ্ডল, পর্যায়ক্রমে আরক্ত ও
পাণ্ডুর :—একন, বেল, বোভ,
ক্যাপ্স, ক্রোক, ইপি, নক্স, ওপি,
ফস, পলস । [*একন ।

মুখমণ্ডল, আরক্ত শয়নকালীন :—

মুখমণ্ডল, আরক্ত দক্ষিণপার্শ্বে
অধিক :—ল্যাকনা ।

মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা :—
* * সিলি, ল্যাক ।

মুখমণ্ডলের মেহগনিকাঠের স্থায়
মলিন আরক্ততা :—* ইউপ-
* পার্কো ।

মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম :—ডিজি, ডলক ।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম :—ডিজি ।

মুখমণ্ডল, স্ফীত :—এম-মিউ, আর্স,
বেল, ক্যাক্ট, চেলিড, সিনা, পলস ।

মুখমণ্ডল, পীতবর্ণ :—আর্স, সিনা,
ত্রাট-মিউ ।

মূর্ছা :—একন, এনাক, * আর্গ, বেল,
ক্যাক, কিউব, ইউপ-পার্কো, মার্ক,
ত্রাট মিউ, নক্স, ওপি, ফস ।

মূর্ছা, উত্থানকালে :—একন ।

পতনবৎ অনুভব :—* জেলস ।

ব্যঞ্জেচ্ছা :—কার্কো-ভে ।

ভয় :—*একন ।

পদের শীতলতা :—এনাক, এন্ট, *

আর্গ, বেল, ক্যালাড, ক্যাপ্স,
ক্রোক, ফের, গ্রাক, হাইড্রোসা-এসি,
ইগে, ইপি, কালী-কা, ল্যাক,
ল্যাক্ট, মেনি, নক্স, পেট্রো, ফস-
এসি, পলস, স্রাবাড, স্রাবিন,
* স্রাবু, ** ট্রাম, সলফ ।

পদের উত্তপ্ততা :—* লেড, মার-
কিউরিয়াল, নক্স, প্লান্ট, পলিপ,
সারাক, টাক ।

পদে বেদনা :—নয় ।

পদতলে ছালা :—ক্যাঙ্ক, * ফের,

গ্রাফ, ল্যাক, ** সলফ ।

পদে ঘর্ষ :—ষ্টাফ ।

হস্তাঙ্গুলীর উত্তাপ :—লাইকো ।

হস্তাঙ্গুলীতে বেদনা :—ইলাট ।

আহারে অপ্রবৃত্তি :—চিন । [কস ।

শীতল আহাৰ্য্যের আকাজকা :—

কপালের শীতলতা :—চিন,

দিনা, পলস । [ট্রাম ।

কপালের উত্তপ্ততা :—চেলিড,

কপালে ঘর্ষ :—এন্ট-টার্ট, ইপি, ম্যাগ-

সল, সাস, ষ্টাফ, * ভিরাট ।

গল-রোধ :—সিম ।

গ্রোবার গ্রন্থির স্ফীততা ও আর-
ক্ততা :—সিষ্ট ।

হস্তের শীতলতা :—* আর্গ, ক্যাঙ্ক

ক্যাপ, ইউফর, ইপি, নাইট-এসি,

পলস, জাবিন, * থুজা ।

হস্তের উত্তপ্ততা :—এগার, বেল,

চেলিড, কিউর, ডিজি, গ্রাফ,

কালী-বা, ল্যাক, * লেড, ম্যাগ-

কা, মারকিউরিয়াল, * নাইট-

এসি, নক্স-ম, * নক্স, পেট্রো, কস,

প্লাস্টি, ** পলস, রাণ, কস,

সাবাড, টান, ষ্টাফ, ** সলফ ।

এক হস্তের উত্তাপ; অপর হস্তের

শীতলতা :—চিন, কক, *

ডিজি, পলস ।

পর্যায়ক্রমে এক হস্তের শীতলতা

ও অপরহস্তের উত্তপ্ততা :—কক ।

হস্তের গুরুত্ব :—আরেগিরা ।

হস্তের তালুকার উত্তপ্ততা :—এনাক,

ক্যাঙ্ক, * ফের, ল্যাক, লাইকো,

মার্ক, * পলিপ, * সলফ ।

হস্তে বেদনা :—নয় ।

হস্তে শীতল ঘর্ষ :—নাইট-এসি ।

হস্তে ঘর্ষ :—ব্যারা-কা, হিপ, নাইট-
এসি, প্লাস্টি ।

হস্তের শিরা প্রসারিত :—* বেল,

* চিন, * হাইওস, * লেড ।

শয্যা কঠিন অনুভব :—আর্গ ।

মস্তকের শীতলতা :—বেল ।

মস্তকের উত্তপ্ততা :—* বেল, ক্যাঙ্ক,

* ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্ক, কার্কে-এ, কষ্ট,

চেলিড, কিউর, ডিজি, ইউপপার্কো,

ফির, জেলস, ইপি, কালী-আই-

ওড, লাইকো, * ম্যাগ্নি-কা, মার-

কিউরিয়াল, * পেট্রো, কস-এসি,

প্লাস্টি, রোব, রস, জাবাড, সাস,

সিলি, ষ্টাফ, ট্রাম, ভিরাট ।

মস্তকে ছুরি দিয়া কর্তনবৎ হাতনা

:—* ক্যাঙ্ক ।

মস্তকে ঘর্ম্ম :—ম্যাগি-কা ।

মস্তক-বেদনা (শিরঃপীড়া) :—

একন, এগার, এলষ্টোন, * এঙ্গ,
* আর্গ, আর্স, * বেল, বার্ক,
বোর, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাক, ক্যাম্প,
* কার্কো তেজি, * চিন, চিন-সল,
সিনা, কলোস, ক্রোটন, ড্রুস,
ডলক, ইলাট, * ইউপ-পার্কো,
গ্রাফ, * হিপ, হিগ, * ইয়ে, কালী-
বা, কালী-কা, ল্যাক, লোব,
** ভ্রাট-মিউ, নক্স, ওপি, প্লাট,
* পডো, পলস, রোব, * রস,
কুটা, স্তাবাড, সিপি, ** সিলি,
সলফ, ভেলার ।

মস্তক-বেদনা, একপার্শ্বিক :—* থুজা

মস্তক বেদনা, শব্দদ্বয়ে সূচী-বেধ :

—** নক্স, পলস । [—চিন-সল ।

মস্তক-বেদনা, পিপাসায় উপশমিত

জ্বঃকম্পু :—একন, * ব্যায়া-কা,

ক্যাক, মার্ক, মাস, সিপি, সলফ ।

কুচকিতে স্থালা :—কিউর ।

কুচকিতে বেদনা :—* রস ।

দ্রবভজ :—হিপ । [ফস ।

জ্বঃ :—* চিন, * সিনা, কিউর, **

বরফ সেবনের আকাঙ্ক্ষা :—ফস ।

উগ্রতা :—* ক্যাম, প্লাট ।

জামু, উত্তপ্ত :—ইয়ে ।

জামু, দুর্বল :—এনাক ।

প্রসববৎ বেদনা :—পলস ।

অশ্রুস্রাব :—ইউপ-পার্কো ।

এক জজ্বার বেদনা :—জেলস ।

জজ্বার শীতলতা :—যেক, * ট্রাম ।

জজ্বার উদ্ভাষ :—ক্যাম্প, কিউর,

* লেড, সারাক ।

জজ্বার অবশতা :—সিড । [সল

জজ্বার শীরার স্ফীততা :—চিন-

যেন শয়ন করিতে হইবে একপা-

অমুভন :—ভ্রাট-মিউ ।

আলোকে অমুভবাধিক্য :—বেল ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শীতলতা :—কার্কো

এ, সিপি, * ট্রাম ।

অঙ্গ-গৌরব :—আরোগিরা, ক্যাক ।

অঙ্গ-বেদনা :—আর্স, ব্রাই, ক্যাক,

ক্যাম্প, কার্কো, চিন, * ইউপপার্কো,

হিউপপার্কু, ল্যাক, লাইক, পলস

রস, সিকেল, সিপি, সলফ ।

অঙ্গ-স্পন্দ :—ওপি ।

ওষ্ঠ, স্থালা :—চিন ।

ওষ্ঠ, পরিশোষ :—রস ।

ওষ্ঠ, জ্বর-স্ফোট :—* হিপ, * ইয়ে,

** ভ্রাট-মিউ, ** নক্স, রস ।

ওষ্ঠ, লেহন, কিন্তু জলপান না

করণ :—* পলস ।

সন্ধুঃ দেশে বেদনা :—আর্স, চিন,

ইলাট, * নক্স। [কা।

কটিতে বেদনা :—ক্রোট, কালী-

বাবলুকতা :—* কার্সো, * ল্যাক,

* মেরম, ** পডো, টিউক।

দুগ্ধপানের আকাজক্ষা :—মার্ক।

কাতরাণ, (অক্ষুট কাতরোজি) :—

একন, ক্যাম, * ইউপ-পার্কো,

ল্যাক, * পলস। [পার্কো

কাতরাণ, নিদ্রাবস্থায় :—* ইউপ-

মুখেজ্বলা :—* পেট্রো।

মুখ-শোষ :—চিন, চিন-সল, নক্স-ম।

মুখের চারিদিকে জ্বর স্ফোট :—

* হিপ, * ইগে, ** ত্রাট-মিউ,

** নক্স, রস।

মুখ, বিকসিত :—* ওপি। [সিনা।

মুখের চারিদিকে পাণ্ডুরতা :—*

পেশী, স্পন্দন :—জেলস, ইগে, আ-

ইওড, ওপি।

নিবমিষা :—এনাক, এট-টাট, আ

রেণ-ডা, আর্স, বোবাক্স, ব্রাই, *

কার্সো, ক্যাম, কক, ড্রস, সাইস,

* ইলাট, * ইউপ-পার্কো, ইউপ-

পাপু, ফ্লোর-এসি, * ইপি, লা-

ইকো, * ত্রাট-মিউ, নাইট-এসি,

* নক্স, ওপি, ফস, ত্রাবাড, সিপি,

থুজা, ভিবাট।

ঘাড়ের বেদনা :—গ্রীফ।

শব্দে অমুভবাত্মিক্য :—* বেল, *

ক্যাপ, জেলস।

নাসিকা, শীতল :—ইগে।

নাসিকার প্রান্ত উত্তপ্ত :—* ক্যাপ,

চেলিড। [সিনা।

নাসিকার চারিদিক পাণ্ডুবর্ণ :—

নাসিকা খুঁটন :—* সিনা।

অবশতা :—সিড, সিপি, থুজা।

মস্তকের পশ্চাত্তাগে উত্তাপ :—

ক্যাম্ফ।

গলনলীতে চাপ :—* সাইস।

যে যে স্থানে ভর দেওয়া যায়

তাহাতে বেদনা :—ব্যান্ট।

শরীরে, স্পর্শে ব্যথিততা :—ম্যাক,

পলস, * ট্রাম।

শরীরে, অনারুত হইলে বেদনা :

—মার্ক, ট্রাম।

অনারুত হইলে বেদনার প্রাবল্য

:—* ট্রাম।

তালুকার উত্তাপ :—ডলক।

পক্ষাঘাত :—কিউর।

আলোকাতঙ্ক :—* হিপার।

অবস্থান পরিবর্তনের প্ররুতি :—

* আর্গ।

নাড়ী, পূর্ব :—একন, ক্যাম্ফ, সিড,

চিন-সল, নাইট-এসি । [নাইট-এসি
নাড়ী, অনিয়মিত :—* চিন,
নাড়ী, দ্রুত :—* একন, ক্যাপ্স, *
চিন, ডিজি, আইওড, রস ।
নাড়ী, মৃদু :—ফেরি-মিউর । [ওড ।
নাড়ী, দুর্বল :—এট-টার্ট, আই-
চকেরতারা, প্রসারিত :—* বেল,
সিনা, ইপি । [ব্রাই. জেলস ।
চুপ করিয়া থাকিবার ইচ্ছা :—
স্মরণ করিতে অসামর্থ্য :—আর্স,
* স্টাট-মিউ, ফস-এসি, সিপি ।
শ্বাস, দ্রুত :—প্লাট-মেজ ।
শ্বাস, নাকডাকা বিশিষ্ট :—কোন,
* ওপি, লরো, বোব ।
অস্থিরতা :—* একন, এম-কা, আর্গ,
* * আর্স, ব্যাপ্ট, ব্যাবা-কা, বেল,
ক্যাপ্স, * ক্যাম, চিন, সিনা,
* জেলস, হিপো, ইপি, ম্যাগ-মিউ,
প্লাট, * পলম, * * রস, * সিকেল ।
প্রভূত জলীয় লাল নিঃস্রব :—
* ড্রস । [নক্স ।
দক্ষিণ স্কন্ধাশ্রিত নিম্নে বেদনা :—
আমাশয়-গহ্বরে বেদনা :—ইউপ-
পার্কো ।
পাত্তবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলে কপ্স :—
আর্গ, এপিস, ব্যাবা-কা, * * নক্স ।
স্কন্ধদ্বয়েব মধ্যে বেদনা :—* রস ।

দীর্ঘ নিদ্রাস ত্যাগ :—ইমে, পলম ।
দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা :—স্টাট-মিউ,
পলম ।
হৃকের আর্দ্রতা :—ওপি ।
হৃকের পরিভুক্ততা :—* একন,
এপিস, আর্স, ব্যাবা-কা, হাইওস,
ইমে, আইওড, ইপি, পলিপ,
সিকেল । (পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।
হৃকের অবদরণ :—* সারাফ ।
হৃকের বিদারণ :—* সারাফ ।
হৃকের উত্তপ্ততা :—এপিস, আর্স,
ব্যাবা-কা, বেল, হাইওস, পলিপ ।
(পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।
হৃকের কণ্ঠ্যন :—এম-মিউ,
এপিস, * ইমে, * রস । [* রস ।
হৃকের কণ্ঠ্যন, ঘর্ষণে বিবন্ধিত :—
হৃকের কণ্টক বেধবৎ যাতনা :—
ফ্রোক, জেলস, নাইট-এসি, পলিপ ।
হৃকের হল বেধবৎ যাতনা :—
এম-মিউ, চিন ।
হৃকের আরক্ততা :—আর্স ।
নিদ্রা :—এপিস, * এট-টার্ট, ক্যাপ্স,
মিড, * চিন, * ইউপ-পার্কো, *
জেলস, ইমে, * ল্যাক, ল্যাকনা,
লরো, লাইকো, * * মেজ, *
স্টাট-মিউ, নক্স-ম, * ওপি, *
পডো, * বোব, রস, * স্যাঙ্ক, স্ট্রাম,

নিদ্রা, উত্তাপের চরমাবস্থায় :—

পড়ো।

নিদ্রা, গভীর ও নাক-ডাকবিশিষ্ট :—

কোন, ** ওপি, লনো, *রোব।

নিদ্রাকালে রূপ :—ইলাপ্স।

রাত্রি তিনটার পবে নিদ্রা বাইতে

অসমর্থতা :—এক্স।

নিদ্রাকালে চমকিত হইয়া উঠা :—

ক্যাম, * দিনা, কোন, জেলস,

বাইকো।

নিদ্রিত হইবাব প্রান্ত্রে চমকিত

হইয়া উঠা :—পলস।

নিদ্রালুতা :—এপিস, এসাফ, সিড,

চিন, * জেলস, হিপ, ইগে, লাইকো

ত্ৰাট-কা, নক্স-ন, ওপি, ফস, পলস,

বস, ট্রাগ, ভিনাট।

নিদ্রাহীনতা :—একন, আর্গ, এক্স,

আর্স, ব্যাবা-কা, কফ, কোন,

গ্রাফ, হাইওস, ত্ৰাট-কা, পলস,

বোড, ষ্টাফ। [কার্কো

গল-রোধামুভব :—** এপিস,

ইটিচি :—চিন-সল।

তন্দ্রালুতা :—এট-টাই, আর্গ, আর্স,

ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্ক, ডলক, জেলস,

ইগে, * ত্ৰাট-সিউ, নক্স-ন, ওপি,

ফস এগি, সিপি।

বাকের অসংলগ্নতা :—কিউর।

পৃষ্ঠবংশে প্রচাপনে বেদনা :—

* চিন-সল।

[* নক্স।

প্লীহা প্রদেশে বেদনা :—আর্স, কার্কো,

আমাশয়-গহ্বরে 'উত্তাপ' :—ল্যাক,

সাবাক।

আমাশয়ে বেদনা :—আর্স, কার্কো,

সিনা, কালী-কা, বস, সিকেল, সিপি।

মলত্রাব-বারংবার :—ল্যাক।

মল-বেগ :—ক্যাপ্স।

অঙ্গমর্দ :—ক্যাঙ্ক, চিন-সল, কিউর,

বস, জাবাড।

গলাধঃকরণে কষ্ট :—শিক, *সাইম।

ঘর্ম্ম :—এলম, এম-সিউ, এট, ক্যাম্ফ,

ক্যাপ্স, কোন, নাগ-কা, ষ্টাফ।

(পূর্ব পবিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

দন্তে দন্তে শব্দ :—সিড।

দন্ত বেদনা :—কার্কো।

বায়বীয় পবিবর্তনে অমুভবাধিক্য

:—* ব্যারা-কা।

পিপাসা :—* একন, এলষ্টোন, এস-

কা, এম-সিউ, এপিস, এক্স, *

আর্গ, **আর্স, ব্যারা-কা, *বেগ,

বোড, * ডাই, ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্ক,

ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্স, কার্কো, * সিড,

* ক্যান, চিন, * চিন-সল, *

সিনা, * কফ, কোন, ক্রোক,

কিউব, ইলাট, ইলাপ্স, ইউপ-

পার্কো * ইউপ-পার্পু, * হিপ,
হাইওস, ইপি, কালী-বা, ল্যাক,
লাইকো, * গ্যাথি কা, মার্ক, **
আট-মিউ, * নক্স, ফস প্রাণ্ট-মেজ,
* পডো, * মোর, * পলস, *
বোব, * বস, সাবাড, সাবাক,
* সিকেল, সিপি, * সিলি, ষ্টাফ,
ট্রাম, সলফ, * থুজা, ভে.লব,
ভিরাট ।

পিপাসা, একবারে অধিক জল
পানের ইচ্ছা:—*একন, বাবা-
কা, বেল, ** আট-মিউ ।

পিপাসা, একবারে অধিক জল
পানের ইচ্ছা ও তৃপ্তাবা উপ-
শমপ্রাপ্তি:—** আট মিউ ।

পিপাসা, অধিক:—একন এলষ্টোন,
* আর্গ, * আর্স, বেল, * ব্রাই,
ক্যাম, চিন, চিন সল, ইলাট, *
হিপ, হাইওস, ** আট-মিউ ।

পিপাসা, রক্ত:—ক্যাঙ্ক, সাবাড ।

পিপাসা, শরীর অনাবৃত করিলে
বৃদ্ধি:—বারা-কা ।

পিপাসা, কিন্তু পানান্তে বমন:—
এলষ্টোন, * আর্স ।

পিপাসা পরিশূন্যতা:—*এলস, *
এন্ট-টার্ট, * এপিস, বাবা-কা
বোভ, * ক্যাক, * ক্যাম্ফ, *

ক্যাম্প, কার্কো-এ, * কার্কো-
ভে, * কষ্ট, * চিন, * সাইম,
কক, ডিজি, * ডুম, * ফের,
ফেলস, হেল, * ইগে, ইপি,
কালী-কা, * গেড, মেনি, মিউর-
এসি, নক্স-ম, ওপি, ফস এসি,
পলস, রস, সাবু, সাবাড, **
সিপি, স্পিজি । [এসি, সিপি ।

গল-মধো, বেদনা:—ফস, ফস-
গল-মধো, গিলিবার সময় স্পার্শ-
দেয়:—বার্ক, ফস এসি ।

কণ্ঠনালীর পবিত্রতা:—পেট্রো ।

কম্পন:—আর্স, ক্যাক, মিষ্ট, ইউপ-
পার্কো, কালী-আইডে, গ্যাথি-
কা, সিপি ।

অচৈতন্য:—লবো, + আট-মিউ ।

অনাবৃত হইতে ইচ্ছা:—একন,
এপিস, আর্গ, * আর্স, বারা-কা,
ক্যাক, * চিন, * ইউপ-পার্কো,
ফেব, * হিপ, আইওস, * ল্যাক,
লাইকো, মিউর-এসি, ** আট-
মিউ, নাইট-এসি, * ওপি, *
পেট্রো, প্লাট, ** পলস, স্পিজি,
ষ্টাফ, ভিবাট ।

অনাবৃত হইতে অপ্রবৃত্তি:—*এ-
পিস, আর্স, অর, * বেল, ক্লিম,
কক, কলচ, কোন, হিপ, ইগে,

*ম্যাগ্নি-কা, মার্ক, নক্স-ম, **
 নক্স, ফস-এসি, পলস, রস, *
 স্কাট, * সিল, ** ট্রাম, * ট্রান।
 অনাবৃত্ত হইলে শীতানুভব :—
 আর্গ, * চিন, ** নক্স, পলস।
 (পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।
 মূত্র প্রকৃতি, জলপানান্তে :—সা-
 ইম, *ইউপ-পাপু।
 মূত্র-তাগ, বারংবার :—আর্জ,
 বেল, ক্রিয়োজ, লাইকো, মার্ক,
 ফস-এসি, রস, সিল, ষ্টাফ, ট্রাম।
 মূত্রে, ইন্সটকচূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ
 :—ফস।
 মূত্র, পাণ্ডু বর্ণ :—সিড, ক্যাম।
 মূত্র, লোহিত বর্ণ :—নক্স।
 মূত্র, প্রভূত :—এন্ট, আর্জ, সিড,
 *ক্যাম, ডলক, * ইউপ-পাপু,
 মিউর-এসি, *ফস, সিল, ট্রাম,
 মূত্র, বিলুপ্ত :—কাষ্ট।
 মূত্র, আবিল :—ফস।
 শীতপিত্ত :—এসি, * ইগে, *রস।
 শীতপিত্ত, ঘর্ম্মসহকারে অন্তহত :
 —* ইগে।
 জরায়ুপ্রদেশে বেদনা :—কাষ্ট।
 শিরায়, রক্ত জ্বালাকরা :—*আর্স,
 *হাইওস।

শিরায়, শীতল রক্ত প্রবাহিত
 হওয়া :—ভিগাট।
 শিরা, প্রসারিত :—এপার, *বেল,
 *ক্যাম * চিন, চিন-সল, ক্রোফ,
 সাইক্রে, ডিজি, * হাইওস, *
 লেড, *গারকিউরিয়াস, *পলস
 শিরোগূর্ণন :—আর্স, বেল, বার্ক,
 ব্রাই, * কার্কো-ভে, কক, জেলস,
 হিগ, ইগে, *ইপি, লরো, মার্ক,
 * স্কাট-মিউ, নক্স, ফস, পলস,
 *সিপি, *ট্রাম, ভেলের, ভিগাট।
 বমন :—এলষ্টোন, এন্ট, আর্স, ব্রাই,
 ক্যাস্ট, * ক্যাম, * সিনা, কোন,
 * ইলাট, * ইউপ-পার্কো, ইউপ-
 পাপু, ফেব, ইগে, *ইপি, ল্যাক,
 * লাইকো, * স্কাট-মিউ, নক্স,
 পলস, ট্রাম, থুজা।
 বমন, পিত্ত :—* ক্যাম, সিনা,
 *ইউপ পার্কো, *স্কাট-মিউ, থুজা।
 বমন, তিক্ত :—ইউপ-পার্কো।
 বমন, পানান্তে :—আর্স।
 বমন, শীতল দ্রব্য পানান্তে :—
 লাইকো।
 বমন, ফেগিল :—*ইলাট।
 বমন, ভুক্তদ্রব্য :—সিনা, * ইউপ-
 পার্কো, ফেব, ইগে, নক্স।

বমন, অন্ন :—* লাইকো ।

বমন, জল :—এলটোন ।

স্বর, ক্ষীণ :—হিয়ার ।

শয্যার উষ্ণতা অসহ্য :—* গেড ।

উষ্ণতা, বাহ্যিক অসহ্য :—এপিস,

** পলস ।

উষ্ণতা, বাহ্যিক সুখদ :—ইগ্রে ।

দুর্বলতা :—এনাক, * আর্গ, * আর্স,

ব্রাই, ক্যাক, * কার্কো, কিউর,

ইউপ-পার্কো, ইগ্রে, ইপি, লাইকো,

জাট-কা, * জাট-মিউ, নক্স-ম,

ফস, রোব, সারাক, সলফ ।

ক্রন্দন :—স্পঞ্জ ।

জ্বন্তণ :—ক্যাক, * চিন-সল, কিউর

কালি-কা * রস, সাবাড ।

উত্তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি ।

অনাবৃত বায়ুতে :—জাট-মিউ ।

শকটারোহণে :—নাইট-এসি ।

আহারান্তে :—এনাক, চিন, কিউর,

ফের ।

কৃত্রিম উত্তাপে :—কোর-ক ।

সঞ্চরণে :—* ক্যাপ্স, ফের ।

হাঁটিবার সময় :—ক্যাপ্স ।

উপবিষ্ট অবস্থায় :—নক্স ।

কথা বলিবার সময় :—ফের ।

অনাবৃত হইলে :—আর্স, বোত ।

উত্তাপের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি :—

অনাবৃত বায়ুতে :—কিউর, * নক্স ।

শয্যায় :—* মার্ক ।

শকটারোহণকালে :—গ্রাফ, * সোর ।

জলপানে :—ক্যাক, কক ।

আহারান্তে :—এম-কা, ব্রোম,

কষ্ট, কক, ফ্লোর-এসি, সিপি ।

সঞ্চার প্রাকালে :—ফের ।

গ্রামকালে :—এট, এণ্ট-টার্ট, * ক্যাম্ফ,

নক্স, অক্স-এসি, ব্রোম, * সিপি ।

দুইপ্রহর রাত্রির পরে :—* ড্রস ।

নড়িলে চড়িলে :—এলম, এণ্ট-টার্ট,

* ক্যাম্ফ, * চিন, কিউর, নক্স,

সিপি, ব্রোম ।

রাত্রিতে :—সিনা, কিউর, * সিপি ।

কার্যে নিবিষ্টকালে :—গুলিএণ্ড ।

উপবেশনকালে :—ফস, সিপি ।

নিদ্রাবস্থায় :—ডলক, পেট্রো, ভাই-

ওলা-ট্রিক ।

নিদ্রান্তে :—সিনা ।

ধূমপানে :—সিক, কক ।

অবশীর্ষ হইলে :—মার্ক-কর ।

বিরক্তির পর :—পেট্রো, সিপি ।

হাঁটিলে :—* ক্যাম্ফ, * চিন ।

উষ্ণতায় :—* এপিস, ব্রাই, *ইথে।

আদ্র দিনে :—কিউর।

উত্তাপান্তে :—

শীত :—চিন, মার্ক, নক্স, * পলস।

শীত শীত বোধ :—মেনি, মার্ক।

অবসন্নতা :—আর্স।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ :—সিলা।

মুখমণ্ডলের লোহিতবর্ণ, দক্ষিণপাশ্বে

আধিক্য :—ল্যাক।

শিবঃপীড়া :—আর্স, ক্যাক, *কার্কো

ক্ষুধা :—* সাইম, ডলক, * ইউপ-

পাপু, ইথে।

ক্ষুধা, রান্ধসবৎ :—সাইম।

নিদ্রা :—এপিস, * ইউপ-পার্কো।

নিদ্রা, নাকডাকসহ :—* ওপি।

পিপাসা :—এনাক, এম-মিউ, ক্যাক্টে,

* চিন, কফ, সাইক্রে, নক্স, ওপ,

পলস, ষ্টান, ট্রাম।

পিপাসাহীনতা :—ওপি।

বমন :—ক্যাক, * ইউপ পার্কো।

বমন, পৈত্তিক :—* ইউপ-পার্কো।

দুর্বলতা :—* আর্স, ডিজি।

ঘর্ণ পরিশৃঙ্খতা।

একন, এলম, এম-কা, এপিস, *

আবেগিয়া, আর্গ, * আর্স, * বেল,

বিসমথ, * বোভ, ব্রাই, ক্যাক, ক্যা-

নাব, ক্যাং, চিন, কফ, কলচ, ডলক,

* ইউপ-পার্কো, জেলস, * গ্রাফ, হা-

ইওস, আইওড, ইথে, ইপিক, কালী-

কা, কালী-বা, ল্যাক, লেড, * লা-

ইকো, ম্যাগ্নি কা, মার্ক, জাট-কা, না-

ইট-এসি, নক্স ম, নক্স, ওলিও, ওপি,

ফস, ফস-এসি, প্লাট, পলস, রস, সোর,

শ্রাবাড, সিলা, সিকেল, সিনেগা,

সিলি, স্পঞ্জ, সলফ, ষ্টাফ, টিউক,

ভার্ক, ভাইওল-ওড।

ঘর্ণ ।

* একন, ইথ, * এগার, এলষ্টোন,

এলস, * এম্বা, এম-মিউ, এনার্ক, এন,

এণ্ট, ** এণ্ট-টার্ট, এপিস, আর্গ,

আর্স, এসাফ, ব্যাপ্ট, ** বার্না-কা,

* বেল, ** বেঞ্জ, * বোভ, ** ব্রাই,

ক্যাক্টে, ক্যালাড, ** ক্যাক, * ক্যান্ধ,

ক্যাক, * ক্যান্ধ, ক্যাপ্স, ** কার্কো-

এ, * কার্কো-ভে, ** কষ্ট, ** মিড,

ক্যাম, চেলিড, ** চিন, ** চিন-সল,

সিক, সাইম, সিনা, কক, ক্রোক,

কফ, কোন, করণ ফ, কুপ, কিউর,

সাইক্রে, ** ডিজি, ডুস, ডলক, *

ইলাটি, * ইলাপ্স, ইউপ পার্কো, *

ইউপ-পাপু, ইউ-ফর, ইউপিয়ন, **

ফের, গ্যান্ধ, * জেলস, * গ্রাফ, গো-

রাজ, হেল, ** হিপার, * হাইওস,
* আইওড, ইগ্নে, ** ইপি, ** কালী-বা,
কালী-কা, কালী-আইওড, ** ল্যাক, ল্যা-
কনা, লরো, লেড, লোব, ** লাইকো,
সার, ** ম্যাগ্নি-কা, মেনি, ** মার্ক,
* মেজ, ত্রাট-কা, ** ত্রাট-মিউ, **
নাইট-এসি, নক্স-ম, ** নক্স, ** ওপি,
পাব, * পেট্রো, ** ফস-এসি, ** ফস,
প্লাণ্ট, * পডো, * পলিপ, ** সোর,
পলস, * রোব, রিউন, * রস, স্কা-
বড, আবিন, ** স্তাঙ্ক, * সারাক,
** সিকেল, সেলেন, ** সিপি, **
সিলি, স্পঞ্জ, টান, * টাফ, ট্রাগ, **
মলক, ** ট্যাভার, ** থুজা, * ভে-
লার, ** ডিরাটা ।

ঘর্ষের পূর্বে :—

খল্লী :—দিড ।

শিরঃপীড়া :—* ফেব ।

ক্লম্বা :—ষ্টাক ।

পিপাসা :—কফ, থুজা ।

ঘর্ষের প্রকৃতি ও সময় ।

তীব্র :—ক্যাপ্স, ক্যাপ, কোন, গ্রাফ,
আইওড, রস, টার ।

অপরাক্ষে :—বার্ক, ম্যাগ্নি-মিউ, ম্যাগ্নি-
সল, * ত্রাট-মিউ, * নক্স, সিলি, টাফ ।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধে গতি :—আর্গ,
বেল । [সিপি ।

জাগ্রত সময়ে প্রভূত :—আবু,

শয্যায় :—* এলম, এক্স । [ল্যাক ।

শয্যা হইতে উঠিবার সময় :—

রক্তাক্ত :—ক্যাক, ক্রিম, ক্রোটাল,

* কিউর, ল্যাক, লাইকো,

নক্স-ম, নক্স ।

শীতান্তে :—এন্ট, কষ্ট । [ক্যাপ্স ।

শীতান্তে, পূর্ববর্তী উদ্ভাপন, তীতঃ

শীত ও ঘর্ষ পর্য্যায়ক্রমে :—এন্ট,

* নক্স ।

শীত ও ঘর্ষ যুগপৎ :—এন্ট ।

শীত শীত অনুভব সহ :—এন্ট, ব্রাই

* ইউপ-পার্কো, ইউপ পার্শু, ত্রাট-

মিউ, ** নক্স, পেট্রো, ফস ।

শীতানুভব সহ, স্নান জন্য :—

* আর্গ ।

শীতানুভব সহ, সঞ্চরণে বা গায়

বাতাস লাগাইলে :—ইউপ-

পার্কো, ** নক্স ।

শীতলতা সহ, নড়িলে চড়িলে :—

ইউপ-পার্কো, ** নক্স ।

শীতলতা সহ, অনাবৃত হইলে :—

ইউপ-পার্কো, ** নক্স ।

আঠা আঠা :—একন, এনাক, এন্ট-

টার্ট, আর্গ, ** আর্স, ক্যাক,

ক্যান্স, ক্যান, কুপ, ডাফ, ডিজি,
ইলাট, * ফের, ফোর-এসি, হেল,
হিপ, আইওড, জ্যাট্র, ল্যাক, *
লাইকো, লিউ-পুলস, মার্ক, মক,
নক্স, ওপি, অক্স-এসি, কস-এসি,
* কস, * ভিরাট ।

শীতল :—এনাক, * এণ্ট-টার্ট, আণ,
** আস, ব্যারা-কা, ব্রাই, ক্যালাদ,
* ক্যান্স, ক্যানাব, ক্যান্স, ক্যান্স,
চিন, * সিনা, কক, কুপ, * কিউর,
ডিজি, ডলক, ড্রস, ইলাপ্স, জেলস,
* হিপ, হাইওস, আইওড, * ইপি,
জ্যাট্র, ক্যালমিয়া, ল্যাক, ল্যাকনা,
* লাইকো, মার্ক, মার্ক-কনো,
মেজ, থাট কা, থাট-গিউ, নকস,
ওপি, অক্স-এসি, প্লাণ্ট, পডো,
পলস, রিউম, কটা, সিকেল, *
সিপি, সিলি, স্পিজি, ষ্টান, * ষ্টাম,
ষ্টাক, সলফ-এসি, থুজা, * ভিরাট ।

দিবাভাগে :—এগাব, এম্বা, এম-
মিউ, এনাক, * এণ্ট-টার্ট, বেল,
ব্রাই, * ক্যান্স, * কার্কো-এ, * চিন,
* কোন, * ডলক, * ফের, *
আফ, গোয়াজ, * হিপ, কালী-
কা, ল্যাক, লরো, লেড, * লাইকো,
থাট-কা, * থাট-মিউ, * ন ইট-
এসি, ফস-এসি, পলস, * রিউম,
* সেলেন, * সিপি, সিলি, * ষ্টাফ,

* ষ্টাম, সলফ, সলফ-এসি,
ভিরাট, জিক ।

দৌর্বল্যজনক নহে :—* রস, * শাধু
একবার ঘর্ম একবার শুকতা :—
এপিস, থাট-কা । (উত্তাপ সহ
দ্রষ্টব্য) ।

সন্ধ্যাকালে :—* ব্যারা-কা, মিউর-
এসি, * শাধু, সলফ ।

একদিন পর একদিন সন্ধ্যাকালে
:—* ব্যাবা-কা । [নক্স ।

মুখ মণ্ডলে শীতল ঘর্ম :—কক,
ঘর্ম পায়ে আরম্ভ :—আণ, বেল ।
ঘর্মে মাছি পড়ে :—* ক্যালাদ,
* সলফ ।

ঘর্ম পূর্ববাহু :—* ফের, শাধু ।

উত্তাপ সহ :—এণ্ট, এপিস, বেল,
হিপ, কালী বা, থাট-কা, ওপি,
শাধু, ষ্টাফ, ভেলের ।

উত্তাপ সহ, নিদ্রাকালে :—শাধু ।

উত্তাপাবেশ সহ :—এণ্ট, বেল, *
হিপ, কালী-বা, ওপি ।

উত্তপ্ত :—* ওপি ।

বস্ত্র, শক্তকর :—মার্ক, সেলেন ।

বস্ত্র, রক্তাক্তকর :—ল্যাক, নক্স ।

বস্ত্র, লোহিত বর্ণকর :—আণ, ড-
লক, নক্স ।

বস্ত্র, পীতবর্ণকর :—বেল, ব্রাই,

**কার্বো-এ, চিন, *কেব, *গ্রাফ,
ইপি, ল্যাক, ম্যাগ্নি-কা, *মার্ক..
*থুজা, *ভিরাট ।

দীর্ঘকাল স্থায়ী :—*কেব, আইওড ।

শয়নাস্থে :—ম্যাগ্নি-সল, মেনি ।

দুইপ্রহর রাত্রির পরে :—এলম,
এম্বা, এম-মিউ, ব্যাবা-কা, ব্রিম,
ড্রস, ম্যাগ্নি-মিউ, *মার্কিউ-
রিয়াল, নক্স, ফস, *পলিপ ।

দুইপ্রহর রাত্রির পূর্বে :—মিউব-
এসি ।

প্রাতে :—*এলম, এম্ব, এণ্ট,
অক্সি-না, অরম, বেনজিন,
বোরাক্স, বোভ, ব্রাই, ক্যাক,
কার্বো, কষ্ট, চেলিড, চিন-সল,
সিক, ক্লিম, কক, কফ, ডলক,
ড্রস, ইউজেন, ইউফব, *ফের-
মিউ, গ্রাফ, হেল, হিপ, আইওড,
ক্রিয়োজ, লাইকো, ম্যাগ্নি-কা,*
ম্যাগ্নি-মিউ, ম্যাগ্নি-সল, মার্কিউ-
রিয়াল, **মার্ক, মক্স, মিউব-
এসি, থাট-কা, থাট-মিউ, থাট-
সল, নিক, নাইট-এসি, নাই-
টার, নক্স, পার, *ফস, *ফস-এসি,
পলস, রাণ-বব, *রস, শ্রাবাড,
সিপি, সিলি, স্পঞ্জ, ষ্টান, *সলফ,
সলফ-এসি ।

রাত্রিতে :—একন, এগার, *এম্বস,

*এম্বা, এম-কা, *এম-মিউ, *
*এনাক. এম্ব, এণ্ট-টার্ট, অক্সি,
আণ, আর্স, অর, ব্যাবা-কা,
বেল, বেঞ্জিন, ব্রাই,* ক্যাক,
ক্যাম্ফ, ** কার্বো-এ, *কার্বো-
ভে, *কষ্ট, ক্যাম, চিন, সিক,
সিষ্ট, কক, *কলোস, *কোন
কুপ, কিউব, সাইক্রে, ডিজি, *
ড্রস, *ডলক, ইউপ-পার্কো,
ইউক্রে, ফের, *গ্রাফ, গোয়াজ,
গম-গট, হেল, *হিপ, আইওড,
ইপি, *কালী-কা, ল্যাক, লরো,
লেড, লাইকো, *ম্যাগ্নি-কা,
ম্যাগ্নি-মিউ, ম্যাগ্নি-সল, ম্যাক্স,
মেনি, মার্কিউরিয়াল, **মার্ক,
মার্ক-করো, *মিউব-এসি, *ম্যাটি-
কা, থাট-মিউ, থাট-সল, *নাইট-
এসি, নাইটার, নক্স, অক্স-এসি,
পেট্রো, ফস-এসি, *ফস, পলিপ,
পলস, রস, শ্রাবাড, শ্রাবু,
শাবাক, *সিপি, সিলি, স্পঞ্জ,
*ষ্টাক, ট্রাম, *ট্রুণ, **সলফ,
ট্যাবাক, টার, টিলিয়া, থুজা,
ভিরাট, ভাইওল-ওড, ভাইওল-
ট্রিক, জিঙ্ক । [এনাক ।

রাত্রিতে, বন্ধঃস্থলে ও উদরে :—

মধ্যাহ্নে :—সিনাব ।

গন্ধ-শূন্য :—* রস ।

তৈলাক্ত :—এগার, *ত্রাই, *চিন, *

ম্যাগ-কা, **মার্ক, নক্স, রোব,
ট্রাম, **থুজা । [ট্রাম, থুজা ।

একাদ্রীন :—ক্যাম, চিন, মার্ক, নক্স,

প্রভূত :—এফন, এগার, এম, *এন্ট-

টার্ট, *ব্যারা-কা, বেল, *বেজিন,

বোভ, **ত্রাই, ক্যাক, ক্যাম্ফ,

ক্যাঙ্ক, ক্যাম্প, *কার্কো এ,

কার্কো-ভে, *কষ্ট, সিড, *চিন,

*চিন সল, *ডিজি, ইলাট, ইলাপ্স,

ইউপ-পার্কো, ইউপ-পাপু, *ফের

জেলস, গ্রাফ, **হিপ, হাইওস,

আইওড, *ইপি, কালী-বা, কালী-

কা, *ল্যাক, *লাইকো, লোব,

*ম্যাগ-কা, **মার্ক, মেজ, **

শ্রাট-মিউ, *নাইট-এসি, *নক্স,

*ওপি, *ফস-এসি, *ফস, পডো,

*পলিপ, পেট্রো, রোব, রস,

শ্রাবাড, সোর **শ্রামু, সারাক,

*সিকেল, *সিপি, **সিলি, ষ্টাক,

ট্রাম, *সলফ, টার, *থুজা,

ভেলের, ভিরাট । [:—*নক্স ।

প্রভূত, রক্তসঞ্চয় সংযুক্ত শীতাস্তে

প্রভূত, বস্ত্রাবৃত স্থলে :—ক্যাম ।

প্রভূত, অল্প শীতাস্তে :—* ইউপ-
পার্কো ।

প্রভূত, মস্তক ভিন্ন অনাবৃত স্থলে

:—থুজা । [পর :—ইপি ।

প্রভূত, কুইনাইন অপব্যবহারের

গৃহের অভ্যন্তরে :—*ইপি ।

উত্তাপের কয়েক ঘণ্টাপরে :—

আর্স । [*নক্স ।

কম্পসহ :—সিড, কফ, ইউপ-পার্কো,

নিদ্রাকালে :—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ,

চেলিড, ক্যাম, **চিন, **কোন,

হাইওস, ফস, শ্রাবাড, থুজা ।

ক্রিম্ব :—এন্ট, এপিস, সিন, *সিনা,

ইলাপ্স, *ইউপ-পার্কো, ইউপ-

পাপু, ইয়ে, *ইপি, কালী-আ-

ইওড, ল্যাক, লেড, নক্স-ম, নক্স,

সিপি, সিলি ।

সুগন্ধি :—কোপ, রোড ।

তিক্তগন্ধি :—ভিরাট ।

রক্তগন্ধি :—* লাইকো ।

কপূর-গন্ধি :—ক্যাম্ফ ।

এলডার (elder) মকুলগন্ধি :—

সিপি ।

কঙ্কুরিগন্ধি :—পলস, সলফ ।

ক্রিম্ব-গন্ধি (ছাতাপড়ারশ্রায় গন্ধ

বিশিষ্ট) :—পলস, সলফ ।

দুর্গন্ধি :—*আর্গ, আর্স, *ব্যারা-কা,

বেল, *কার্কো-এ, কার্কো ভে,

সাইম, কোন, * ডলক, ইউফর, ফের, *গ্রাফ, গোয়াজ, কালী-কা, *ল্যাক, লেড, * লাইকো, ম্যাথ-কা, * মারকিউরিয়াল, **মার্ক, *নাইট-এসি, * নক্স, পলস, * রস, রোব, *সিপি, *সিলি, ষ্টান, ষ্টাফ, স্পিজি, সলফ, ভিবাট ।

পলাণ্ডু-গন্ধি :—*বোভ, *ল্যাক, * লাইকো ।

পচা-গন্ধি :—কার্সো-ভে, ডাফ, লেড, রস, ষ্ট্রাম, *ষ্টাফ, ভিরাট ।

রেউচিনি-গন্ধি :—রিউম ।

অঙ্গ-গন্ধি :—একন, *অণ, আর্স, এসায়, **ব্রাই, ক্যাক, কার্সো-ভে, * কষ্ট, ক্যাম, সাইম, গ্রাফ, *হিপ, হাইওস, আইওড, *ইপি, লেড, * লাইকো, * ম্যাথ-কা, মার্ক, জাট-মিউ, *নাইট-এসি, নক্স, রস, *সিপি, * সিলি ।

ঈবৎ অঙ্গ-গন্ধি :— (হামে যেমন হয়) * ফেরি-মিউ ।

গন্ধক-গন্ধি :—*ফস ।

মূত্র-গন্ধি :—বার্ক, * ক্যাস, ক-লোস, * নাইট-এসি ।

অশ্বমূত্র-গন্ধি :—* নাইট-এসি ।

চর্ট চর্টে :—এণ্ট-টার্ট ।

মলত্যাগের পূর্বব :—মার্ক ।

আকস্মিক :—ইপি। [৩৬ ।

কথা বলিবার সময় :—গ্রাফ, আই-হাঁটিবার পর :—সলফ ।

হাঁটিবার সময় :—এগার, এম্বা, ক্রস, কক, কালী-কা, লেড, জাট-মিউ, সেলেন, সিলি ।

উষ্ণ :—একন, এণ্ট, বেঞ্জিন, ক্যান্ফ, ক্যাম, কক, ড্রস, ইথে, কালী-কা, ল্যাক, লেড, জাট-মিউ, নক্স, ওপি, ফস, সিপি, ষ্টাক, ষ্ট্রাম ।

ঔষ্যতা লাগাইলে সহজে ঘর্ষ নিঃসরণ :—কার্সো-ভে ।

ধুইয়া ফেলা কঠিন :—*ম্যাথি-কা, * মার্ক ।

ঘর্ষের অবস্থান,—

উদরে :—এম্বা, *এনাক, সিক, ** ড্রস, ষ্টাক ।

বাহুতে :—ইপি, * মারকিউরিয়াল ।

কঙ্ক :—* বেঞ্জিন, *বোভ, ক্যান্স, চিন-সল, ডলক, * কালী-কা, ল্যাক, *নাইট-এসি, পেট্রো ।

পৃষ্ঠে :—চিন-সল, ডলক, হাইওস, ইপি, ল্যাক, পেট্রো, প্লান্ট, পলস, * সিপি, *সলফ ।

পৃষ্ঠে, কটিদেশে :—প্লান্ট-মেজ ।

পূর্বে, ত্রিকদেশে :—প্লাট-মেজ ।

সর্বশরীরে :—*এন্ট-টার্ট, *বেজিন,

কক, * কট, কফ, ডলক, ইলাপ্স,

গম-পট, হাইওস, আইওড, লেড,

*লাইকো, *সারকিউবিরাণ, *

জাট-মিউ, * নাইট-এসি, ওপি,

* ফল, পলস, সিকেল, গিপি *

* সিলি, * ট্রাম, সলফ ।

সর্বশরীরে, মুখমণ্ডল ব্যতীত :—

*বস, *সিকেল ।

সর্বশরীরে, মুখমণ্ডল ও মস্তক

ব্যতীত :—*বুজ ।

সর্বশরীরে, সম্মুখ ভাগে :—আর্জ,

* ক্যাক, গ্রাফ, মার্ক, ফস, *

সেলেন ।

সর্বশরীরে, নিম্নভাগে :—সিনাব,

ফ্রোক, সাইক্রে, ইউফর ।

সর্বশরীরে, উর্দ্ধভাগে :—এসার,

আর্জ, * ক্যাম, সিনা, ডলক, ই-

উপ-পার্পু, ইপি, কালী-কা, লরো,

নক্স, ওপি, * রিউম, সিপি, স্পিজি

সলফ-এসি, ভেলের, ভিবাট ।

সর্বশরীরে, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নহে

:—লাইকো ।

বক্ষঃস্থলে :—* এনাক, * বেজিন,

বেভ, ক্যাক, সাইম, কক,

গ্রাক, * সিপি ।

মুখমণ্ডলে :—এলম, কফ, * * ড্রস,

সোর, * পলস, বস, জাবাড, *

জাহু, * সিলি, * ট্রাম । [রস ।

মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্বশরীরে :—

মুখমণ্ডল ও মস্তকে কেবল :—

সিলি । [পলস ।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বে :—এলম,

পদে :—বেল, ক্যাক, ক্যাম্ফ, ক্যাহ,

* কার্বো-এ, কার্বো-ভে, ড্রস,

গ্রাক, লেড, * পেট্রো, ফস, পলস,

* * সিলি, ট্রাক ।

পদতলে :—* * নাইট-এসি, জাবাড

কপালে :—* সিনা, ইলাপ্স, ইউপ-

পার্পু, ইপি, কালী-কা, লেড, ওপি,

* ট্রাম, * ভিবাট । [ট্রাক ।

জননেন্দ্রিযে :—ক্যাহ, কোন, জেলস,

পুংজননেন্দ্রিযে :—* সিপি ।

বামহস্তে :—এনাক ।

হস্তদ্বয়ে :—ক্যাহ, * সিনা, কক, *

কালী-কা, লেড, ফস, সিকেল ।

হস্তদ্বয়ে, পর্যায়ক্রমে :—কক ।

হস্তের তালুতে :—ক্যাক, কফ, ডিজি,

ডলক, আইওড, পেট্রো, *সোর ।

মস্তকে :—ক্যাক, সাইম, ইউপ-পার্পু

ওপি, পেট্রো, ফস, জাবাড, *

সিলি ।

মস্তকের পশ্চাৎপ্রদেশে :—সলফ ।

কেবল মস্তকে :—* গিলি ।

প্রদাহিতস্থলের উপরিভাগে :—
গ্রাক ।

সন্ধিতে :—লাইকো ।

জানুতে :—ক্যাক ।

জানুগহ্বরে :—* কার্কো-এ ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে :—ক্যাক, কোন হাই-
ওল, পেট্রো, সারাক ।

ঘাড়ের :—ইলাপ্স ।

নাকে :—* দিনা ।

কৃগ্নস্থানে :—* এণ্ট-টার্ট, এম্ব্রা, কক,
মার্ক, ফ্লোর-এসি, সিপি, সিলি ।

বস্ত্রাবৃতস্থানে :—* একন, * বেল,
ক্যাম । [সল ।

বস্ত্রদ্বারা প্রচাপিতস্থানে :—চিন-
অনারৃতস্থানে :—* থুজা ।

একাদ্ধে :—* একন, ব্যারা-কা, বেল,
ব্রাই, * ক্যাক, ক্যাম্প, কষ্ট,
ক্যাম, চিন, গ্রাক, হেল, হিপ,
ইগ্নে, ইপি, লেড, * লাইকো,
মার্ক, নক্স, পেট্রো, ফস, পলস,
রিউস, রস, স্যাবিন, স্যামু, *
সেলেন, * সিপি, সিলি, স্পিজি,
স্পঞ্জ, * সলক, * থুজা ।

বস্ত্র-গহ্বর-প্রদেশে :—ক্যাছ ।

মূলাধারে :—চিন-সল, কোন, *
হিপ, * কালী-কা, * সোর, থুজা ।

মস্তকের কেশাবৃত স্থানে :—
পলস, রোব ।

অণুকোষে :—* থুজা ।

কৃগ্ন পার্শ্বে :—** এম্ব্রা, নক্স ।

বাম পার্শ্বে :—* ব্যারা-কা, * পলস
ফস ।

অশয়িত পার্শ্বে :—* বেজিন ।

এক পার্শ্বে :—* এম্ব্রা, একন,
* ব্যারা-কা, বেজিন, ব্রাই, ক্যাম,
চিন, লাইকো, নাইট-এসি নক্স-
ম, * নক্স, ** পলস, রস, সলফ ।

শয়িত পার্শ্বে :—* একন, ব্রাই,
চিন, * নাইট-এসি ।

দক্ষিণ পার্শ্বে :—নক্স, * পলস ।

উভয় পার্শ্বে :—* মার্কিউবিয়াল ।

উরুতে :—এম্ব্রা, * কার্কো-এ,
হিপ, সিপি ।

উরুর অভ্যন্তর দিকে :—* থুজা ।

ঘর্ষকালীন লক্ষণ ।

উদরের ক্ষীণতা :—ট্রাম ।

উত্তম ক্ষুধা :—ট্রাম ।

উৎকর্ষা :—আর্গ, বার্ক, ব্রাই,
ক্যাক, কক, কের, ম্যাক্স, খাউ-
কা, নক্স, ফস, পলস, সিপি,
সলফ ।

উৎকর্ষা, উপশমিত :—একন,
ব্যায়াক।

পৃষ্ঠে, বেদনা :—কোর্কো-তে ।

শরীরের নিম্নভাগ উত্তপ্ত ও
অনাদ্র :—ওপি ।

শরীরের নিম্নভাগ আরক্ত, উত্তপ্ত,
ও অনাদ্র :—* ট্রাম ।

অস্থিতে বেদনা :—* ইউপ-পার্কো ।

শ্বাস, শশক :—* ওপি ।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—* ব্রাই ।

উদর-বেদনা :—নক্স, ট্রাম ।

টঙ্কার :—নক্স ।

কাস :—আর্স, ব্রাই, * ড্রুস, ইপিকা ।

কাস, আক্ষেপিক :—* ড্রুস ।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা :—একন,
ইথ, অর, ক্রিম, কলচি, কোন,
নক্স-ম, ** নক্স, শ্রাঘু * সিলি,
* ট্রাম, ট্রেন ।

দুর্বলতা :—এম্বা, * বেঞ্জিন, ব্রাই,
ক্যাক, ক্যান্ফ, কক, * কার্কো-এ,
* চিন, চিন-সল, ক্রোক, ডিজি,
* ফের, গ্রাক, হাইওস, ইথে,
আইওড, লাইকো, * মার্ক, স্কাট-
মিউ, * নাইটার, * ফস, সোর,
সিপি, * ষ্টান, সলক, টার ।

প্রলাপ :—থুজা ।

অতিসার :—একন, চিন-সল, ট্রাম,
সলক ।

অতিসার, রাত্ৰিকালীন :—চিন-সল ।

স্বপ্ন :—পলস ।

শ্বাস-কষ্ট :—এনাক, ক্যাঙ্ক, মার্ক ।

কর্ণ-বেদনা :—ইথে ।

কর্ণ-নাদ :—আর্স, ইথে ।

উদ্বেদ :—কোন । [একন ।

স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রশমিত :—

অবসাদ :—* বেজ, ক্যান্ফ, * কার্কো-
এ, * চিন, ইথে ।

হাত পায়ে বেদনা :—সিড ।

চক্ষে জ্বালা :—ট্রাম ।

মুখমণ্ডলের শীতলতা :—ক্যাঙ্ক,
ল্যাক, নক্স ।

মুখমণ্ডলের শুষ্কতা :—* কালী-বা ।

মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা :—বেল, নক্স,
শ্রাবাদ ।

মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা :—
** ভিরাট । [কোন, সিপি ।

মুখমণ্ডলের আরক্ততা :—বেল,
মুচ্ছা :—এনাক, * এপিস, আর্স,
চিন, ইথে, সলক ।

পদের শীতলতা :—সিড, আইওড ।

পদের থল্লী :—পলস ।

পদের বেদনা :—* নাইট এসি, ট্রাক ।

পদের স্পর্শ-দ্রব্য :—গ্রাক, **সিলি ।
 পদের কন্দুকের স্পর্শ-দ্রব্য :—
 ** নাইট-এসি ।
 হস্তাঙ্গুলী, রজকবৎ কুক্ষিত :—
 এণ্টজু, *কাঞ্চ, *মার্ক, ফস-এসি,
 ভিরাট ।
 হস্তাঙ্গুলী, কুক্ষিত :—এণ্ট, *কাঞ্চ,
 *মার্ক, ফস-এসি, ভিরাট ।
 হস্তের শীতলতা :—কাঞ্চ, সিড,
 কালী-বা, নাইট-এসি ।
 হস্তে খন্নী :—পলস ।
 হস্তের উত্তপ্ততা :—নক্স ।
 মস্তকে, রক্তসঞ্চয় :—খুজা ।
 মস্তকে, গুরুত্ব :—আর্স, কষ্ট ।
 মস্তকে, গর্জ্জনধ্বনি :—কষ্ট ।
 শিরঃপীড়া :—আর্গ, ইউপ-পার্কো,
 ফের, ঝাট-মিউ, রস, খুজা ।
 ঘর্ষসহ শিরঃপীড়ার আরম্ভ :—
 ফের । [—ঝাট-মিউ ।
 শিরঃপীড়া ক্রমে ক্রমে উপশমিত
 শিরঃপীড়া, পিপিসা দ্বারা উপ-
 শমিত :—চিন-সল ।
 হৃৎকম্প :—সিড, মার্ক ।
 ক্ষুধা :—সাইমেক্স, * সিনা ।
 জজ্ঞায় বেদনা :—কার্কো-ভে ।
 জজ্ঞায় দুর্বলতা :—আর্স, আই ও ড ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শীতলতা :—সিকেল
 বাচালতা :—**পলস ।
 মুখশোষ :—সিড ।
 মুখ বিকশিত :—ওপি ।
 নখের নীলবর্ণ :—*নাইট-এসি ।
 বিবমিষা :—*ড্রস, গ্নন, ইপি, মার্ক,
 খুজা ।
 স্নায়বীয়তা—কফি ।
 গাত্রে ধূমের স্থায় গন্ধ :—বেল ।
 বেদনা, অনাবৃত্ত হইলে :—ষ্ট্রাম,
 ট্রন ।
 বেদনা, কফি ও তামাক সেবনে
 বিবর্জিত :—ইয়ে ।
 বেদনা, অনুশমিত :—ইউপ-
 পার্কো, কালী-কা, ল্যাক, মার্ক,
 ঝাট-কা, ঝাট-মিউ, নক্স, পলস,
 রস, ট্যাবাক, টিলিয়া ।
 বেদনা, উপশমিত :—* আর্গ,
 ব্রাই, ক্যালাড, চেলিড, * ল্যাক,
 * ঝাট-মিউ, * নক্স, সিকেল ।
 বেদনা, উপশমিত, শিরোবেদনা
 ভিন্ন :—ইউপ-পার্কো ।
 বেদনা, উপশমিত, ক্রমে ক্রমে
 :—বেল, ** ঝাট-মিউ ।
 বেদনা, অস্থি-বেষ্টে :—* আর্গ ।
 নাড়ী, সবিরাম :—সিকেল ।

নাড়ী, দুর্বল :—চিন-সল, সিকেল ।

শ্বাস, দ্রুত :—সিড ।

অস্থিরতা :—ব্রাই, ল্যাকনা ।

দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ :—ব্রাই ।

পার্শ্বে, সূচীবোধ :—মার্ক ।

স্বক, জ্বালা :—মার্ক, ওপি ।

স্বক, কণ্ঠয়ন :—এপিস, কলোস,

ফ্লোর-এসি, ম্যাক্স, পাব, বোড,

রস । [চিন, মার্ক ।

স্বক, অল্প অল্প সিদ্ধ বস্তু :—ক্যাক্স,

স্বক. টাটান :—ক্যাপ্স, ক্যাম,

কোন ।

নিদ্রা :—আর্থ, আর্স, বেল, কর্কো-

এ, চেলিড, চিন, সিক, সিনা,

সাইক্ল, ইউফন, ফের, হাইওস,

ইথের, কালী-কা, মেজ, মিউন-

এসি, নাইট-এসি, নক্স-ম, *ওপি,

ফস, ফস-এসি, প্লাট, ** পডো,

*পলস, ** রস, শ্রাবাড, সোর,

সেলেন, সলফ । [*ওপি ।

নিদ্রা, গাঢ় নাকডাক বিশিষ্ট :—

নিদ্রা, অস্থির :—*সলফ ।

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ :—এগের ।

পৃষ্ঠবংশের প্রচাপনে ব্যথিততা :

—চিন-সল । [এগের ।

পৃষ্ঠবংশের স্পর্শে অনুভবাবিক্য :

পৃষ্ঠবংশের দুর্বলতা :—এগের ।

ঘর্ষকালে লক্ষণের বৃদ্ধি :—*ফের,

* ইপি, মার্ক, *ওপি ।

পূর্ব বিদ্যমানলক্ষণের বিরতি :—

আর্স, ক্যালাড, সাইম, ইলাট,

জেলস, *শ্রাট-মিউ, শ্রাঙ্ক, সিকেল ।

পূর্ব-বিদ্যমান লক্ষণের ক্রমে ক্রমে

বিরতি :—**শ্রাট-মিউ ।

কুন্তন :—সলফ ।

পিপসা :—একন, এনাক, **আর্স,

ক্যাঙ্ক, * সিড, ** চিন, * চিন-

সল, ** কফ, কোন, ইউজেন,

হিপ, আইওড, মারকিউরিয়াল,

** শ্রাট-মিউ, ফস-এসি, রস,

সিকেল, * ট্রাম, টার, থুজা ।

পিপাসাসহ ঘর্ম্মারম্ভ :—ককি,

থুজা ।

পিপাসা পরিশূন্যতা :—* এপিস,

ব্যারা-কা, * ক্যাক্স, * ক্যাপ্স,

কষ্ট, * সাইম, * সিনা, ইউপ-

পাপু, ইউফর, হেল, * ইথের নক্স,

* শ্রাঙ্ক, ষ্টাফ, ট্রাম, *ভিরেট ।

পদাঙ্গুলীতে স্পর্শদ্রব্য :—**নাইট-

এসি । [কফ ।

দন্তবেদনা :—কার্কো-ডে, চিন, *

দন্ত-বেদনা, শীতল জল মুখেধারণ

করিলে উপশম পড়ে, কিন্তু

সেই জল উষ্ণ হইলে পুনরায়

উপস্থিত হয় :—ড্রাই, *কফ ।

কম্পন :—এপিস, আর্ম, নক্স, রস ।

অনারুত হইতে ইচ্ছা :—* একন,

ক্যাঙ্ক, *ইউপ-পার্কো, ফের, আই-

ওড, গেড, মিউব-এসি, জাট-মিউ,

*ওপি, স্পিজি, ষ্টাক, তিরিট

মূত্র, অধিক :—একন, ডলক, ফস ।

মূত্র, লোহিত :—সিড । [ডলক ।

মূত্র, পরিমাণে অধিক :—এন্ট-ট্যাট,

মূত্র, দুগ্ধবৎ :—ফস ।

মূত্র, স্বল্প :—সিড ।

মূত্র, দৃচ্ছ :—ডলক ।

মূত্র, ঘোলা :—* ইপি, ফস ।

শীতপিত্ত :—*এপিস, * বস ।

শিরার স্ফীততা :—* এগেব ।

শিরোঘূর্ণন :—ল্যাকনা, অকজ-এসি ।

অপরিচ্ছন্নদৃষ্টি :—ট্রাম ।

বমন :—*আর্ম, ক্যাঙ্ক, চিন, ড্রস,

* ইউপ-পার্কো, ইপি, সলফ ।

বমন, তিক্ত :—* ইউপ-পার্কো ।

বমন, শীতলপানীয় পানাস্থে :—

* আর্ম, চিন । [ক্যাঙ্ক ।

বমন, কালে বদনের শীতলতা :—

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—*ইউপ-পার্কো ।

বমন, নিদ্রা হইতে জাগরণ কালে

:—এমাক, জাট-মিউ, নাইট-এসি ।

দুর্বলতা :—এপিস, আর্ম, ব্যারা-

কা, ক্যাঙ্ক, ফের, আইওড, মার্ক,

অক্স-এসি, *কস, পলস, মোর ।

জন্তুণ :—কষ্ট ।

ঘর্মের হ্রাসপ্রাপ্তি :—

অনারুত বায়ুতে :—এলম, গ্রাক ।

শয্যা পবিত্যাগে :—হেল ।

আবৃত হইলে :—একন ।

পানাস্থে :—চিন সল ।

আহারাস্থে :—চিন, ফ্লোর-এসি,

ল্যাক, ফস ।

আহাব করিলে :—এনাক, কিউর ।

উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য আহারাস্থে :—

কালি-কা, ফস, সজফ-এসি ।

প্রাতে :—বোবাক্স, ল্যাকনা ।

সঞ্চরণে :—* ক্যাপ্স ।

নিদ্রায় :—নক্স, কসেক্স, * জাধু ।

বিচরণে :—ক্যাম, চেলিড, * পলস,

* থুজা ।

ঘর্মের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ।

বায়ুতে ব্যায়ামে :—* ড্রাই, *

কষ্ট, * চিন ।

অনারুত বায়ুতে :—ড্রাই, ক্যাঙ্ক, *

কার্কো-এ, *কষ্ট, * চিন, গোরাঙ্গ,
ইপি, কটা, * সোর ।

শয্যা পরিত্যাগে :—ল্যাক ।

শয্যায় :—* নাইট-এসি ।

আবৃত্ত হইলে :—* বেল, * চিন,
নাইট-এসি ।

পানে :—কক ।

আহারে :—ব্যারা-কা, বোরাঙ্গ,
ক্যাক, * কার্কো-এ, * কার্কো-
ভে, কক, কোন, গ্রাফ, ইপে,
লাইকো, ছাট-মিউ, * নাইট-
এসি, নক্স, ফস, সাস, সিপি,
সলফ-এসি ।

চক্ষু বুঝিয়া থাকিলে :—* কোন ।

ব্যায়ামে :—বেল, বার্ক, ব্রোম,
ব্রাই, * ক্যাক, ক্যাহ কার্কো-ভে,
কষ্ট, * চিন, * কক, ইউপিয়ন, *
ফের, ফের-মিউ, * গ্রাফ, * হিপ,
* কালী-কা, লেড, লাইকো,
মার্ক, * ছাট-কা, ছাট-মিউ,
ওপি, * ফস, * সোর, * ষ্টান,
সলফ-এসি । (সঞ্চরণ দ্রষ্টব্য) ।

মানসিক পরিশ্রমে :—হিপ, *
কালী-কা, * সোর, * সিপি, *
সলফ ।

শয়নান্তে :—ম্যাগ্নি-সল, মেনি ।

দুইপ্রহর রাত্রিরপর ।—এলম, এম্বা,
এম-মিউ, ব্যারা-কা, ক্লিস, ড্রস,

কালী-কা, ম্যাগ্নি-মিউ, নক্স, ফস,
* সিপি ।

প্রাতে :—এম্বা, পলস ।

সঞ্চরণে :—এলম, এম-মিউ, বেল,
ব্রাই, ক্যাক, ক্যাম্ফ, ক্যাহ, *
কার্কো-এ, * কষ্ট, * চিন, চিন-সল,
* কক, কিউর, জেলস, গ্রাফ **
হিপ, ইপি, কালী-বা, * কালী-
কা, ম্যাগ্নি-কা, ** মার্ক, * ছাট-
মিউ, * ফস, * * সিপি, * সিপি,
* সলফ, সোর, ভেলের, *
ভিবাট ।

গৃহের অভ্যন্তরে :—ক্লোর-এসি ।

রুগ্ন পার্শ্বে :—এম্বা ।

উপবেশনকালে :—এনাক, * কালী
-বা, রস, সিপি, ষ্টাক ।

নিদ্রাকালে :—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ,
ক্যাম, চেলিড, চিন, ** কোন,
হাইওস, * মেজ, * ফস, * থুজা ।

রাত্রির প্রারম্ভে :—এম-কা, আর্স,
কোন, মিউর-এসি, ট্যাবাক,
থুজা, ভিরাট ।

প্রথম নিদ্রায় :—ক্যাক ।

ধূমপানে :—কক ।

প্রতিবার মলত্যাগান্তে :—* ভিরাট ।

শ্লেষ্মা বমনান্তে :—* ভিরাট ।

জাগরিত হইবামাত্র :—ক্যাহ, **
ছাাহ, ** সিপি, * সলফ ।

গৃহের উষ্ণতায় :—গ্লাউ-বেজ ।
 আর্দ্র ঋতুতে :—কিউর ।
 শীতল বাতাসে :—কিউর ।
 লিখিলে :—* হিপ, * কালী-কা,
 * সিলি, * সলফ ।

ঘর্মের পর ;—

শীত :—* কার্শো-ভে, করণ-ফ ।
 কাস :—ইউপ-পার্শো, সিলি ।
 অতিসার :—পলস ।
 ক্ষুধা :—* সিনা, ষ্টাক ।
 দুঃক্ষুধা :—* সিনা ।
 উন্মাদগবেশ :—কুপ ।
 অবসন্নতা :—আর্স ।
 নিদ্রা :—নক্স-ম ।
 পিপাসা :—বেল, বোরাক্স, * *
 লাইকো, নক্স, স্ভাবড ।
 পিপাসা, অতিশয় :—লাইকো ।
 বমন :—* সিনা ।
 দুর্বলতা :—আর্স ।

বিরামকালীন লক্ষণ ।

উদরের স্ফীততা :—*আর্স, চিন,
 গ্রাফ, ভাট-মিউ, সিলি ।
 উদরে ধল্লী :—ভিরাট ।
 উদরের প্রসারিততা, আহা়ারান্তে

:—কার্শো, *কালী-কা, লাইকো ।

উদরে বেদনা :—এন্ট-টার্ট, লেড,
 পলিপ, রাণ-ব, সলফ ।
 অম্লদ্রব্যে স্পৃহা :—* এন্ট, আর্গ,
 আর্স, ডিজি, ইউপ-পার্শু, কালী-
 বা, পলিপ, পলস, সিকেল ।

শীতলবাতাসে অনুভবধিক্য :—
 ব্যাঙ্গা-কা, * হিপ, নক্স-ম ।

একাকী থাকিতে অপাবগতা :—
 লাইকো ।

একাকী থাকিতে ইচ্ছা :—চিন ।

নীরক্ততা :—*আর্স, কার্শো-ভে, *
 চিন, *কের ।

উঃকণ্ঠ :—একন, ক্যাফ ।

ক্ষুধা, উত্তম :—এলম, ক্যাফ ।

ক্ষুধার অভাব :—একন, এন্ট, এপিস,
 আর্গ, আর্স, ব্রাই, ক্যাপ্স, কার্শো,
 কক, চিন, কবণ-ফ, সাইক্রে,
 ডিজি, গ্রাফ, ইথের, ইপি, কালী-কা ।

শয্যায় থাকার আবশ্যকতা :—
 *ক্যাফ ।

প্রতে, কবস্ত্র কাল দর্শন :—*নক্স ।

জলপানে মূত্রাশয়ে বেদনা :—
 ক্যাফ ।

শরীরের প্রতে, কস্থানে চাপদিলে
 বেদনা :—ব্রাই ।

অস্থিতে বেদনা :—আরেণিয়া, *

আর্ণ, ব্রাই, কষ্ট, * ইউপ-পার্কো,
নক্স, রস । [লাইকো ।]
অস্ত্র-কুজন (পেটডাকা) :—
মস্তিকে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণ :—
একন, * আর্ণ, চিন, লাইকো,
* নক্স, * ওপি, ফস, সিপি,
সলক ।
ক্রান্তিপানের ইচ্ছা :—নক্স, পলস ।
কুটাম্বে অরুচি :—বেল, কোন,
সাইক্রে, ইগ্রে, কালী-কা, লাইকো,
জাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স, ফস-
এসি, ফস, পলস, রস ।
শ্বাসে, দুর্গন্ধ :—জেলস, * পডো ।
শ্বাস, বিরক্তিকর :—* পডো ।
শ্বাসের দুর্গন্ধ স্বয়ং বুঝা যায় :—
হিপ, পডো ।
শ্বাসের হ্রাস :—* ক্যাক ।
শ্বাসে শূন্যেরন, য় গন্ধ :—গ্রাফ ।
শ্বাসে অগ্নগন্ধ :—* আর্গিকা ।
শ্বস্তবৎ অনুভব :—* আর্ণ ।
কোলে উঠিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা
:—* ক্যাম ।
মস্তকে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ :—
* ওপি । (মস্তিষ্কড্রটো) ।
বক্ষঃস্থলে আকুঞ্জন অনুভব :—
আর্স, ক্যাপ্স, কার্কো-ভে, কক,
ইগ্রে, কালী-কা, জাট-মিউ, পলস,

জাবাদ, জাধু, স্পিজি, ষ্টান, ট্রাম,
সলক, ভিরাট ।
বক্ষঃস্থলে বেদনা :—জাবাদ ।
বক্ষঃস্থলে চাপ সহ্য হয়না :—ল্যাক
সর্বদা শীত শীত অনুভব :—এ-
নাক, * আর্স, ব্রাই ক্যাপ্স, কক,
ডাক, ডিজি, * হিপ, লেড, জাট-
মিউ, পলস, জাবাদ, রাণ, সিলি,
ভিরাট ।
বিরাম, পরিষ্কার :—ক্যাপ্স, ড্রস,
ইগ্রে, সাবড, চিন-সল ।
বিবাম, পরিষ্কার নহে :—* একন,
* ক্যাক, কার্কো-এ, চেলিড, *
সিনা, * ইউপ-পার্কো, * জেলস,
ইপি, * জাট-মিউ ।
কফিসেবনে অরুচি :—নক্স ।
সহজে শব্দমালাগে :—* ব্যায়া-কা, *
ক্যাক, কষ্ট, ডলক, সোর ।
চক্ষুর শুরমগুলের পাণ্ডুর্ণ্য :—*
ইউপ-পার্কো, ফের, লাইকো,
জাবাদ ।
টঙ্কার :—এলম, আর্স, বেল, ক্যাক,
ক্যাম্ফ, কষ্ট, * ক্যাম, সিনা, ডিজি,
ড্রস, হাইওস, ইগ্রে, মার্ক, নক্স,
* ওপি, ফস-এসি, ষ্টান, ট্রাম,
ভেলার, ভিরাট ।
কোষ্ঠবদ্ধ :—এলম, এনাক, এন্ট,

*ব্রাই, ক্যাক, কার্কো, চিন, কক,
কোন, ফের, গ্রাক, ইয়ে, লেড,
লাইকো, ম্যাগ্নি-মিউ, * ছাট-
মিউ, * নক্স, * ওপি, * ফস,
পলিপ, সাবাড, সিলি, ট্রাক, ট্রাম,
* সলফ, ভিরাট ।

কাস :—এন্ট-টার্ট, এপিস, আর্গ,
আর্স, বেল, ব্রাই, চিন, * সিনা,
কক, কোন, * ড্রস, * ইউপ-
পার্কো, হিপ, হাইওস, ইয়ে, ইপি,
লাইকো, মার্ক, ছাট-মিউ, নক্স-ম,
নক্স, ওপি, ফস, * পলস, সিপি,
সিলি, স্পক্স, ট্রান, সলফ ।

মুখাকৃতি, মলিন :—* আইওড,
লাইকো, * ছাট-মিউ ।

আবৃত থাকার প্রয়োজন :—*হিপ
আবৃত থাকিতে বিরক্তি :—ক্যাক,
* সিকেল ।

অতিসার :—এন্ট-টার্ট, এন্ট, *আর্স,
ক্যাক, ক্যাপ্স, ক্যাম, চিন, সিনা,
করণ-ফ, ডিজি, ড্রস, * জেলস,
ইয়ে, ** আইওড, মার্ক, ম্যাগ্নি-
কা, নাইট-এসি, নক্স, ফস, ফস-
এসি, পলস, রস, স্তাবিন, সিলি,
* সলফ, ভেলার, ভিরাট ।

অতিসার, অতি প্রত্যাধে :—*সলফ

শীতল পানীয় পানের আকাঙ্ক্ষা :
—ডলক ।

শোথ :—চিন, ফের, ইউপ-পার্কো ।

কর্ণ-নাদ :—* চিন ।

জীর্ণতা :—আর্স, কার্কো, চিন, ফের,
আইওড, মার্ক, * ছাট-মিউ,
নক্স, ওপি, ফস-এসি ।

উদগার :—* এলম, এন্ট-টার্ট, *
আর্গ, চিন, লাইকো, পলস, সাবাড ।
অক্ষিপুট, সংযোজিত :—কালী কা
অক্ষিপুট, অন্ধনির্মীলিত :—*পডো,
ট্রাম, * সলফ ।

উপরের অক্ষিপুটের ক্ষীততা :—
এপিস, * কালী-কা ।

অক্ষি-তারার প্রসারিত :—ট্রাম ।

মুখমণ্ডল, ক্ষীত :—* আর্স, ফের ।

মুখমণ্ডল, কর্দ্দমবর্ণ :—* আর্স ।

মুখমণ্ডল, অসামান্য আরক্ত :—*ফের

মুখমণ্ডল, পাণ্ডুবর্ণ :—এনাক, *আর্স,

* ক্যাক, কার্কো, চিন, সিনা,
ডাক, ফের, ইয়ে, লাইকো, মেজ,
নক্স, পেট্রো, ফস, পলস, *সিকেল,
স্পক্স, ট্রান, সলফ, ভিরাট ।

মুখমণ্ডল, পীতবর্ণ :—*আর্গ, *আর্স,
ক্যাপ্স, চিন, * ইউপ-পার্কো,
ফের, *ছাট-মিউ, *নক্স, পেট্রো,
রস, সিপি ।

মুখমণ্ডলে পীতবর্ণ চিহ্ন :—ফের ।

মূর্ছা :—আর্গ, *আর্স, ব্রাই, ক্যাক,

কার্কো, কষ্ট, চিন, সিনা, কক,
কোন, ডিজি, ইয়ে, ইপি, লাই-
কো, ঝাট-মিউ, নাইট-এসি,
নক্স, ওপি, পলস, ভিরাট, সাবাড,
সলফ ।

বসাদ্রব্যে অরুচি :—কার্কো-এ,
কার্কো-ভে, হেল, হিপ, ঝাট-মিউ,
পেট্রো, পলস, সিকেল ।

বসাদ্রব্যের আকাজ্জ্বা :—নাইট-
এসি, নক্স ।

পদের শীতলতা :—কার্কো ভে, গ্রাফ,
হাইওস, লাইকো, রস, সিপি, সিলি ।

পদের আর্দ্রতা :—* কাক ।

পদের গুরুতা :—ক্যাস্ ।

পদের ক্ষীণতা :—ব্রাই, ক্যাপ্স,
কষ্ট, চিন, ফের, লাইকো, নক্স,
পলস, সিপি, সিলি । [পলিপ ।

উদরাগ্নান :—* কালী-কা, লাইকো,
আহারে অরুচি :—* এণ্ট, আর্স,
ইপি, কালী-কা ।

শীতল আহারে স্পৃহা :—ভিবাট ।

সরস দ্রব্য আহারে স্পৃহা :—ফস-
এসি, ভিরাট ।

নানাবিধ আহারে স্পৃহা :—ব্রাই ।

তরল আহারে স্পৃহা :—ষ্টাক ।

অত্যঙ্গ আহারে পরিভৃষ্টি :—
লাইকো ।

আহারে হৃদশূন্যতা :—এণ্ট-টার্ট,
ক্যাস্, * ডুস, প্রান্ট-মেজ, সিলি ।
রক্ষন করা ও উৎস আহারে অরুচি
:—পেট্রো, সিকেল ।

ফলে স্পৃহা :—এলম, * কস-এসি,
ভিবাট ।

বরফে স্পৃহা :—ইউপ-পার্কো ।

আমাশয়িক লক্ষণ :—* এণ্ট, এণ্ট-
টার্ট, ব্রাই, * কার্কো, ডুস, ইপি,
পলস ।

আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য :—
একন, * এণ্ট, এণ্ট-টার্ট, বেল,
ব্রাই, * কার্কো-ভে, ক্যাম, কফি,
ডিজি, ইয়ে, ইপি, * নক্স, পলস, রস ।

গ্রন্থির পীড়া :—* ব্যারা-কা, বেল,
* কাক, সিনা, কক, কোন,
স্পঞ্জ, ষ্টাক, * সলফ ।

দন্ত-মূল, স্পর্শে রক্তস্রাব :—ষ্টাক ।
দন্তমূল, কালসিয়া যাওয়ার স্থায়
অনুভব :—সাইম ।

দন্তমূল, স্তীতাদবৎ অবস্থা :—*
নাইট-এসি ।

দন্তমূল, সান্তর :—ষ্টাক ।

দন্তমূল, শুভ্র :—ষ্টাক ।

মস্তকের শিখরদেশে জ্বালাকর
উত্তাপ :—সলফ । [:—চিন ।

মস্তকের শিখরদেশে অশিথিলতা

মস্তক-বেদনা :—আঁধ, আঁস, বেল,
ব্রাই, ক্যাম, কার্কো-ভে, চিন,
কক, ড্রস, ফের, জেলস, ইয়ে,
মেজ, * ন্যাট-মিউ, * নল্ল, *
ওপি, কস-এসি, পলিপ, পলস,
রস, সিপি, স্পজ, ষ্টান, ভেলের।

হৃৎকম্প :—একন, চিন, ইয়ে, ল্যাক,
মার্ক, * ন্যাট-মিউ, সিপি, স্পিজি,
সলফ, ভিরাট। [মিউ।

হৃৎস্পন্দনে শরীর নড়ে :—* ভাট-
উত্তাপে অপ্রবৃত্তি :—সিকেল।

নিদ্রাবস্থায় উত্তাপ :—* ভাঘ।

ক্ষুধা :—এন্ট, আর্গ, ব্যাবা-কা, *
কার্কো-এ, কার্কো-ভে, * সিনা,
চিন, ডিজি, গ্রাক, ইয়ে, * আই-
ওড, লাইকো, * মেনি, নল্ল,
পেট্রো, রস, সিপি, ষ্টাক, ষ্টাগ,
সলফ, ভিরাট।

ক্ষুধা, অথচ খাইতে পারা যায় না
:—ব্যারা-কা, ইয়ে।

ক্ষুধা, কিন্তু আহারে শাস্তি জন্মে
না :—এন্ট।

স্কন্ধিণ কুক্ষিতে স্পর্শ-দ্রব :—*
ইউপ-পার্কো, * কালী-কা, * নল্ল।

উগ্রতা :—একন, * এনাক, বেল,
ব্রাই, * ক্যাম, চিন, সিনা, কফ,
জেলস, ইয়ে, মার্ক, * নল্ল,
পলস, সিপি, ভেলের।

স্কন্ধিণে বেদনা :—এপিস, আর্গ,
আঁস, ব্রাই, কষ্ট, ক্যাম, চিন,
কক, ইয়ে, ইপি, ফস-এসি, *
পডো, পলস, রস, স্তাবিন, সলফ।

স্কন্ধিণে স্পর্শ-দ্রব :—এপিস।

ভগাধরে ক্রত :—* ভাট-মিউ।

দ্বৈতপ্রদর, কাপড়ে পীতবর্ণ দাগ
:—* কার্কো-এ।

উজ্জল জ্যোতিতে বিরক্তি :—নল্ল।

অঙ্গ্রে থল্লী :—ভিরাট।

অঙ্গ্রে বেদনা :—ক্যাক, ক্যাম,
কার্কো-ভে, কষ্ট, চিন, ড্রস, *
ইউপ-পার্কো, গ্রাক, লাইকো,
নাইট-এসি, ভাট-মিউ, নল্ল,
পলস, স্তাবিন। [ক্যাহ।

অঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ আটুঠতা :—

অঙ্গের স্পর্শ-দ্রব :—এপিস।

অঙ্গের দুর্বলতা :—ব্যারা-কা, নল্ল।

ওষ্ঠে জ্বালা :—এপিস।

ওষ্ঠ বিদারিত :—গ্রাক, ইয়ে।

ওষ্ঠ শুষ্ক :—ব্রাই, * কোন, ইয়ে,
* নল্ল-ম, রস।

ওষ্ঠে উদ্বেদ :—ইয়ে, ** ভাট-মিউ,
** নল্ল, রস।

যকৃতে বেদনা :—আঁস, বেল, ব্রাই,
ক্যাম, ডলক, চেলিড, চিন, *
কালী-কা, লাইকো, মার্ক, * ভাট-
মিউ, * নল্ল, পলিপ, পডো, পলস।

শব্দভেদ স্বীকৃতি :—চিন ।

মাংসে অরুচি :—এলম, * আর্গ,

আর্স, বেল, ক্যাক, কার্কো-ভে,
ক্যাম, ডাক, ফের, গ্রাক, ইমে,
লাইকো, মার্ক, নাইট-এসি, ওপি,
পেট্রো, পলস, রস, স্তাবাদ,
সিকেল, সিপি, সিলি, সলফ ।

মাংসে স্পৃহা :—* ম্যাগি-কা, **
মেনি ।

রজঃ, বিলোপ :—আর্স, ক্যাক,
ক্যাম, চিন, কোন, ফের, গ্রাক,
কালী-কা, লাইকো, মার্ক, নক্স
পলস, সিপি, সিলি, সলফ ।

রজঃ, অতি সত্ত্বর প্রত্যাবৃত্ত :—এ-
কন, এলম, আরেণ, আর্স, ব্যারা-
কা, বেল, ব্রাই, * ক্যাক, কার্কো-
ভে, ক্যাম, কক, ফেব, হাইওস,
ইমে, কালী-কা, লেড, লাইকো,
মার্ক, নক্স, পেট্রো, ফস, রস,
স্তাবিন, সিপি, স্পঞ্জ, ষ্টাক, সলফ,
ভিরাট ।

রজঃ, অতি বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত :—
বেল, কষ্ট, চিন, কোন, ফের,
গ্রাক, হাইওস, ইমে, ইপি, কালী-
কা, লাইকো, স্টাট-মিউ, পলস,
স্তাবাদ, সিলি, সলফ ।

রজঃ, অতি প্রভূত :—একন, আ-
রেণ, আর্স, ব্যারা-কা, বেল, *

ক্যাক, ক্যাম, চিন, সিনা, ফের,
হাইওস, ইমে, ইপি, লেড, লা-
ইকো, মার্ক, স্টাট-মিউ, নক্স,
ওপি, ফস, স্তাবিন, সিপি, সিলি,
স্পঞ্জ, ষ্টান, ট্রাম, সলফ ।

রজঃ, অতি অল্প :—এলম, কোন
গ্রাক, লাইকো, স্টাট-মিউ, ফস,
* পলস, স্তাবাদ, সিলি, সলফ,
ভিরাট ।

দুগ্ধে অরুচি :—পলস ।

দুগ্ধে স্পৃহা :—এপিল, চেলিড ।

মুখের কোণে টেন্ডেন্স :—ইমে, **
স্টাট-মিউ, ** নক্স, রস ।

মুখের কোণে স্পর্শ-দ্রব ও ক্রতঃ-
নাইট-এসি ।

মুখ ধুইবার ইচ্ছা :—** নক্স, থুজা ।

মুখের স্নায়িকঝিল্লীর পাণ্ডুবর্ণ :—
* ইউপ-পার্কো, * ফের ।

মুখের অবদারণ :—কার্কো-এ ।

পেশীঘৃষ্টবৎ অমুভবঃ—কার্কো-এ ।

বিবমিষা :—এন্ট-টার্ট, এন্ট, আর্গ,
আর্স, ক্যাম্প, ড্রস, ইউপ-পার্কো,
গ্রাক, হিপ, হাইওস, ইপি, *
নক্স, রস, স্তাবাদ, সিলি ।

গ্রীবার পৃষ্ঠে বেদনা :—ফের ।

স্নায়বীয়তা :—সিড, * ক্যাক, চিন,
কক, * জেলস, ইমে, নক্স, পলস,

রস, ভেলব । [মিউ ।
 নৈশঘর্ষ :—* চিন, কালী-কা, ছাট-
 জলপূর্ণ স্ফীততা :—এপিস, চিন,
 ফের, ইউপ-পার্কো ।
 তালু বলসানবৎ অনুভব :—সাইম ।
 ঘর্ষ :—আর্স, চিন, ল্যাক, সলফ ।
 আচার ভঙ্গের স্পৃহা :—* এন্ট ।
 নাড়ী, নড়িলে চড়িলে বিবদ্ধিত
 গ.ত :—এন্ট-টাট, * ডিজি,
 জেলস ।
 নাড়ী, পূর্ণ :—একন, বেল, ব্রাই,
 ডিজি, ফের, জেলস, হাইওড,
 ল্যাক, ওপি, ট্রাম ।
 নাড়ী, দ্রুত, পরে মৃদু :—এন্ট ।
 নাড়ী, মৃদু :—চোল্ড, চিন, * ডিজি,
 সিকেল, * ভিবাট ।
 নাড়ী, তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম
 স্পন্দন বিরামশীল :—* ডিজি
 নাড়ী, সূত্রবৎসূক্ষ্ম :—একন, জে-
 লস, ল্যাক ।
 নাড়ী, দুর্বল :—* একন, আর্স, *
 কার্কো-ভে, চিন, * কুপ, ফের,
 জেলস, * গোয়াজ, ল্যাক, *
 লরো, * ওপি, * সিলি, * ট্রানো,
 * ভিরাট ।
 বিরাম, ঈষৎ :—* ইউপ-পার্কো ।
 (অস্পষ্ট দ্রষ্টব্য) ।

অস্থিরতা :—এপিস, সিত, আইওড, রস
 বাত :—* একন, এন্ট-টাট, আর্গ,
 * বেল, * ব্রাই, কার্কো-ভে, * কঠ,
 ক্যাম, নক্স, * পলস, * রস,
 থুজা, ভেলাব, ভিবাট ।
 লাল্লা, তীব্র :—নাইট-এসি ।
 লাল্লা, তিক্ত :—চেলিড ।
 লাল্লা, রক্তাক্ত :—জেলস ।
 লাল্লা, লবণাক্ত :—এন্ট, আইওড ।
 লাল্লা, আঠাআঠা :—* নক্স-ম ।
 লাল্লা, প্রভূত :—ইপি, পডো ।
 লাল্লা, অম্ল :—ইগে । [বা ।
 লাল্লা, সূত্রবৎ :—কোন, * কালী-
 লাল্লাশ্রাব :—আইওড, পডো ।
 দক্ষিণ স্কন্ধাশ্রিব নিম্ন কোণেব
 নীচে বেদনা :—চেলিড ।
 ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে উপশমানুভব
 :—* ব্রাই ।
 বাম পার্শ্বে বেদনা :—এপিস ।
 দীর্ঘ শাস্ত্যাগ :—ভিবাট ।
 নিমগ্নতা (সিংকিং) :—* ক্যাম্ফ,
 * কার্কো ।
 ত্বক, নীলবর্ণ :—* ভিরাট ।
 ত্বক, কণ্ডুয়ন :—হিপাব, ইগে, বস ।
 ত্বক, পীতবর্ণ :—একন, আর্গ, আর্স,
 বেল, ক্যাম, চিন, ডিজি, * ইউপ-

পার্কো, ফেব,* ছাট-মিউ, *নক্স,
 পলিপ, পলস, রস, মলফ ।
 নিদ্রা, স্বপ্নসংযুক্ত :—একন, ইগ্রে,
 ট্রাম ।
 নিদ্রা, অস্থির :—একন, এপিস,
 সিনা, ফেব, ইগ্রে, বস, ট্রাম ।
 নিদ্রা, নাক-ডাকা সংযুক্ত :—ইগ্রে,
 * ওপি ।
 নিদ্রালুতা :—একন, আর্গ,বেল,ব্রাই,
 ক্যাক, কার্কো, হাইওস, মার্ক,
 ওপি, সাবড, স্পিজি, ষ্টাণ, ট্রাম,
 মলফ, ভেলেব ।
 নিদ্রাহীনতা :—আর্স, বেল, ব্রাই,
 কার্কো, চিন, সিনা, কফ, হাই-
 ওস, ইপি, লেড, মার্ক, ছাট-মিউ,
 নাইট-এসি, ওপি, পলস, রাণ-ব,
 রস, সিলি, স্পিজি ।
 তন্দ্রালুতা :—এন্ট-টার্ট,বেল, কাগ,
 কক, হাইওস, *ওপি, পলস,বস ।
 অল্পদ্রব্যে অরুচি :—কক ।
 অল্পদ্রব্যে স্পৃহা :—আর্গ, আর্স,
 কক, ডিজি, ইউপ-পাপু, কালী-
 বা, পলিপ, পলস, সিকেল ।
 পৃষ্ঠবংশের উপদাহ :—* এগার, *
 জিক ।
 গ্লীহা, বিবর্দ্ধিত :—আরেগিরা,আর্স,
 বেল, চিন, ফের, * আইওড,

মার্ক, মেজ, নাইট-এসি, পলস ।
 গ্লীহা প্রদেশে বেদনা :—এপিস,
 আর্স, চেলিড, চিন, ফের, *ছাট-
 মিউ, ** নক্স, টার ।
 নিষ্ঠীবন, রক্তাক্ত :—নক্স ম ।
 আমাশয়ের খল্লী :—ভিরাট ।
 আমাশয়ের প্রসারণ :—নক্স,সাবড
 আমাশয়ে পূর্ণতানুভব :—লাইকো,
 * ছাট-মিউ, রস ।
 আমাশয়ে বেদনা :—একন, আর্গ,
 আর্স, ক্যাক, কষ্ট, * চেলিড,
 কক, কোন, ফেব, ইগ্রে, লা-
 ইকো, ছাট-মিউ, নক্স, পলস,
 রস, সাবড, সিলি, সিলি, ষ্টাণ,
 ভিরাট । [রস ।
 আমাশয় প্রদেশে চাপ :—এন্ট,
 আমাশয়ে আক্ষেপ :—আর্স, বেল,
 ব্রাই, কার্কো, ক্যাম, কক, ফের,
 ইগ্রে, ছাট-মিউ, নক্স,পলস, সিলি,
 ষ্টান, মলফ, ভেগের, ভিরাট ।
 ঘর্ম, দুর্বলকর :—* চিন ।
 ঘর্ম, দুর্বলকর নয় :—* আষু ।
 ঘর্ম, জাগ্রতাবস্থায় অধিক :—
 * আষু । [ভিরাট ।
 ঘর্মস্রাব :—* চিন, * আষু, সিলি,
 স্বাদ, তীব্র :—চিন ।
 স্বাদ, তিক্ত :—এন্ট, আরেগ, *আর্গ,

আর্স, ব্রাই, ক্যাক, কার্কো, ক্যাম,	নক্স, পেট্রো, * পডো, প্লাট, রস,
চেলিড, * চিন, চিন-সল, কোন,	সিলি, সোব, ষ্টাক ।
ড্রস, ডলক, ইউপ-পার্কো, ফের,	স্বাদ, লবণাক্ত :—আর্স, কার্কো,
জেলস, গ্রাক, হিপ, ইপি, লাক,	চিন, মার্ক, ষ্টিট-মিউ, সিপি ।
লাইকো, ম্যাগ-কা, মার্ক, ষ্টিট-	স্বাদ, সাবানেব ন্যায় :—ক্যাক্তি ।
মিউ, নাইট-এসি, * নক্স, ফস-	স্বাদ, অম্ল :—ক্যাক, ক্যাপ, ক্যাম,
এসি, পলিপ, সোর, পলস, রস,	গ্রাক, ইথ, আইওড, লাক, *
আবিন, ষ্টাক, সলফ, থুজা ।	লাইকো, ম্যাগ-কা, * নক্স, পেট্রো,
স্বাদ, তিক্ত, ধূমপানাস্থে :—এনাক,	ফস, পডো, সিপি, থুজা ।
পলস ।	প্রাণিতবস্ত্র দিলে দূব করিয়া
স্বাদ, তিক্ত, জল ব, তীত, অস্বাস্থ	দেওয়া :—* ক্যাম ।
দ্রব্যের :—একন ।	পিপাসা :—ক্যাক, চিন, সিক, সাইম,
স্বাদ, তিক্ত, মিষ্ট :—মেনি ।	* ডলক, সলফ, ভিরাট ।
স্বাদ, তিক্ত, তামাকের :—কক,	গলায়, ক্ষত প্রাবণতা :—* বারাক-কা ।
পলস ।	তামাকে অরুচি :—এলম, আর্গ,
স্বাদ, তাঁবটে :—কালী-বা ।	বেল, ক্যাক, চিন, ডাক, ইথ,
স্বাদ, বসাবৎ :—লাইকো ।	লেড, ষ্টিট-মিউ, নক্স, ফস, রস,
স্বাদ, লবণাক্ত মৎস্তের স্রাব :—	সিপি, স্পিজি, ষ্টাণ ।
এনাক ।	তামাকের স্বাদহীনতা :—এন্ট-টার্ট ।
স্বাদ, লোহার স্রাব :—সাইম ।	জিহ্বার ক্লষ্ণবর্ণ :—ইলাপস ।
স্বাদ, ধাতব :—কক, মার্ক, নক্স,	জিহ্বার রক্তস্রাব :—কিউর ।
পলিপ, রস ।	জিহ্বায় ফোকা :—ক্যাপ, কার্কো-
স্বাদ, পচা তৈলের স্রাব :—ইপি ।	এ, ক্যাম, * ষ্টিট-মিউ, থুজা ।
স্বাদ, পচা :—* আর্গ, বেল, ক্যাপ,	জিহ্বার বিস্তীর্ণতা ও প্রান্তভাগের
ক্যাম, ফেব, গ্রাক, হিপ, হাইওস,	বিদীর্ণতা :—কালী-বা ।
মার্ক, ষ্টিট-মিউ, নাইট-এসি, *	জিহ্বা, কপিশবর্ণ :—আর্স, ইলাট,

হাইওস, আইওড, লাইকো,
কস, ভিরাট।
জিহ্বার মধ্যস্থল কপিশবর্ণ, প্রান্ত
ভাগ কুভ্র :—আইওড।
জিহ্বার মধ্যভাগে কপিশবর্ণ
বেথা :—আর্ণ, ইউপ-পার্পু,
আইওড, ল্যাক, কস।
জিহ্বায় জ্বালা :—কার্কো-এ, সাইম।
জিহ্বায় দন্ধবৎ অনুভব :—সোব।
জিহ্বা দন্তের পশ্চাতে আটকিয়া
যায় :—ল্যাক।
জিহ্বা পবিকাব :—এলম, এগিস,
ক্যাক্ট, কষ্ট, চিন-সহ, ** সিনা,
ডিজি, ডুন, ইলাপস, জেলস, ইগে,
ইপি, লাইকো, ম্যাথ-কা, পলস,
সিকেল, ট্রাম, সলফ, * গুজা।
জিহ্বা গাঢ় লেপাবৃত :—* এণ্ট,
আর্ণ, ব্যাণ-কা, ব্রাই, ক্যাহ,
চেলিড, চিন, আইওড, কালী-বা,
মেজ, * নয়, দস, পলিপ।
জিহ্বা শীতল :—* ক্যাক্স, ক্যাক্সো-
ভে, * ভিরাট।
জিহ্বা আকুপ্ত :—কার্কো-ভে।
জিহ্বা বিদাবিত :—কিউব, লাইকো।
জিহ্বা শুষ্ক :—আর্ণ, * বেল ক্যাক্স,
কার্কো-ভে, কষ্ট, ডলক, লাইকো,
জাট-মিউ, + নল-ম, পডো, পলস,

ট্রাম।
জিহ্বা, শুষ্ক, পৃষ্ঠভাগে :—হিপাব।
জিহ্বা, শুষ্ক, প্রান্তভাগে :—কক
জিহ্বার প্রান্তভাগ আরক্ত :—**
এণ্ট-টার্ট, বেল, ক্যাহ, জেলস,
কস, সিকেল, * ভিরাট।
জিহ্বার প্রান্তভাগ আবৃত, মধ্য-
ভাগ কুভ্র :—বেল। [ভে।
জিহ্বা অল্প অল্প ফাটা :—কার্কো-
জিহ্বা, মলাবৃত ও মধ্যভাগেব
নিম্ন হইতে লাল বেধাক্তিত
:—* জার্স।
জিহ্বায় চুল থাকায় ন্যায় অনুভব
:—* গিলি।
জিহ্বা কণ্ডুবন :—সিড।
জিহ্বা বৃহত্তব :—পলস, ট্রামে।
জিহ্বা, সীস-বর্ণ :—+ কার্কো-ভে।
জিহ্বা, চিত্রবিচিত্র :—ল্যাক, জাট-
মিউ, * টাব।
জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত :—* পলস।
জিহ্বায়, পীতভ শ্লেষ্মা :—ক্যাক্স।
জিহ্বায় বেদনা :—কোন, গ্রাহ,
হিপ।
জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ :—* ইউপ-পার্কো,
কেব, ইপি, কালী-কা, * সিকেল।
জিহ্বা-কণ্টক সমুন্নত :—একন, *

এণ্ট-টার্ট, বেল, মেজ, মল্ল-ম ।
 জিহ্বা-কটক আরক্ত :—*একন,
 এপিস, বেল, মেজ, নল্ল, ট্রাম ।
 জিহ্বা বাহির করিতে পারা যায়
 না :—এপিস, ল্যাক, ট্রাম ।
 জিহ্বা, আকম্পিত :—*ওপি ।
 জিহ্বা, অবদীর্ণ :—* এপিস ।
 জিহ্বা, লোহিত :—*এণ্ট-টার্ট, *
 এপিস, *বেল, কিউব, ইলাপ্স,
 হাইওস, লাইকো, সলফ, *থুজা ।
 জিহ্বা লোহিত ও শুভ্র রেখা
 যুক্ত —** এণ্ট-টার্ট ।
 জিহ্বা-কেন্দ্রে লোহিত বেখা :—
 ফস-এসি ।
 জিহ্বা, খবম্পর্শ :—এনাক ।
 জিহ্বাব মধ্যভাগে লাল :—সাইম ।
 জিহ্বায় স্পর্শ-দ্রব :—* এপিস,
 ট্যাবাক্স ।
 জিহ্বায় মলিন, আবদ্ধ, অনুভব
 ধিকাবিশিষ্ট চিহ্ন :—টাব ।
 জিহ্বা, অটুচফ :—কোন, ডলক,
 লাইকো ।
 জিহ্বা, লকামরিচের গুডিক।
 বিক্ষিপ্তবৎ :—একন, এণ্ট-
 টার্ট, এপিস, * বেল ।
 জিহ্বার ক্ষীততা :—ডলক, সিক,
 ইলাপ্স, * থুজা, ভিরাট ।

জিহ্বার অগ্রভাগ নীলবর্ণ :—
 ভাবাদ ।
 জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ :—আর্স,
 ল্যাক, নল্ল, পলিপ, *রস, ভিরাট,
 সিকেল । [সিকেল, সোর ।
 জিহ্বার অগ্রভাগ শুক :—*রস,
 জিহ্বার অগ্রভাগে স্পর্শ-দ্রব :—
 *হিপ, কালী-কা, *থুজা, সাবাড
 জিহ্বার অগ্রভাগে ত্রিভুজাকার
 চিহ্ন :—*বস ।
 জিহ্বা, দন্তেব চিহ্নে চিহ্নিত :—
 চেলিড, * মার্ক, * পডো ।
 জিহ্বা, বিকম্পিত :—ক্যাম্ফ, ক্যাঙ্ক,
 ল্যাক, লাইকো, * ওপি ।
 জিহ্বায় ক্ষত :—ক্যাম্প ।
 জিহ্বার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোকা
 কষ্ট, লাইকো, সিপি, থুজা ।
 জিহ্বা, শুভ্র :—এনাক, ** এণ্ট,
 আর্গ, আর্স, ব্যারা কা, ক্যাক,
 কার্বো, চেলিড, চিল, সিনা, কক,
 ডিজি, ইউপ-পার্কো, ফের, গ্রাফ,
 ইপি, কালী-কা, ল্যাক, ম্যাগ্নি-কা,
 মেজ, ভাট-মিউ, নাইট-এসি, নল্ল-
 য, নল্ল, ফস, প্লাস্ট, পডো, পলিপ,
 * পলস, বস, সাবাড, সারাক,
 সিপি, সোর, সলফ, ষ্টাফ, ট্রাম,
 ভিরাট ।

জিহ্বা, শুভ্র কেল্লহলে, মলিন
রেখা পার্শ্বদ্বয়ে :—পেট্রো। [টাট ।

জিহ্বা, দুগ্ধবৎ শুভ্র :—** এণ্ট-
জিহ্বা, শুভ্র পার্শ্বদ্বয়ে, লাল মধ্য-
ভাগে :—ক্যাম ।

জিহ্বা, কেল্লহানে শুভ্র বা পীত-
বর্ণ, প্রাস্তভাগে পাণ্ডুবর্ণ :—
চিন-সল ।

জিহ্বা; কেল্লহানে শুভ্র বা পীত
বর্ণ; প্রাস্তভাগে লোহিতবর্ণ :
—চেলিড, জেলস ।

জিহ্বা পীতবর্ণ :—আর্গ, আর্স,
বোভ, ব্রাই, ক্যাঙ্ক, কার্কো,
সিড, ক্যাম, চেলিড, চিন, ইউপ-
পার্কো, ফের, জেলস, ইপি, কালী-
বা, জাট-মিউ, নাইট-এসি, *নক্স,
ওপি, * পডো, পলিপ, *পলস
সিকেল, সফফ, সোর ।

তালুনুলের কঠিনতা :—*ব্যারা-কা

মূত্রযন্ত্রের উপদাহ :—ক্যাঙ্ক ।

মূত্রস্রাবে কষ্ট :—*ক্যাঙ্ক ।

মূত্রস্রাব, বারংবার :—ক্যাঙ্ক, ক্যাম,
*ইউপ-পাপু, ফস-এসি, প্লাণ্ট ।

মূত্রস্রাব, বারংবার রাত্রিতে :—
*ফস-এসি । [পাপু ।

মূত্রস্রাবে বেদনা :—ক্যাঙ্ক, ইউপ-

মূত্রস্রাব, প্রভূত :—ক্যাঙ্ক, * ইউপ-
পাপু, *ফস-এসি ।

মূত্র, ক্লষ্ণবর্ণ :—ক্যাঙ্ক ।

মূত্র, কপিশবর্ণ :—ক্যাম্ফ, সাইম ।

মূত্র, বসাময় :—চিন-সল ।

মূত্র, হরিদবর্ণ :—ক্যাম্ফ, প্লাণ্ট ।

মূত্র, পাণ্ডুবর্ণ :—ক্যাম, * ইউপ-
পাপু, খুজা, * ফস এসি ।

মূত্র, লোহিতবর্ণ :—ব্রাই, ক্যাম্ফ,
*লাইকো, নক্স । [কা ।

মূত্র, লোহিত ও পীতবর্ণ :—কালী-

মূত্র, পীতভ :—ক্যাম্ফ ।

মূত্র, ঘোলা :—এণ্ট-টাট, ক্যাম,
চিন, সিনা, ডলক, গ্রাফ, ইপি, *
লাইকো, মার্ক, * জাট-মিউ **
নাইট-এসি । [নক্স ।

মূত্র, দুর্গন্ধময় :—* নাইট-এসি,

মূত্র, স্থল্ল :—* এপিস, ব্রাই, চিন,
লাইকো, জাট-মিউ ।

মূত্র, বিলুপ্ত :—ষ্ট্রাম ।

মূত্র, উত্তপ্ত :—সাইম *

মূত্র, ক্রিয়াকালপরে দুগ্ধাকার
ধারণ :—সিনা ।

মূত্র, ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ
:—চিন, চিন-সল, *লাইকো, *
জাট-মিউ ।

মূত্রে, শুভ্রবর্ণ অধঃশ্লেষণ (তলানি)
:—গ্রাক ।

মূত্রে, অশ্বমূত্রের ন্যায় গন্ধ :— *
নাইট-এসি ।

শীতপিত্ত :—*এপিস, *হিপার, *রস ।

ধীরেধীরে হাঁটিতে ইচ্ছা :—*ফের ।

উদ্ভিজ্জ আহারে স্পৃহা :—এলম ।

শিরার ক্ষীততা :—ফের ।

শিরোগ্রন :—একন, আর্গ, আর্স,

বেল, ক্যাক, কষ্ট, ক্যাম, কক,
কোন, ডাক, * ইউপ-পাপু; ফের,
হাইওস, লাইকো, নাইট-এসি,
নক্স, ওপি, পেট্রো, ফস, পলিপ,
পলস, রাণ-ব, সিগি, সিলি ।

শিরোগ্রন, বামদিকে পতনানুভব
সহ :—* ইউপ-পাপু ।

বমন :—এণ্ট, এণ্ট-টার্ট, চিন, সিনা,

* ইউপ-পার্কো, * ফের, হাইওস,
ইপি, * লাইকো, মার্ক, নক্স,
সিপি, সিলি, ভিরাট ।

বমন, তিত্ত :—চিন ।

বমন, পিত্ত :—আর্স, *ইউপ-পার্কো,
ইপি, মার্ক, নক্স, ভিরাট, ট্রাম ।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—আর্স, ক্যাম, *
ইউপ-পার্কো, * ফের, ইপি, নক্স,
পলস ।

বমন, শ্লেষ্মা :—মার্ক, নক্স, *পলস ।

বমন, অম্ল :—* লাইকো ।

দুর্বলতা :—একন, * এলম, এপিস,

আর্গ, * আর্স, ব্যারা-কা, ক্যাক,
ক্যাম্ফ, * কার্কো-এ, * কার্কো-
ভে, সিড, * চিন, চিন-সল, ডিজি,
ইউপ-পার্কু, * ফের, * জেলস,
ইগ্নে, আইওড, ইপি, লাইকো,
* ভাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স,
পলিপ, ভিরাট, সলফ ।

বিলাপ-প্রবৃত্তি :—সিনা, নক্স ।

কুমির লক্ষণ :—সিনা ।

সন্নিপাত জ্বর ।

অক্ষি, নিমগ্ন, ও পাণ্ডুব প্রান্তশনি-
বেষ্টিত : আর্স, ভিরাট ।

" প্রসন্ন ও প্রদীপ্ত : বেল, ওপি ।

" অলস ও দীপ্তশূন্য : কার্কো-ভেজি ।

" তিথ্যগ্ দৃষ্টি : হাইওস ।

" দৃষ্টি-ক্ষাণতা : হাইওস, ষ্ট্রাম, জিঙ্ক ।

অঙ্গৈ, বেদনা : ক্যান্ফ, রস ।

" পক্ষাঘাতবৎ অনুভব : কক, রস ।

" আক্ষেপিক সঞ্চালন : বেল, হাই-
ওস, ইথের, মফ, * জিঙ্ক ।

অবসন্নতা, অত্যন্ত : এপিস, আর্স,
ব্রাই, (মার্ক), ফস, * ফস-এসি, রস ।

অবস্থিতি, ঘন ঘন পরিবর্তিত :
আর্গ, ব্রাই ।

" অস্থিরতা : ব্রাই, ষ্ট্রাম, রস ।

" শব্দ্যার নিম্নভাগে সারয়া যাওয়া :
এপিস, মিউব এসি, জিঙ্ক ।

আমাশায়িক উপসর্গ, বিবমিষা,
বমন : আর্স, * ব্রাই, হাইওস,
ভিরাট ।

" আমাশয়-গহ্বরে বেদনা : আর্স,
* ব্রাই, রস, ভিরাট ।

উৎকর্ষা, অস্থিরতা, ও পলায়ন-
প্রবৃত্তি : আর্স, * বেল, ব্রাই,
* হাইওস, মার্ক, ষ্ট্রাম ।

উদর, বেদনা : আর্স, * মার্ক, ফস-
এসি, রস, ভিরাট ।

" কুজন (ডাকা) : আর্স, * কার্কো-
ভেজি, * ফস, * ফস-এসি, রস,
টেবেব ।

উদরাময় : এপিস, আর্স, (ব্রাই),
কার্কো-ভেজি, ইপিকাক, ফস-
এসি, রস ।

" অনৈচ্ছিক : এপিস, * আর্গ,
আর্স, কার্কো-ভেজি, ফস-এসি,
রস, জিঙ্ক । [এর্সি, রস ।

" রক্তমবঃ (মিউব-এসি, ফস, নাইট-
পুশময় (অস্ত্রে ক্ষত) : এপিস,
আর্স, কার্কো-ভেজি, * নাইট-
এসি, ফস, রস, সলফ ।

" হ্রিত : এপিস, আর্স, কার্কো-
ভেজি, ফস ।

ওষ্ঠ, কৃষ্ণ, কপিশ, বা বিদারিত :
আর্স, ল্যাক, ফস-এসি, জিঙ্ক ।

ওদাম্ব, সম্পূর্ণ : এপিস, * আর্স *
কার্কো-ভেজি, কক, হাইওস, ওপি,
ফস-এসি, ষ্ট্রাম । [ভির ।

কর্ণ, বধিরতা : আর্গ, ফস, ফস-এসি,
" প্রতিশক্তির স্বল্পতা : ব্রাই, কার্কো-
ভেজি, ফস-এসি, রস ।

- ক্রতিশক্তির আতিশয়া : ব্রাই ।
 কর্ণ-মূলপ্রদাহ : একন, বেল,
 ক্যালক-কার্ক ।
 কথা, বলিতে অপ্রবৃত্তি : ফস-এসি ।
 " বলিতে অশক্তি : এপিস ।
 কাস, আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় :
 ইপিক, সলফ । [লাইকো, ব্রাই ।
 কোপনতা ও বিবাদপ্রবণতা : বেল
 কোষ্ঠবদ্ধ : এপিস, * ব্রাই, কক ।
 জিহ্বা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত : হাইওস,
 মিউব-এসি ।
 " শুষ্ক : আর্স, * রস, মিউব-এসি ।
 " গাটলেপারিত : ব্রাই, কার্কো-
 ভেজি, বস ।
 " প্রায় পরিচ্ছন্ন : ককিউ ।
 " উপকৃত সংযুক্ত : মিউব-এসি, সলফ
 তালুমূলপ্রদাহ, মলিন আবৃত্ততা :
 একন, বেল ।
 " পাণ্ডুর আবৃত্ততা ও তালুমূলে ক্ষুদ্র
 ক্ষুদ্র শুভ্রকৃত : ব্রাই ।
 নাসিকা, রক্তস্রাব : ব্রাই, কার্কো-
 ভেজি, হেম, ফস-এসি ; মার্ক
 (রাত্রিতে) ।
 " রক্তে কাল মামড়ি : হাইওস, জিহ্বা ।
 নিদ্রালুতা, এপিস, আর্স, কার্কো-
 ভেজি, কক, ল্যাক, ওপি ।
 পীড়কা, আশঙ্কিত : ব্রাই, ক্যাক,
 লাইকো ।
- " লোহিত : ফস-এসি, রস, ট্রাম ।
 " শুভ্র : এপিস, ব্রাই, মিউব-এসি,
 ভেলার ।
 " নীলাভ : কার্কো-ভেজি, ভিরাট ।
 " বার্তাকুণ, কালশিরা : আর্স, ব্রাই,
 কার্কো-ভেজি, ফস-এসি, জিহ্বা ।
 পেরিটোনাইটিস : আর্স, বেল,
 কার্কো-ভেজি, ইপি, ওপি ।
 প্রলাপ, প্রচণ্ড : বেল, ওপি, ট্রাম ।
 " অবাস্তব বস্তু দর্শন : বেল, হাই-
 ওস, বস ।
 প্লীহা, ক্ষীত : আর্স, * ককিউ, *
 ফস-এসি, রস ।
 ফুসফুসের, বোং : এপিস, আর্স,
 * ব্রাই, কার্কো-ভেজি, ইপি,
 ল্যাক, মন্স, নাইট-এসি, * ফস,
 * রস, সেনেগা ।
 " যকৃতের আকৃতি ধারণ : ল্যাক,
 নাইট-এসি, * ফস, রস ।
 " কাস, নিদ্রাবন সংযুক্ত : আর্স,
 ল্যাক, ফস, রস, সেনেগা ।
 " বক্তাক্ত নিদ্রাবন : ল্যাক, ফস, রস ।
 " শোথ : কার্কো-ভেজি, এন্ট-টাট ।
 বিষাদ, ও যাতনা : বেল, পলস ।
 মুখমণ্ডল, আরক্ত : বেল, নক্স-ভম,
 ওপি, রস ।
 " পাণ্ডুর ও নিমগ্ন : আর্স, ফস-এসি,
 ভিরাট, জিহ্বা ।

মুত্র, অণ্ডলালময় : ফস-এসি, ব্রস।

" কপিশ-আবৃত্ত : ব্রাই, ভিরাট।

" জলবৎ : ব্রাই, মিউর-এসি।

" অনৈচ্ছিক : এপিস, আর্গ, আর্স।

যক্ৰদ্রোগ : মার্ক।

রক্তস্রাব, অজ্ঞ হইতে : * নাইট-

এসি, ফস-এসি, আর্স কার্বো,

ইপি, ফস।

শয্যা-কৃত : আর্স, ফস-এসি, জিঙ্ক,

ফ্লোর-এসি।

শোথ, অধঃশাখার : আর্স, চায়না,

লাইকো, সলফ।

স্ফোটক : আর্স, বেল, লাইকো,

সিলি, সলফ।

স্মৃতিহীনতা : এনাকার্ড।

হনু, নিম্নহনু বুলিয়া পড়া (মস্তিষ্কের

পক্ষাঘাতের আশঙ্কার লক্ষণ) :

আর্স, কার্বো-ভেজি, ল্যাক, লা-

ইকো, * ওপি, * জিঙ্ক।

জ্বর-রোগে ব্যবস্থেয়

প্রধান প্রধান ঔষধের

প্রয়োগ-লক্ষণ ।

আইওডিন ।

পাণ্ডুবর্ণ, যাতনাবাজক মুখাকৃতি; অধিক লালাস্রাব; অতিবিক্ত ক্ষুধা, কিছুতেই ক্ষুধাব নিবৃত্তি জন্মে না; আহারে বিলম্ব হইলে বোঁগী অবসন্ন হইয়া পড়ে । অধিক আহার সম্বন্ধে রোগীব দিন দিন শীর্ণতা জন্মে । বাম কুক্ষি প্রদেশ টিপিলে শক্ত ও ব্যথিত বোধ হয় । দুই দিন অন্তর জ্বরে বিরামের দুইদিন উদরাময় অথবা ত্রাহিক জ্বরে কেবল শীত ও তাপ; অবসহকারে যকৃত বা ক্রোমেব রোগ অথবা জ্বান্তে উদরী বা শোথ থাকিলে; বিশেষতঃ প্লীহার রোগ থাকিলে আইওডিন ব্যবহৃত হয় । গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তা নারীগণেব পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হয় । আইওডিনেব লক্ষণ সন্ধ্যাকালে, আহারের পূর্বে, উপবাসে, ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে, উত্তাপে, মস্তকানবণে ও দ্রুত গমনে বৃদ্ধিপ্রাপ্য, এবং শীতল বাতাসে বা শীতল জল প্রয়োগে, মস্তক অনাবৃত করিলে, আহাবান্তে, ও শয্যা হইতে উত্থানে হ্রাস পড়ে ।

আজুফুরা ।

জ্বরে পৃষ্ঠ, হস্ত, ও হস্তাঙ্গুলী এবং পায়ের পাতা ঠাণ্ডা থাকিলে এবং কণ্ঠে হাঁটু ও পায়ের আজুলে খাল ধরিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । জজ্বা

ঘরে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব, এবং সামান্য পরিহাসেও অসহ্যতা ইহাব
বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ ।

জ্বরের লক্ষণ ।—অপসাহ তিনটার সময় শীত, তৎপরে অল্প অল্প
তাপ । কম্প ও অতিশয় পিপাসা, তৎপরে তাপবিস্তার অভাব । শীতের
পূর্বে পিপাসা । তাপাবস্থায় কেবল মাথা উষ্ণ থাকে, দেহ ও গাল শীতল
থাকে, কপাল ও শঙ্খস্থল কামড়াষ, তৃষ্ণা থাকে । শেষ রাত্রিতে ও কেবল
কপালে ঘর্ষ হয় ।

আরেনিয়া ডায়েডিয়া ।

আরেনিয়া প্রযুক্ত্য জবে প্রায়ই উদ্ভাপ বা ঘর্ষাবস্থা বিদ্যমান থাকে
না, কেবল শীতাবস্থাই বর্তমান থাকে । এই শীত অনেকক্ষণ থাকে এবং
কিছুতেই কম পড়ে না । এই ঔষধ জ্ঞাপক জবে পিপাসাও থাকে না ।
যদি কখনও অল্প তৃষ্ণা জন্মে তবে তাপাবস্থায়ই জন্মিয়া থাকে । হিম লাগিয়া,
জলে ভিজিয়া, অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া কাজ কবিয়া অথবা দৈন্তর্মেতে
ঘরে বাস কবিয়া জ্বর হইলে আরেনিয়া উপযোগী ।

বিশেষ লক্ষণ ।—শিরঃপীড়া ও মস্তকে দিশৃঙ্খলা অনুভব; তামা-
কের ধূম পানে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম, রাত্রিতে উপবের ও নীচৈব
দস্ত শ্রেণীতে সহসা বেদনা । হ্রাসবৃদ্ধি ।—শীত ও বর্ষাকালে; অনুপস্থলে,
ও শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি । তামাকেব ধূমপানে ও অনাবৃত বায়ু দেননে
উপশম । জ্বরের সময় ।—প্রতিদিন বা এক দিন পব একদিন ঠিক
একই সময়ে জ্বরের প্রকাশ (সিউন) । জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাথমিক
বা দ্ব্যাহিক জব ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিস্তার জ্বর ।—অনেকক্ষণ স্থায়ী তৃষ্ণাশূন্য
শীতাবস্থা; দাহ ও ঘর্ষাবস্থাব প্রায়ই অবিদ্যমানতা; প্রতিদিন বা এক দিন
পর একদিন ঠিক একই সময়ে জ্বরের উপস্থিতি; সর্বদা শীতানুভব, বৃষ্টি ও
শীতল দিনে উহার আতিশয্য (বস); শিরোবেদনা, অনাবৃত বায়ুতে উহাব
উপশম; রাত্রিতে দস্ত-বেদনা; অল্প অল্প লেপাবৃত জিহ্বা, মুখে তিক্ত আশ্বাদ,

তামাক খাইলে উষ্ণতা শক্তি, আহারে অরুচি ; আমাশয়-প্রদেশে প্রস্তর চাপের জ্বায় ভারবোধ (ব্রাই, আর্স, পলস), শ্রীহাব বিবুদ্ধি ; ক্রীলোকদিগের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব ; হস্তপদাদির অতিশয় গুরুত্ব, বোধ হয় যেন হাত পা নাড়িতে পারা যাইবে না । প্রত্যহ একই সময়ে শীতসহ কাস, অনিদ্রা, ও দুর্বলতা ; প্রত্যহ একই সময়ে নীচের কর্তন-দৃষ্টে কষ্টপ্রদ শীতলতা অনুভব, জ্বাযু ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব ।

আর্জেন্টম নাইট্রিকম ।

যেন শরীর, বিশেষতঃ মস্তক ও মুখমণ্ডল বৃহত্তর হইতেছে এমন অনুভব ; গলা যেন স্নীত হইয়াছে অথবা উহা অভ্যন্তরে যেন একখণ্ড কাষ্ঠের চটা রহিয়াছে এপ্রকার বোধ, উদবানয় । প্রতিনিয়ত বা থাকিয়া থাকিয়া শীত ও সর্বদা বিবমিষা । এইগুলি এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ । সবিরামভাবে ফুসফুস হইতে বক্তপাতে ও ইহা ব্যবহৃত হয় । ডাঃ সালজার বলেন যে ম্যালেরিয়া দোষে ও তন্দ্রানিভ যকৃতের নিবোসিস রোগে আর্জেন্টম নাইট্রিকম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

আর্গিকা মণ্টেনা ।

বিশেষ লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সবিরাম ও সন্নিপাতজ্বরে আর্গিকা ব্যবহৃত হয় । লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে কুইনাইন আটকান আরে এই ঔষধ ব্যবহার কবিলে সুন্দর উপকার দর্শে । দীর্ঘকাল পূর্বের উপঘাতের বেদনা অবকালীন উপস্থিত বা বিবর্জিত হইলে আর্গিকা সেবনে বেদনা ও জ্বর উভয়েবই প্রতিকার জন্মে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—স্নায়ু-প্রধান ধাতু, অল্পবেদনা অধিক করিয়া অনুভব । পেশীর বেদনা, অতি দৌর্বল্যবশতঃ সর্বদা শয়নের প্রবৃত্তি, অথচ শয্যা শক্ত বোধ হওয়াতে সতত এপাশ ওপাশ করা । শরীরের উজ্জ্বল উষ্ণ, নিম্নাংশ শীতল, যথা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ, কিন্তু দেহ শীতল । অচৈতন্য, কিছু

জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর দান, কিন্তু পরক্ষণেই আবার জ্ঞানশূন্যতা ও প্রলাপ । স্পর্শ-বিষেব । আঘাত বা পতনজনিত রোগ । হ্রাস-বৃদ্ধি ।—
বিশ্রামে, শয়নে ও সুরাপানে বৃদ্ধি । সংস্পর্শে ও সঞ্চালনে উপশম ।
জ্বরের সময় ।—প্রায়ই রাত্রি চারিটার সময় বা প্রত্যুষে ; অথবা বৈকালে
বা সন্ধ্যাকালে অব্যব উপস্থিতি । জ্বরের প্রকৃতি ।—একদিন বা দুইদিন
অন্তর জব । রক্তসঞ্চয়বিশিষ্ট (কঞ্জেষ্টিব) জ্বর ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—সন্ধ্যাকালে শীত । শীতের

পূর্বে ও শীতাবস্থায় পিপাসা । জ্বরকালীন অবিবত অবস্থান পরিবর্তনের প্রবৃত্তি ।
অঙ্গগ্রহ, বোগীর বোধ হয় যেন তাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে । শয্যা বা
খট্টা অতিশয় কঠিন বোধ হয় । পাচা ডিম্বের তায় আশ্বাদবিশিষ্ট : উদগাব
(গিপি, সলফ) । সন্নিপাতজ্বর ।—হতবুদ্ধিতা ও অতিশয় উদাসীনতা
(কস-এসি) । শুষ্ক জিহ্বা ও তাহার মধ্যভাগে কণিশবর্ণ রেখা । মনোজ্ঞাবের
বিশৃঙ্খলা, কিছু বলিদায় সময় বক্তব্য কথা বিন্মবণ (বাক্য শেষ না হইতে
হইতে নিদ্রাবেশ * ব্যাপ্ট) । * সর্বাঙ্গে বেদনা ও ঘৃষ্টতা অনুভব এবং তজ্জন্ত
বারংবার পার্শ্বপরিবর্তন । চেতনাবস্থায় বোগীব নিকট শয্যা শক্ত অনুভূত
হয় (ব্যাপ্ট) ; অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসরণ ।

আর্গিকা ও ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটেমে প্রভেদ ।—
কম্পকালে দুই ঔষধেই তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে কিন্তু জলপান কবিলে আর্গি-
কায় বমন ও ইউপেটোরিয়মে বিবনিবা জন্মে । উত্তাপাবস্থায় দুই ঔষধেই
গাত্র-বেদনা বৃদ্ধি পায় ; ঋক্ষান্তে ইউপেটোরিয়মের শিরোবেদনা ভিন্ন অগ্রাগ্র
বেদনা অন্তহৃত হয় , (ঘর্ষেব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেদনার বিলোপ জাট-মিউ) ।
বিরামাবস্থায় কোন প্রকার বেদনাই থাকে না । আর্গিকায় বিরামাবস্থায়
শিরঃপিড়া ও পেশীববেদনা অবশিষ্ট থাকে ।

আর্সেনিকম ।

সামান্য তরুণ জরে একোনাইট বেরুপ উপকারী, উৎকট জরে আর্গেনিক
সেইরূপ কলপ্রদ । সন্ততজ্বর, ফেটিজর, বা সন্নিপাতজ্বর, ইহার যে কোন

জ্বরে, সন্নিপাত, লক্ষণ, " বিশেষতঃ শুষ্ক জিহ্বা ও উদরাময় (সচরাচর অজ্ঞাত-সারে মলস্রাব) প্রকাশ পাইলেই আর্সেনিক ব্যবহেয় । মধ্যাজ্ঞ-ক্লম রোগ ও যক্ষ্মাজনিত বিলেপীজ্বরেও ইহা উপযোগী । পুরাতন বিষমজ্বরেও এই ঔষধি অতিশয় উপকারী । জ্বরের অবস্থাত্রয়ের কোন এক অবস্থার অবিক্রান্ততা, জ্বালাকর দাহ, ত্রুত অবসাদন, নিশ্বেজতা, দুর্বলতা, শোথ, পুতিবাম্পজ ষাডু-বিকৃতি, অতিরিক্তঃকুইনাইন সেবনজনিত ষাডু-দোষ, আর্সেনিক প্রয়োগ করিবার লক্ষণ । আর্সেনিক জ্ঞাপক জ্বরে শীত ও তাপাবস্থার প্রায়ই পিপাসা থাকে না । শীতাবস্থায় উষ্ণ পানীয় দ্রব্য ভিন্ন শীতল জলের পিপাসা থাকিলে আর্সেনিক অব্যবহেয় । আর্সেনিক প্রযুক্তাজ্বরে জ্বরের অবস্থাত্রয় বিদ্যমান থাকে না । প্রায়ই শীতাবস্থার অভাব দেখা যায় । শীতাবস্থা প্রকাশিত না হইলে তাপাবস্থার আদিক্য ও দীর্ঘস্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় এবং অতিশয় গাত্র-দাহ ও দুর্নিবার পিপাসা জন্মে । ম্যালেরিয়া জ্বর ; অধিক কুইনাইন দ্বারা আবদ্ধ জ্বর ; ম্লীহা, বক্কৎ, শোথ, উদরাময়, মুত্র-রোগাদি উপসর্গ সংযুক্ত পুরাতনজ্বর ; ছদ্মজ্বর অর্থাৎ এক পালায় জ্বর, অপর পালায় ঠিক জ্বরের সময় জ্বর না আসিয়া তৎপরিবর্তে উদরাময়, আমরক্ত, ঝায়াশূল, বা হিকা ; কুইনাইন অপব্যবহৃত, শীত ও তাপের আতিশয়াবিশিষ্ট, ঘর্ষপরিশৃঙ্খ জব প্রভৃতিতে সচরাচর আর্সেনিক ব্যবহৃত হয় । উত্তপাবস্থার যতই আদিক্য, পিপাসার যতই অনিবার্যতা, এবং গাত্র-দাহের যতই প্রাবল্য থাকে ততই আর্সেনিক অধিক উপযোগী হয় ।

বিশেষ লক্ষণ ।—অতিশয় দুর্বলতা, শীঘ্র শীঘ্র জীবনীশক্তির অবসাদন ; মোহ ; বিমর্ষ, হঃখিত, নিরাশ, অস্থির, উদ্বিগ্ন, ভয়াকুলিত, অশ্বচ্ছন্দ, সহজে বিরক্ত, ক্রমে ক্রমে প্রকুণ্ড, এবং মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত চিত্ত ; অগ্নি-দাহের জ্বায় জ্বালা ও বেদনা ; দুর্নিবার পিপাসা ও বারংবার অল্প অল্প জলপান ; আহার বা পানাস্তে উদরাময়,—মলিনবর্ণ, দুর্গন্ধময়, অল্প মল নিঃসরণ ; মল নিঃসরণের পর অবদলতা ; অস্থিরতা, একস্থানে বা একভাবে স্থির থাকিতে না পারা ; অল্প পরিশ্রমে অধিক শ্রান্তি ; অতীব শীর্ণতা এবং তৎসঙ্গে সঙ্কে শীতল ঘর্ষ ও দুর্বলতা । ত্রাসবুদ্ধি ।—রাত্রি হই প্রহরেরপর, শীতলতায়, শীতল পানাহারে ও স্থস্থিরতায় বৃদ্ধি । উত্তাপে ও সঞ্চলনে উপশম । জ্বরের সময় ।—সকল সময়, প্রায়শঃ অপরাহ্ণ একটা হইতে হইটা

পর্যন্ত; ৩টা হইতে ৬টা পর্যন্ত; রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত ।
জ্বরের প্রকৃতি ।—ঐক্যিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থিক, পাক্ষিক,
বার্ষিক, অগ্রগামী, বা অনিশ্চিত জ্বর; কুটনাইন অপসেবিত স্বল্পবিরাম বা
অবিরাম জ্বর ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—প্রত্যহ অপবাহু তিনটার
সময় শীত, (এপিস, চায়না, নক্স-ভম, পলস, * শ্রাবা) । * কেবল দাহাব-
স্থায় পিপাসা, বারংবার অল্প অল্প জলপান (চায়না) । জ্বরকালীন অতিশয়
অস্থিরতা, অস্থিতে কটিতে, ও কপালে বেদনা । নিদ্রার প্রারম্ভে শীতল,
আঠাবৎ অল্প-গন্ধ ঘর্ম । * জ্বরের আব্রোশাস্তে অত্যন্ত দুর্বলতা । সন্নিপাত
জ্বর ।—পাণ্ডুবর্ণ, কুঞ্চিত, অন্তঃপ্রবিষ্ট, শ্রাব বা জ্বং পীতবর্ণ, অথবা নীলাভ
সীসবর্ণ মুখমণ্ডল । কপালে শীতল ঘর্ম । অবিরত ওষ্ঠ লেহন, ওষ্ঠ মলিন,
শুক ও বিদারিত, দন্তে দন্ত-শর্কবা । শুষ্ক, কুঞ্চিত, নীলাভ বা কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা
ও উহা বহির্গত করিতে অসমর্থতা । * দুর্নিবাব পিপাসা, বারংবার অল্প অল্প
করিয়া জলপান । অচেতন বা মূঢ়প্রলাপ, ও অজ্ঞকম্প । * অত্যন্ত দুর্বলতা
বা সম্পূর্ণ অবসন্নতা । * অতিশয় মানসিক যন্ত্রণা, অত্যন্ত অস্থিরতা, এবং
মূঢ়াভাব ।

আর্সেনিক ও সিল্কোনিয় প্রভেদ ।—আর্সেনিক ও সিল্কোনিয়
সংক্ষিপ্ত প্রভেদ এইঃ—আর্সেনিকে জ্বরের (১) আক্রমণের পূর্বরাত্রিতে
নিদ্রালুতা, (২) জ্বরের পূর্বে পিপাসাহীনতা; (৩) বাহ্যিক উত্তাপে শীতের
উপশম; (৪) শীতাবস্থায় বারংবার অল্প অল্প উষ্ণ জলপান; (৫) শীত ও তাপ
বিস্মিত, অথবা একবার শীত, একবার তাপ; (৬) তাপাবস্থায় অনাবৃত
হইতে ইচ্ছা ও তাহাতে উপশম; এবং দুর্নিবাব পিপাসা; (৭) প্রায়ই
ঘর্ম্মাভাব, অথবা অল্প ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা; (৮) জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায়
অত্যন্ত দুর্বলতা; ও জলবৎ অতিসাব বিদ্যমান থাকে । সিল্কোনিয় (১) জ্বরের
আক্রমণের পূর্বে রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা; (২) জ্বর আসিবার পূর্বে অতিশয়
পিপাসা; (৩) বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি; (৪) শীতাবস্থায় পিপাসা-
হীনতা ও জলপানে বিবতি; (৫) অধিককালস্থায়ী উত্তাপ ও নিদ্রা; মস্তকে
রক্তাধিক্য বশতঃ শিবঃপীড়া ও আবল্য, (৬) তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে

ইউপেটোরিয়ম পাপুরিয়ম ।

৬

ইচ্ছা, কিন্তু অনাবৃত্ত হইলে শীতাত্তব (জরের সকল অবস্থায়ই অনাবৃত্ত হইলে শীতাত্তব, নল্প); তাপাবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণার অভাব, কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক; (৭) দুর্বলকর প্রভূত ঘর্ষ (প্রভূত ঘর্ষ অথচ দুর্বলকর নহে, মাষু); ঘর্ষাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা; (৮) বিরামকালে সহজেই ঘর্ম্মের উদ্রেক, অথবা রাত্রিতে ঘর্ম্ম; উদবেগ উভয় পার্শ্বে বেদনা, ও সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা; এই সকল লক্ষণ অবস্থিতি কবে।

আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন ।

একদিন সবিরামজব অন্তদিন জব না হইয়া জরের পরিবর্তে স্নায়ুশূল, উদরাময়, অজীর্ণ, রক্তাতিসার প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ম্যা। লেরিয়া জনিত কুটিকিংসিত বিমিশ্র প্রকৃতির সবিরাম জরে ও দুর্বল প্রাচুর্য জরে আর্সেনিক ও চায়না, এই দুই ঔষধ জাপক লক্ষণই প্রকাশ পাইলে তাৎ হেল আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন ব্যবহারের বিধি দেন। জ্বর জবে লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্বাচন করিতে গেলে আলেয়ার অনুসরণের স্থায় প্রায়ই প্রতিনিয়ত ঔষধ পরিবর্তন করিতে হয় অথচ তাহাতে কোন ফল দর্শন। এজন্য, বোগেব মূলে আঘাত করিতে হইলে প্রথমে রোগেব মূল কারণ বা বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে ঔষধ নির্দ্ধাবিত করিয়া তৎপরে উহার লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা হইলেই রোগ নিমূল হয়।

ইউপেটোরিয়ম পাপুরিয়ম ।

বিশেষ লক্ষণ ।—পৃষ্ঠে শীতের আবৃত্ত। জ্বরের সময় ।—অপর্যাহ তিনটা হইতে পাঁচটা। দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়। জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক; ১। ২ দিন অন্তর; একদিন কম অন্তদিন বেশি জর, দুইদিন জর একদিন বিরাম।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—পৃষ্ঠে শীত আরম্ভ হইয়া সর্বশরীরে বিস্তার (ক্যাপ) । * অপেক্ষাকৃত অল্প শীত সহকারে অধিক কম্প ; শীত ও উত্তপ্ত অবস্থায় পিপাসা ; শীত ও উত্তপ্ত অবস্থায় অস্থিতে তীব্র বেদনা ; মস্তক লঘু অনুভূত হয় এবং বোধ হয় যেন উহা বায়ুপার্শ্বে পতিত হইবে । বাব বাব অধিক পরিমাণে উষ্ণ প্রস্রাব ত্যাগ, ও তৎপরে অতিশয় দুর্বলতা, উত্তাপ-বস্থায় অশ্রুস্রাব । মূত্রাশয়ে অল্প অল্প বেদনা । জ্বরের পূর্বে ও অবকালীন থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাস । উত্তাপাবস্থার অবসানে অতিশয় ক্ধা (সিনা, সিকোনা) ।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ও ইউপেটোরিয়ম পার্ফুরিয়েটেমে প্রভেদ ।—ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটেমে জ্বরের পূর্বে তৃষ্ণা এবং পৃষ্ঠে ও অস্থিতে বেদনা , কম্পকালে শীতল জল পানের তৃষ্ণা ; উত্তাপ-বস্থায় নিদ্রা ও পিপাসাব অভাব, ও বিবামাবস্থায় শিরোলক্ষণের অভাব থাকে । ইউপেটোরিয়ম পার্ফুরিয়েটেমে জ্বরের পূর্বে হস্তপদের অস্থিতে বেদনা ও থাকি য থাকিয়া শুষ্ককাস ; কম্পকালে পিপাসা-পবিশ্রুতা বা অল্প পানীয়ে প্রবৃত্তি ; উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা ; বিরামকালে শিবোষুর্গন ও মাথা যেন বামদিকে পড়িয়া যাইবে এরূপ অনুভব ; এবং বারবার জ্বালাকর মূত্রত্যাগ লক্ষণ থাকে ।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ।

রুদ্ধ ও ভগ্নস্বাস্থ্য বিশেষতঃ অপরিমিত সুরাপান জন্ত ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদ্বি-গের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম উভয় প্রকার জ্বরেই ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয় । সবিরাম অবস্থায় **জ্বর**-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, অথবা সবিরাম জ্বর আবদ্ধ হইয়া বিলেপী জ্বরে পরিণত হইলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । অস্থি-বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ । অস্থি-বেদনাব যতই প্রাবল্য ও সর্বশরীরে পরিব্যাপ্তি থাকে ততই ইউপেটোরিয়ম বিশেষ উপযোগী হয় । ডেঙ্গু জ্বরের অস্থি-বেদনাও এতদ্বারা নিবারিত হয় । ইহার পবে ছাট্রিম মিউরিয়েটিকম ও সিপিয়া ভাল খাটে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—পৃষ্ঠ, হস্ত-পদ, মণিবন্ধ, বক্ষঃস্থল, অক্ষি-গোলক, ও মস্তকের অস্থিতে বেদনা । অস্থি-বেদনা সহকারে ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের জ্ঞান

শিরঃপীড়া ; কোষ্ঠবদ্ধ, ও বক্রদেশে বেদনা । (ব্রাইওনিয়া ও ইউপেটোরিয়মে প্রভেদ এই যে, ব্রাইওনিয়ার ঘর্ষের প্রাচুর্য, বেদনা জন্ত রোগীর স্থিরতা ; ইউপেটোরিয়মে ঘর্ষের অল্পতা বা অভাব, ও বেদনা বশতঃ রোগীর অস্থিরতা থাকে) । ক্রাস-রুদ্ধি ।—নড়িলে চড়িলে ও শরীর অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি । জ্বরের সময় ।—পূর্নাক্ষ ৭টা, অথবা একদিন ৭টা বা ৯টা (প্রবল), অল্পদিন ১২টা (অপ্রবল) ; অপরাহ্ন ২টা হইতে ৫টা । জ্বরের প্রকৃতি । প্রাত্যহিক, ১।২ দিন অন্তর, সর্কবিধ, একঘণ্টা অগ্রগামী জ্বর ; বর্ষাকালের ও জলাস্থানের জ্বর ; ম্যালেরিয়া জ্বর ; কুইনাইন, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ চাপা জ্বর ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীতের কতিপয় ঘটিকা পূর্বে পিপাসা, শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা ; শীতাবস্থায় অঙ্গুলীর অনম্যতা ; সাধাবণতঃ পূর্নাক্ষ ৭টা বা ৯টাব সময় জ্বরের উপস্থিতি (পূর্নাক্ষ ১০টার সময় জ্বরে ত্রাট-মিউ) । শীতাবস্থায় পৃষ্ঠে ও অঙ্গে তীব্র বেদনা, বোধহয় যেন অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । ঘর্ষের অল্পতা বা অভাব । শীতাবস্থায় অঙ্গেনে পিত্ত বমন । স্বল্পবিরাম জ্বর ।—শৈত্যিক লক্ষণাপন্ন ও অস্থি-বেদনাবিশিষ্ট স্বল্পবিরাম জ্বর । মস্তকেব পশ্চাত্তানে বেদনা, জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ, জলপানান্তে বমন, বক্রদেশে পূর্ণত্ব ও বেদনা অহুভব, সঞ্চলনে বক্রতে হটী-বেধ, প্রস্রাবের অল্পতা ও গাঢ়তা ইউপেটোরিয়মের লক্ষণ ।

ইউফরবিয়ম ।

সর্কাক্ষে অবিরত শীত, শীতলহ ঘর্ম, সর্কদা বিবস্মিমা, হাত শীতল ; তাপের আভিশয়া, উত্তাপাবস্থায় শবীর ও পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ভারবোধ ; প্রাতে সর্কাক্ষে ধাম, ও অল্প অল্প তৃষ্ণা, ঘর্ষে দুর্গন্ধ । আহারে, বিশেষতঃ বসাদ্রব্যে অরুচি । এই ঙ্গলি ইউফরবিয়ম জ্ঞাপক জ্বরের লক্ষণ ।

ইয়েশিয়া ।

শো ক, দুঃখ, দিবছাদি জনিত জ্বর ; একপ্রকৃতির জ্বর পরিবর্তিত হইয়া অল্প প্রকৃতি ধারণ ; দ্ব্যাহিক জ্বরেব ত্র্যাহিকে পরিণতি, জ্বরের সময়ের

পশ্চাৎদিক্ ; ও কুইনাইন অপপ্রয়োজিত সবিরাম অর প্রভৃতিতে ইগ্নেশিয়া ব্যব-
হৃত হয় । এই ঔষধ জ্বাপক জরে সুস্পষ্ট বিরাম থাকে এবং বিরামকালে
রোগী সহজ শরীরের দ্বারা কাজ কর্ম করে । হানিমান বলেন যে শীতাবস্থায়
পিপাসা ও তাপাবস্থায় পিপাসার অভাব থাকিলে ইগ্নেশিয়া বিশেষ ফলপ্রদ ।
এই ঔষধ প্রয়োগোপযোগী জবে বাহ্য উত্তাপে সহজে শীত নিবারিত হয় এবং
দাহাবস্থায় পিপাসা থাকে না । ইগ্নেশিয়া দ্রাব্য-প্রধান ব্যক্তিদিগেব পক্ষে
বিশেষ উপকারী ।

বিশেষ লক্ষণ ।—একবার আচ্ছাদ, একবার বিবাদ ; লক্ষণগুলির
শীঘ্র শীঘ্র বিপবীতভাবে পবিবর্তন ; কেবলমাত্র শীতাবস্থায় পিপাসা ; ওষ্ঠে ও
মুখের কোণে “জর-চুঁটা” ; বসিয়া থাকিলে শীতের উপশম ; বাহ্য উত্তাপে
আকাঙ্ক্ষা । হ্রাস-বৃদ্ধি ।—তামাক, কাফী, ও ব্রাণ্ডীপানে, স্পর্শে, সঞ্চলনে,
তীব্র গন্ধে ও শোকাদি মনোবিকাবে বৃদ্ধি । উত্তাপে, কষিয়া চাপিয়া ধরিলে,
ও চিং হইয়া শয়নে হ্রাস । জ্বরের সময় ।—অপবাহে বা সন্ধ্যাকালে
জ্বরের উপস্থিতি ও প্রায় সাবরাত্রি তাপেব অবস্থিতি । জ্বরের প্রকৃতি ।—
প্রাত্যহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক জ্ব, পশ্চাদ্বর্তী জ্বর, সাপ্তাহিক জ্বর ; কুই-
নাইন আটকান জ্বর ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—নীতেব পূর্বে হাই
তোলা ও আডামোডা ভাঙ্গা ; বাহ্যদয়ে শীতেব আবৃত্ত ; কম্প ; বাহ্যিক উত্তাপে
শীতেব উপশম, কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, জ্বকালীন সর্কাদে শীতপিত্ত ।
মুখমণ্ডলের একপার্শ্বে জ্বালাকব উত্তাপ । অতি অল্প ঘর্ম, অথবা কেবল
মুখমণ্ডলে ঘর্ম । আমাশয়-গহববে বেদনা ও শিথিলতা । বাহিরে তাপ,
অন্তরে উত্তাপ অনুভূত হয় না । সন্নিপাত জ্বর ।—সহসা উত্তাপাবেশ
বিশিষ্ট জ্বর । মস্তকেব সম্মুখাংশে বেদনা, সেই বেদনাবশতঃ কৌণীর চক্ষু
মেলিতে অপারগতা । আমাশয় হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত স্থান রোধ অনুভব,
ও কক্ষস্থলে চাপ । * বিমর্ষতা ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং তৎসহকারে
আমাশয়ে শূন্যতা ও দুর্বলতা অনুভব । * পদ, জজ্বা ও সময়ে সময়ে
নিশ্বাসের অবশতা ।

ইগ্নেশিয়া ও জেলসিমিয়মে প্রভেদ ।—(১) ইগ্নেশিয়ার জ্বরেব
পূর্বে অঙ্গুর্দ ও হৃৎকণ, শীত ও কম্পকালে অতিশয় পিপাসা, ঘর্ম অল্প

প্রায়ই অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বা মুখমণ্ডলে; জিহ্বা পরিকার, লাল লবণাস্বাদ; বিরাম-
কাল ছুস্পষ্ট; এবং এক প্রকৃতির জরের অত্র প্রকৃতিতে পরিণতি লক্ষণ
থাকে। (২) জেলসিমিয়মে পূর্বলক্ষণ প্রায়ই থাকে না, শীত ও কম্পাবস্থায়
পিপাসা জন্মে না, ঘর্ম অধিক হয় ও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়; জিহ্বা খেত
ও পীতমিশ্রিত ও লাল রক্তবর্ণ হয়, জরের বিচ্ছেদ হয় না অথবা অতি অল্প
বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, সবিবাম জ্বর অবিবামে পরিবর্তিত হয়।

ইথুসা ।

ক্ষুদ্র, দ্রুত, কঠিন, অপ্রাপ্যপ্রায় নাড়া, এবং নাড়ী ও হৃদস্পন্দনের
বৈষম্য লক্ষণে ইথুসাব প্রয়োগ হয়। শিশুদিগেব দাঁত উঠিবার সময় জরে,
অবসাদ, প্রলাপ ও তন্দ্রা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ছুগ্পানাস্তে সংঘত
জ্বরবমন ও তৎপবন্ধে অবসন্ন হইবা পড়া ও নিদ্রা যাওয়া, মাথা তুলিতে না
পারা, ও আক্ষেপ এই সকলও ইথুসাব লক্ষণ।

ইপিকাকুয়ানহা ।

সবিবাম জরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন বা আর্সেনিক ব্যবহারেও অব
সম্যকরূপে আবোগ্য না হইলে, আহাবেব অনিয়মে অর্থাৎ অতিরিক্ত না
ওরু ভোজনে বোগী পুনঃ পুনঃ জ্বাক্রান্ত হইয়া পড়িলে ইপিকাক ব্যবহৃত
হয়। জ্ববে শীত, উত্তাপ, ও ষম্মাবস্থা যথানিয়মে পবপব উপস্থিত না হইলে;
কিঞ্চা রোগ ভালরূপে বুঝা না গেলে প্রথমে ইপিকাক ব্যবস্থা কবা যাইতে
পাবে। জ্বরকালীন নাসিকা বা অত্র কোন দ্বার দিয়া রক্তপাতেও এই ঔষ-
ধের প্রয়োগ হয়। জ্বরের সহিত হরিদ্রণ, ক্লেণিল অতিসারও ইপিকাক
জ্ঞাপক। সাধারণতঃ আমাশায়ক উপদ্রব, ও জ্বরকালীন বিবর্মিষা ও বমন
লক্ষণে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ডাঃ জ্বাব অত্র কোন বিশেষ ঔষধ
জ্ঞাপক লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে বিষমজ্বরে সর্বপ্রথমেই ইপিকাক ব্যব-
হার করেন। তিনি বলেন যে অনেক সময় কেবল এতদ্ভাবাই জ্বব আরোগ্য
হয়, সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও জ্ববেব এপ্রকার পরিবর্তন জন্মে যে তৎপরে

আর্গিকা, আর্সেনিক, ইয়েশিয়া, নর-ভম্বিকা প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী হইয়া উঠে : ডাঃ বার বলেন যে বহু্যাপী বিষয় জ্বরে যদি ইপিকাকে প্রথম রোগী আরোগ্য লাভ করে তবে অন্তান্ত রোগীও এই ঔষধে রোগ-মুক্ত হয় । জ্বরের সকল অবস্থায় বিবিষ্যার বিদ্যমানতা ইপিকাকের বিশেষ আরোগ-লক্ষণ । কিন্তু প্রথমজ্বরে বিবিষ্যা বর্তমান থাকিয়া, কুইনাইন সেবনে উহা বন্ধ হইয়া পুনরায় জ্বব প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিবিষ্যা না থাকিলেও ইপিকাকে উপকার দর্শে । বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষাকালের জ্বরে এবং সঞ্চল স্থলের জ্বরে ইপিকাক সমধিক উপযোগী ।

বিশেষ লক্ষণ ।—জ্বরের সকল অবস্থায়ই বিবিষ্যা । আহারের অনিয়মে পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ । শীতাবস্থায় সর্ক্যপেক্ষা অধিক হ্রস্ব-লতা । বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি ; জলপানে শীতের হ্রাস । জ্বরের অসম্পূর্ণ বিচ্ছেদ । হ্রাস-বৃদ্ধি ।—উষ্ণগৃহে, বাহ্যিক উত্তাপে, ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি । জলপানে, অনাবৃত্ত বায়ুতে ও বর্ষাকালে উপশম । জ্বরের সময় ।—পূর্বাঙ্ক ৯।১০।১১টা ; অপরাঙ্ক ১২টা ; শীতশূন্য জ্বর অপরাঙ্ক ৪টা । জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক জ্বর, প্রত্যাহ ২।৩ বার জ্বর ; ২।৩ দিন অন্তর বসন্ত ও বর্ষাকালীয় জ্বর ; পশ্চাদামী জ্বর, কখন অগ্রগামী, কতিক এক-সময়ে আগত জ্বর ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—জ্ষুণ, অসমর্ক, ও মুখে ললাসঙ্কর সহকারে জ্বরের প্রকাশ । অধিক শীত, অল্প উত্তাপ, অথবা অধিক উত্তাপ, অল্পশীত । বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি, জলপানে শীতের হ্রাস । (বাহ্যিক উত্তাপে শীতের হ্রাস, ইথে) । শীতাবস্থায় পিপাসা হীনতা, কিন্তু উষ্ণাবস্থায় অতিশয় পিপাসা । শীতাবস্থায় অতিশয় দুর্বলতা । তাপাবস্থায় বিবিষ্যা, বমন, ও শুষ্ক কাস । মুখমণ্ডলের পর্যায়ক্রমে শীতলতা ও রক্তহীনতা । অল্প ঘর্ম, ঘর্মে বস্ত্রে শীতবর্ণ দাগ লাগে । ঘোলা হ্রদ । বর্ষাবস্থায় সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি । বিবিষ্যা ও বমনের আবল্য । বিরাম-কালে অস্বাভিক পাকাশয়িক উপসর্গ (এণ্ট-জুড. পলস) ।

ইপিকাক ও আর্সেনিকে প্রভেদ ।—আর্সেনিকের সহিত ইপি-কাকের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রভেদ এই যে

ইলিকাকের দৌর্ভাগ্যের শীতাবস্থায় ও আর্সেনিকের দৌর্ভাগ্যের উত্তাপাবস্থায় সর্বাঙ্গের আধিক্য থাকে । *

ইলাপ্স ।

অপরূহ ৭টার সময় শীত, অনন্তর অতিশয় তাপ, পরিশেষে অল্প অল্প ঘর্ষ, সমস্ত রাত্রি স্থান-কষ্ট ও নিদ্রাবস্থায় মৃত্যুবাস্তিদিগকে স্বপ্নে দেখা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ । শিরোধূর্নন, সম্মুখদিকে মস্তকের পতনোপক্রম, আহায়াতে আশায়ের গোবব, কুরুবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা, অথচ আহায়ে আশক্তি আশায়ে ; ফল ও পানীয় দ্রব্যের বরফবৎ অবস্থান ইহার অত্রান্ত লক্ষণ ।

ইলেটেরিয়ম ।

সবিরাম অল্প বন্ধ হইয়া গাত্রের শীতপিত্ত (আমবাত) বাহির হইলে, এবং চুলকাইলে চুলকানি নিবৃত্ত হইলে ইলেটেরিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ । জরের বিরামকালে প্রকাশিত শীতপিত্তেই এই ঔষধ উপযুক্ত । শীতাবস্থায় পূর্বে ও শীতাবস্থায় প্রকাশিত শীতপিত্তে হিগার্ড ; তাপাবস্থায় এপিস, ইগ্রেসিয়া, ও রসটক্স ; ঘর্ম্মাবস্থায় এপিস, ও রসটক্স ব্যবহৃত হয় । জরকালীন পিচকারীর ত্রায় বেগে প্রভূত বমন ও বিরেচন নিঃসৃত হইলেও এই ঔষধে প্রথমে বমন-বিরেচন অবরুদ্ধ ও তৎপরে জ্বর দূরীকৃত হয় ।

একোনাইটম ।

শুষ্ক, শীতল পশ্চিম দিকের বায়ু, দক্ষিণ বা সজল পূর্বদিকের বাতাস, হিমলাগা, জলে ভেজা, বক্ষঃস্থলে শীতল বাতাস লাগা, ঘর্ম্মাবরোধ, সহসা ভয় প্রাপ্তি, দাঁত উঠা, ও ক্রমি প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন জরে একোনাইট ব্যবহৃত হয় । প্রাদাহিক জ্বর ও সর্দি জরেই ইহা বিশেষ উপকারী । জরে আত্যন্তিক বস্ত্রের বস্ত্রসঞ্চয় থাকিলে এতদ্বারা অতিশয় উপকার ঘর্মে । নবজরেই একোনাইট ব্যবহৃত হয়, পুরাতন জরে প্রায়ই ইহার প্রয়োগ হয় না । তবে মৃত্যুভয়, উৎকর্ষ ও অস্থিরতা ইহা একোনাইটের

বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকিলে অবশ্যই ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্ণরক্ত ব্যক্তিদিগের নবজুরে ও শীতাতপ প্রভৃতি বায়বীয় পরিবর্তনে জরের পুনরুৎপত্তিতে একোনাইট উপকারী। কেহ কেহ জ্বর হ্রাস করিবার জন্ত জ্বরকালে একোনাইট ও জ্বর বন্ধ করিবার জন্ত বিবাম কালে অত্র ঔষধ ব্যবস্থা করেন। এরূপ করা স্মৃতিকিৎসা নহে। একোনাইট যে জরের ঔষধ তাহা একোনাইটেই আরোগ্য হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিপুল প্রাদাহিক জুরেই একোনাইট বিশেষ উপযোগী। কিন্তু প্রাদাহিক জ্ববে বিধান-ভঙ্গব বিনাশ আশঙ্ক্য হইলে একোনাইট ব্যবহার করা নিফল। এই ঔষধে ধামনিক উত্তেজনার শমতা জন্মে, কিন্তু প্রদাহ স্থান বিশেষে স্থায়ী হইয়া পড়িলে আর কোন উপকার দর্শে না। বক্তৃতা দ্বিতীয় হইয়া যে সকল জ্ববে জন্মে, যথা, টাইফস জ্বর, টাইফয়েড জ্ব ও ম্যাগ্নেব্রিয়া জনিত সবিবাম জ্ব প্রভৃতিতেও একোনাইট ফলপ্রদ নহে। একোনাইট ব্যবহারের পূর্বে শরীরে ঘর্ষাভিষেক হইলে আব ইহা ব্যবহার কবা আবশ্যক কবে না।

বিশেষ লক্ষণ ।—শরীর অবস্থায় মুখমণ্ডলের উজ্জলতা ও উষ্ণতা বাসিলে মলিনতা; শিবোৎপন্ন ও মুচ্ছার উপক্রম; মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিহীনতা ও জ্ঞানশূন্যতা; উত্তেজনা, মৃত্যু ভয় ও উদ্বেগ, এবং অস্থিরতা। হ্রাস-বৃদ্ধি ।—সন্ধ্যাকালে ও বাত্মিতে; উষ্ণগৃহে, ও উত্তান কালে বৃদ্ধি। দিবসে বাতাসে, স্থিতি থাকিলে, ও ঘর্ম্ম হইলে উপশম। জ্বরের সময় ।—প্রায়ই সন্ধ্যাকালে জ্বর, প্রাতে জ্ববে হইলে জ্বস্তণ, অপরাহ্ন ২৩ টার সময় জ্বর আসিলে শীত না হইয়া কেবল উত্তাপাবস্থার প্রকাশ। জ্বরের প্রকৃতি ।—নবজ্বব; দুইদিন অন্তর পুনরাতন সবিবাম জ্বর; পর্য্যায় জ্বরের একজ্ববে পরিণতি ও তৎসহ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়।

জ্বরের লক্ষণ । সবিবাম জ্বর ।—হঠাৎ পুষ্টি যুবকদিগের তরুণ জ্বর। অতিশয় শীত ও উত্তাপ, মস্তক ও মুখমণ্ডলে বিশেষ উত্তাপ; জ্বরকালীন কাস। অত্যন্ত অস্থিরতা; উদ্বেগ, ও স্নায়বীয় উত্তেজনা। জরের বর্ধিত অবস্থায় প্রবল তৃষ্ণা; শীতাবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক এবং উত্তাপাবস্থায় নাড়ীর পূর্ণতা, দ্রুততা, ও কঠিনতা। ঘর্ম্মপ্রাবে উপশম অস্থ

ভব । সন্নিপাতজ্বর ।—পূর্ণ ও উল্লস্কন শীল নাজী বিশিষ্ট প্রাণাহিক জ্বর, অতিশয় উত্তাপ, ঘর্ম্মশূন্য দাহ ও প্রবল পিপাসা ; * ভয়, ব্যাকুলতা ও ভ্রায়বীর উত্তেজনা । *শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন কপাল দিয়া মস্তিষ্ক চাপিয়া বাহির হইবে, উত্থান করিলে শিরোগুণন । (একোনাইট প্রধানতঃ সন্নিপাত জ্বরে প্রথম অবস্থায় প্রযুক্ত) ।

একোনাইট ও বেলেডোনা প্রভেদ ।—যে স্থলে একোনাইট ও বেলেডোনা নিশ্চিত প্রভেদ করিতে পারা যায় না সে স্থলে ঘর্ম্মভাবে একোনাইট ও ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত ।

এগেরিকস ।

শিথিল রক্তসঞ্চলন বিশিষ্ট বৃদ্ধদিগেব পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে জ্বালা, কণ্ঠদগ্ন ও আরক্ততা ; বরফ স্পৃষ্ট বা বরফেব সূচী বিদ্ধবৎ অনুভব ; স্থস্থি থাকিলে বদন ও চরণে ছিঁড়ে পড়ার ভ্রায় যাতনা, নড়িলে চড়িলে উহার শাস্তি ; নিয়ন্ত্র ও উর্দ্ধাঙ্গের বিপরীত দিকে বথা বাম পদে ও দক্ষিণ হস্তে উপসর্গেব প্রকাশ এগেরিকস ব্যবহারেব লক্ষণ । সবিরামজ্বর ।—অতিশয় শীত, উষ্ণ হইতে নিম্নাভিমুখে শীতের গতি, নড়িলে চড়িলে বা গাত্রবস্ত্র খুলিলে শীতের বৃদ্ধি, হেলান দিয়া বসিলে পৃষ্ঠদিয়া জল গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে এক্রপ অনুভব । উত্তাপের অভাব বা কেবল উর্দ্ধাঙ্গে স্বেদসামান্য উত্তাপ । নিদ্রাকালীন, সারাবাত্রি, তৈলাক্ত ঘর্ম্ম ; প্রাঘই শরীরের সঙ্গুপভাগে ঘর্ম্মের প্রকাশ, রাগিতে পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মাবস্থায় মেরুদণ্ডেব দুর্বলতা, উপদাহ, ও স্পর্শ-দেব । দুগ্ধপোষ্য শিশুেব অপরাধ চারিটার সময় জ্বর । বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ ; সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম ; তৃষ্ণা, ঝাস হ্রস্বতা, উদব ও জাহ্নুর দুর্বলতা, উত্তাপাবস্থায় বিবমিষা, গাত্র-গোরব জন্ম শয়ন করিতে বাধ্যতা । সন্নিপাতজ্বর ।—প্রমের উত্তর দিতে অপ্রবৃত্তি (ফস-এসি) ; মদ্যপানের স্পৃহা ; আত্মাণ শক্তির আতিশয়া (কলচি) ; জিহ্বা ও মুখগহবরেব পবিত্রতা ; অস্ত্র-কূজন ও গন্ধহীন বায়ুনিঃসরণ ; হস্ত কম্প, মেরুদণ্ড ও হস্তপদাদি কামড়ান ; নিতম্ব-পেশী

এপিস ।

ধর্মপবিশুদ্ধ পুরাতন জবে এপিস বিশেষ উপযোগী । গাত্রে মধুমক্ষিকার হল-বেধের স্থায় যাতনা এপিসের একটি বিশেষ লক্ষণ । বসন্তকালের জরে এই লক্ষণটি বর্তমান থাকিলে এই ঔষধে বোগী নিশ্চয়ই রোগ-মুক্ত হইয়া থাকে । চর্ম-রোগ অকল্পিত হইবার পক্ষে পর্যায় অব উপর হইলে ; অথবা দীর্ঘকালের জর কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ সেবনে দূবীভূত না হইলে এপিস বা এপিস ও উচ্চক্রমের চায়না পর্যায়ক্রমে, ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে । স্ফোট-জ্বরের পরবর্তী তরুণ ও পুরাতন জবেও এপিস ফলপ্রদ । জরের তিন অবস্থারই সুস্পষ্ট বিদ্যমানতা ; বক্ষঃস্থলে বা জামুতে শীতের আরম্ভ ; অগ্নির তাপে ও নড়িলে চড়িলে শীতের আবির্ভাব ; কেবল শীতাবস্থার পিপাসা ; এবং শীতান্তে নিদ্রা এই ঔষধের সাধারণ লক্ষণ । ডাঃ উল্ক বলেন যে সর্কস প্রকার সবিরাম জরেই এপিস অমোঘ । তিনি তিন হইতে দুইশত ক্রমে এপিস ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার বিষম জরেই সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন । কিন্তু ডাঃ নিকেল ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজবে ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন না । হিম-ভোগ বা রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে বাস বশতঃ অব জন্মিলে এপিস ফলপ্রদ । পিত্ত বা বায়ু প্রধান ধাতু ; স্ত্রী-লোক, বিশেষতঃ বিধবা ; এবং সাবধান থাকিলেও যে সকল বালক বালিকাদিগের হস্ত হইতে দ্রব্যাদি গড়িয়া যায় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

বিশেষ লক্ষণ ।—নৈবাস্ত ; চক্ষুর নিম্নে ক্ষীণতা ; স্পর্শ-বিষেধ ; হলবেধবৎ জ্বালার বেদনা ; থাকিয়া থাকিয়া সহসা বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি, ও সহসা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গতি ; নিদ্রিতাবস্থায় বা জাগ্রত হইবার সময় হঠাৎ স্নানস্থলে চিংকার করিয়া উঠা ; * ভ্রমশূন্যতা ; শোথ ; উদরী ; মূত্র-বেগ ধাবণে অক্ষমতা ও মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা ; বারম্বার আরম্ভ ও জ্বালা-কর মূত্রত্যাগ ; পীড়াক্রান্তস্থলে মধুমক্ষিকার হল-বেধের স্থায় যন্ত্রণা ; নিদ্রালুতা ; হ্রাস-বৃদ্ধি ।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শীতলতায় হ্রাস ; নিদ্রান্তে বৃদ্ধি ।

জ্বরের সময় ।—প্রাতঃকাল ; অপরাহ্ন দুইটা হইতে পাঁচটা, বিশেষতঃ তিনটা ; শীতশুষ্ক অপরাহ্ন চারিটা । জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক, বৌকালিন, দ্ব্যাহিক, সপ্তাহে দুইবার, ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর, অগ্রগামী জ্বর ; রক্তসঞ্চয়িত জ্বর ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—অপরাহ্ন ৩টা বা ৪টার সময় জ্বর ; শীতাবস্থায় পিপাসা (ইমে, কার্কো-ভেজি, ক্যাপ্স) ; উষ্ণ গৃহে ও অগ্নির উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি, (বাহ্য উত্তাপ প্রদানে শীতের হ্রাস আর্স কোরাল, * ইমে ।—বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি ইপিক, এপিগ্ন) । অন্নমাত্র নড়িলে চড়িলেই শীতের বৃদ্ধি । শীতাবস্থায় পদদ্বয় ও অঙ্গুলী গুলির অতিশয় শীতলতা ; হস্ত ও মুখমণ্ডলেব উত্তপ্ততা, এবং নিশ্বাস প্রবাহে অত্যন্ত কষ্ট, বোধহয় যেন শ্বাস কষ্ট হইয়া পড়িবে । শীতান্তে নিদ্রা । শীতাবস্থানে গাত্র শীতপিত্তেব (আঘাত) প্রকাশ ও উহাতে অতিশয় কণ্ডূরন । (শীতাবস্থায় বা শীতের পূর্বে শীতপিত্তের প্রকাশ,—হিপার ; তাপ ও ঘর্ম্ম-বস্থায় প্রকাশ, রসটক্স ; কেবল তাপাবস্থায় প্রকাশ,—ইমে) । উত্তাপাবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণাপরিশূন্যতা ; নিশ্বাস প্রবাহে কষ্ট ও শ্বাস-রোধাশুভব ; গৃহের উত্তাপে অসহ্যতা । ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণাভাব ; পর্যায়ক্রমে গাত্রের ঘর্ম্মাক্ততা ও কক্সতা (ছাট-কা) । পুৰাতন জ্বরে ঘর্ম্মাভাব । বিরামকালে দ্রীহাপ্রদেশে বেদনা ; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও সন্ধিহুলে অত্যন্ত বেদনা, পায়ের পাতার ক্ষীণতা ; প্রশ্রাবের অন্নতা ; অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা ; দুর্বলতা ; ও শীত-পিত্তের বিদ্যমানতা । সন্নিপাত জ্বর ।—অচৈতন্য ও মূহ প্রলাপ ; নিদ্রাশূন্যতা ও থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠা ; কথা বলিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষমতা, বিদারিত, ক্ষতসংগুল ও ফোটারত জিহ্বা, (নক্স, পলস) ; গলাধঃকরণে কষ্ট, এবং মুখশোষ ও গল-শোষ । * আমাশয়-গহ্বরে ও নির্যোদরে বেদনা (ব্রাইও) ; উদরেব ক্ষীণতা ও স্পর্শ-দেহ (ল্যাক) কোষ্ঠ-রোধ, অথবা বারংবার, প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনে, দুর্গন্ধ, রক্ত মিশ্রিত আমশয় অনৈচ্ছিক মলপ্রাব (ফন) ; প্রশ্রাব-রোধ (হাইওস) বন্ধঃস্থল ও উদরের উপরে শুভ্রবর্ণ পীড়কা ; অত্যন্ত দুর্বলতা ও শয্যাপ্রানে সরিয়া সরিয়া যাওয়া (* এসিড-মিউর) ।

এপিস ও ট্রাইওনিয়াম প্রভেদ।—(১)এপিসের জ্বর সাধারণতঃ

অপরাহ্ন ৩।৪টার সময় হইয়া থাকে, ট্রাইওনিয়াম জ্বর সকল সময়ই হয়।

(২) এপিসে কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে, ট্রাইওনিয়াম শীত, তাপ, ঘর্ম তিন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে। (৩) এপিসের শীত বুক, উদর, ও হাঁটুর সম্মুখ হইতে আরম্ভ হয়; ট্রাইওনিয়াম শীত হস্ত-পদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ও ওঠে আরম্ভ হয়। (৪) এপিসে বক্ষঃস্থলে চাপ ও তজ্জন্ত খাস-রোধ অনুভব থাকে; ট্রাইওনিয়াম কষ্টকর শুষ্ককাস সহকারে বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকে। (৫) এপিসে হয় প্রায় ঘর্মীভাব নয় পর্যায়ক্রমে গাত্রের ঘর্মীকৃতা ও রুদ্ধতা থাকে, এবং ঘর্মীবস্থায় পিপাসা থাকে না; ট্রাইওনিয়াম ঘর্ম থাকে, সামান্য পরিশ্রমে ঘর্মের উদ্রেক হয় এবং ঘর্মীবস্থায়ও পিপাসা থাকে।

—•—

এমোনিয়ম কার্বনিকম।

ক্লীলোকের রক্তশূন্যাবস্থায় জ্ববে একবার শীত একবার তাপ, কপালে ছিন্নবৎ বেদনা, মস্তকের জড়তা, গণ্ডস্থলের কখনও আবদ্ধতা কখনওবা পাণ্ডুরতা, বিবমিষা, পিপাসা, আমাশয়ে চাপ, উল্কার, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ ও উহার বামদিকে স্ফীতি-বেধ, এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত শর্দি ও স্নিগ্ধার অভাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিকালে শীত; গৃহেব বাহিরে শীতের বৃদ্ধি, অভ্যন্তরে হ্রাস; ঘুমাইলে শীত জাগিলে তাপ, রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত পরপর শীত ও তাপ; রক্তের আবেগে রক্তবহানাতী ও মস্তক যেন বিদীর্ণ হইবে এরূপ অনুভব। পূর্বাঙ্কে সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ উদরে তাপ; সন্ধ্যাকালে পায়ের পাতার শীতলতা সহ মুখমণ্ডলের তাপ; তাপাবস্থায় শিরঃশীড়া। প্রাতে ঘর্ম; নিম্নাঙ্গের ঘর্ম; গাত্রের উত্তাপ সহকারে দিবসে বা রাত্রিতে ঘর্ম।

—•—

এমোনিয়ম মিউরিরেটিকম ।

শ্লেষ্মা-প্রধান, গণ্ডমালাগ্রস্ত স্কুলকায় অলস ব্যক্তিনিগের পক্ষে এমন-মিউর বিশেষ উপযোগী। কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ, প্রতি সপ্তম দিবসে সিক্কো-নার লক্ষণের স্থায় শীত, তাপ, ও প্রভূত ঘর্ষ সহকারে আবির্ভূত করে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অর্দ্ধঘণ্টা পর পর পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপের প্রকাশ; সন্ধ্যানে বিনির্গত, কঠিন, খণ্ড খণ্ড মল, মল সহকারে বায়ু নিঃসরণ; শীত, সহকারে বা শীতের পূর্বে পিপাসা, তৎপবে ঘর্ষ; রাত্রি, শয়নে মুখমণ্ডলে, এবং হস্ত ও পদতলে তাপ, ও তৎসহ তৃষ্ণা এমন মিউরের সাধারণ লক্ষণ। জ্বরের লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে শরীরের শীতলতা। পৃষ্ঠ দিয়া উর্দ্ধদিকে শীতের গতি; অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ; উত্তাপ সহকারে, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে ও শারীরিক পরিশ্রমে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও ক্ষীণ-ভাব (ফুল ফুল দেখান); ঘন ঘন ঝলকে ঝলকে উত্তাপের উদ্বেক ও তৎপরে ঘর্ষ, করতলে ও পদতলে ঘর্ষের আধিক্য। উত্তাপান্তে দিবারাত্রি ঘর্ষ; দুইপ্রহর রাত্রির পব ও প্রত্যয়ে প্রচুর ঘর্ষ।

এম্ব্রা গ্রিসিয়া ।

জ্বরের লক্ষণ।—আলস্য ও নিদ্রালুতা সহ পূর্ক্বে শীত-ভূতব; আহারাণ্ডে তাহার শাস্তি। মুখমণ্ডলের উষ্ণতা সহ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে শীতানুভব। হৃৎপিণ্ডের উৎকণ্ঠা সহকারে ঝলকে ঝলকে উত্তাপ অনুভব, সন্ধ্যাকালে উহার আতিশয্য। রাত্রিতে অধিক ঘর্ষ, দুইপ্রহর রাত্রির পর ঘর্ষের বৃদ্ধি, ব্যথিত পাখে উহার আধিক্য; কিন্তু শরীর উত্তপ্ত। হ্রাস-বৃদ্ধি।—উষ্ণ পানীয়ে, উষ্ণগৃহে, শয়নে, রাত্রিতে, অননিদ্রায় বৃদ্ধি। আহারাণ্ডে, শীতলবায়ু সেবনে, শীতলজব্য পানাহারে হ্রাস। জ্বরের সময়।—পূর্ক্বে ও রাত্রি; শীতশূদ্র অর অপরাহ্ন ৭টা হইতে ৮টা। জ্বরের প্রকৃতি।—অনির্দিষ্ট পর্যায়শীল অর।

এলষ্টোনিয়া ।

এলষ্টোনিয়া দুর্বলতা, মৃদুজব, ও সচরাচর তৎসহকারে উদবাসন, জন্মায়, এবং তৎপরেও ইহা সেবন কবিলে কম্প, ও ঘর্ম্মাদি এবং বিবেচন, খল্লী ও শিরোবর্ণন জন্মে। এজন্ত ম্যালেরিয়ায় লক্ষণ জবে ও অতিমারে চায়নার ত্রায় এই ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতের পূর্বে ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকিলে এলষ্টোনিয়া, এবং শীতেব পূর্বে ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা লক্ষণে চায়না ব্যবহৃত হয়। অপব, এলষ্টোনিয়ায় চায়না জ্ঞাপক উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে না। কুইনাইন সেবনে আবদ্ধ পুণাতন জবে, সবিবাহ জব সহকারে উদবাসন থাকিলে; অথবা একদিন জব ও তৎপবদিন ঠিক সেই সময় জর না হইয়া আম-রক্ত বিরেচিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য। সম্পূর্ণ লক্ষণানুযায়ী না হইলেও পুণাতন জরে এই ঔষধ ব্যবহার কবিলে রোগ রূপান্তরিত ও পরি-বর্তিত হয়। সন্নিপাত জ্বরের আরোগ্যানুগ অবস্থায়ও অতিশয় অবসন্নতা, দুর্বলতা, মৃদুজব, ও অতিসাবাদি লক্ষণে এলষ্টোনিয়াব ব্যবহার আছে।

জ্বরের লক্ষণ ।—পূর্নাক্ষ নয়টা হইতে ১১টার মধ্যে শীত, শীতের পূর্বে, এবং শীত ও তাপে পিপাসা। তাপাবস্থায় শিবঃপীড়া, পিঠ কামড়ান, অতিশয় জলপিপাসা; কখন কখন জল আমাশয়ে উপস্থিত হইবা-মাত্র বমন হইয়া পড়ে (আর্স, অট্রিম, ফস); ঘর্ম্মাবস্থা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না।

এলুমিনা ।

এলুমিনা জরে অধিক ব্যবহৃত হয়না, তবে পুণাতন জরে ও ষাণ্ডদোষ সংশোধনার্থে ইহা কখন কখন প্রয়োজিত হইয়া থাকে। ট্রাইওনিয়া ব্যব-হারে রোগের সমস্ত লক্ষণ দূরীভূত না হইলে তৎপরে এলুমিনা ব্যবহার করিলে অবশিষ্ট লক্ষণ অন্তর্হিত হয়। দ্ব্যাহিক জরে শীত ও কম্পের পৃষ্ঠে ও পায়ের পাতার আরম্ভ, মুখমণ্ডল উষ্ণ; পর্যায়ক্রমে শীত ও তাপ অথবা শীতান্তে তীব্র ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম; বোগী সমস্ত ও হতাশচিত্ত; বিরামকালে

ওপিয়ম

শূন্যোদ্গার, অবসন্নতা, ও শয়ন-প্রবৃত্তি;—এই সকল লক্ষণে এন্ড্রিমিনার প্রয়োগ হয়। সরলান্তের নিশ্চেষ্টতা, এমনকি নরম মলও অতিশয় বেগ না দিলে বাহির না হওয়া; অধিক মল সঞ্চিত না হইলে মলতাগের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য না জন্মা; এই ঔষধের একটা প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

এসাফিটিড।

প্লেগ্মা-প্রধান গণ্ডমালা-দাতু, শিশুদিগের অরে; উপদংশ বা পারদ-দোষ জন্ম অব্যবহৃত; প্লীহা-যুক্তের রক্ত-সঞ্চয় জনিত অব্যবহৃত; এবং প্রচ্ছন্ন অরে, অর্থাৎ অরের সময় অর প্রকাশিত না হইয়া আমরক্ৰম্য ভেদ হইলে এসাফিটিড বাবস্থত হয়। পৃষ্ঠে ও কটিতে শীতের আরম্ভ; মস্তকে অসহ্য বেদনবৎ যাতনা, মুখে অধিক ছেপ উঠা ও উদগারে রস্মনের গন্ধ; তাপাবস্থায় মুখ-মণ্ডলে উত্তাপ, হাত পায়ের পাতা শীতল, এবং অনিদ্রা ও উদ্বিগ্ন; ঘর্ম্মাবস্থায় একেবারেই অভাব, অথবা কখন কখন কপালে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল ঘর্ম্মের প্রকাশ এই ঔষধের ব্যবহার-লক্ষণ।

এসেরম।

জ্বরের লক্ষণ।—সমস্তদিন তাপ। অপরাহ্নে শীত, পাত্রে আবৃত কবিলেও শীত হ্রাস পড়েনা, অন্তরে শীত, বাহ্যিক তাপ, এবং তৃষ্ণা; অগ্নি-গন্ধ প্রচুর ঘর্ম্ম; অবসাদ ও সর্পশরীর ঘৃষ্টবৎ অনুভব।

ওপিয়ম।

ওপিয়ম বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অরের সকল অবস্থায়ই নিদ্রালুতা; শ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ; মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা ও শুষ্কতা আরক্ততা; হস্তপদাদির কম্প; ও কোষ্ঠবদ্ধ এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। যথাবিহিত ঔষধ ব্যবহার করিলেও যদি জ্বরের স্পন্দিত ক্রিয়া

প্রকাশিত না হয় তাহাইলেও ওপিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ জন্মে
 মদ্য নিদ্রার পরে প্রলাপ, মধ্যে মধ্যে বিবমিষা ও জরাস্ত্রে অবসন্নতা লক্ষণে
 ওপিয়ম ব্যবহাব করা যায়। অহিকেশের বিষ-ক্রিয়ায় সংজ্ঞালুপ্তপ্রায় নিদ্রা
 সুখব্যাধীন পূর্বক নাসারব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব উৎক্ষেপ, ঘর্ম্মাক্ত শরীরে জ্বালাকর
 উত্তাপ, ও গাত্রতাপের দুই তিন ডিগ্রী বৃদ্ধি;—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত
 হয়, এজন্ত হানিমান পূর্বোক্ত লক্ষণাপন্ন বিবিধ তরুণ জন্মে ওপিয়ম অমোঘ
 মনে করেন। কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ জন্মে শেষ বাত্মিতে শীত, পিপাসা,
 প্রজি-বেদনা, ও নিদ্রা, উত্তাপাবস্থায় শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা,
 কমিনীকার সংকোচ, পিত্তবমন; রক্তবর্ণ মূত্র; তাপের অনেক ক্ষণ পরে উষ্ণ
 ঘর্ম্ম (প্রায়ই পদে) ঘর্ম্মে গাত্র ভাসিয়া যাওয়া ও নাক ডাকাইয়া নিদ্রা;—
 এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। অহিকেশেব জ্বর ঠিক নিয়মিত
 সময়ে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহা তিন অবস্থা সমান থাকে না। অতিরিক্ত
 রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কায় অর্থাৎ তন্দ্রালুতা, ইন্দ্রিয়ের
 হ্রাস, ও সশঙ্ক শ্বাস লক্ষণে সন্নিপাত জন্মে উহা ব্যবহার হয়।

বিশেষ লক্ষণ।—অতিশয় নিদ্রালুতা; শয্যা অতিশয় উত্তপ্ত অমৃভব,
 ঘর্ম্ম হইবার সময় মন্দাবস্থা প্রাপ্তি, নিদ্রাকালে ও নিদ্রাস্ত্রে বৃদ্ধি। হ্রাস-
 বৃদ্ধি —উত্তাপে, শ্বিৎ থাকিলে, ঘর্ম্ম, নিদ্রাব, সুরাপানে, বাত্মিতে ও প্রাতঃ-
 কালে বৃদ্ধি। শীতলতায়, নড়াচড়ায়, দিবাভাগে, ও সাযাক্স উপশম।
 জ্বরের সময়।—পূর্বাহ্ন ১১টা, অপরাহ্ন, সায়াক্স, রাত্রি, কখনওবা রাত্রি,
 ১২ টার পর। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক, ও দ্ব্যাহিক।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—শীত ও উত্তাপাবস্থায়
 কাগাস সহকারে তন্দ্রা বা প্রগাঢ় নিদ্রা।* বিকসিত মুখ ও নিশ্বাসের ঘড় ঘড়
 শব্দ। মুখমণ্ডলের মলিন আবৃত্ততা ও ক্ষীণতা সহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয়।
 সন্নিপাত জ্বর।—মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা ও ঈষৎ বেগুনি রং।* অত্যন্ত
 তন্দ্রাদোষ ও অচৈতন্যবৎ নিদ্রা সহকারে সশঙ্ক নিশ্বাস প্রবাহ। অর্দ্ধোন্মীলিত
 চক্ষু ও প্রলাপ বাক্য, (নিমীলিত চক্ষু ও প্রলাপ বাক্য, হাইওস)। নাড়ী পূর্ব
 ও আগ্রাসিতগতি, অথবা মন্দগতি ও ক্ষীণ। মস্তিষ্কেব ক্রিয়ার বিলোপেক্ষ
 আশঙ্ক। অজ্ঞাতসারে মলমূত্র, এবং মূত্রস্তম্ভ (বেল, হাইওস)।

ককিউলস ।

অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট স্নায়বীয় জবে হানিমানে এই উষ্ম ব্যবহার করিতে বিদ্যে দেন । ভাটমান বলেন যে বার-বার ক্রোধবিশেষ বশতঃ উৎপন্ন অথবা ক্রোধোদ্ভেকের অতিশয় প্রাবল্য সংযুক্ত জবে ককিউলস বিশেষ উপযোগী । শুষ্ক বায়ুগুণাদিগের জবেও ইহা ব্যবহৃত হয় ; অবকাণ্ডীন সর্কাসে আক্ষেপ বা আনাশনে খন্টী (খালদবা) ইত্যাদি লক্ষণ । ককিউলসের লক্ষণ জাহায়ে বা ধমপানে, আলাপনে, শবটামোহনে, ও শীতল বাতাসে বিবক্ষিত, এবং বাত্মিবাহনে, ও ঘামাস্তে উপশমনত্বাদি । হ্রাসোক্তি ও বঙ্গকদিগের যোগেই ককিউলস বিশেষ উপযোগী । আক্ষেপ, শ্বাসবাহার পেটকামচনি, অম্মে অবচি; কোষ্ঠবদ্ধ, বায়ুক্ত বায় (কি শীতল কি উষ্ণ) সহ্য করিতে না পারা, ও গানাহায়ে বোম লক্ষণের দ্বিত্ব এত প্রবল যে বিশেষ লক্ষণ ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিবান জ্বর ।—একবার শীত একবার তাপ । অনায়ে ও সাবাস্তে আভ্যন্তরিক শীত, তৎসহ পাপাঙ্গে, প্রধানতঃ পৃষ্ঠে ও চক্ষাঘ বস্ত্র, উদ্রাণ প্রমোহে দেহী শীতের অনুগণন, (উত্তাপে উপশম, ইন্দ্রে) । উত্তপ্ত পান, অথচ অবদত শীতান্ত্রভব, উত্তপ্ত গাত্রের ও শীতল পদ লক্ষণে উত্তাপাবশ্য অথবা পাপক লক্ষণ তাহা । আক্ষেপিক ও স্নায়বিক উপশম অর্থাৎ ঘন্য, শিরোক্ষণ, শিরোপৌড়া, অধুনা বিবানম্বা, নৈবাশ্ত, ও সর্গাঙ্গীন উপশমতা । মনিপাত্তজ্বর ।—স্নায়মণ্ডলের অবসন্নতা । আগন্তু, সামান্ত্রাশ্রম পবিত্রাশ্রি, কবানীমতা, অতিশয় নিদ্রাক্রান্ত, ব্যক্তিগত শক্তির নানতা, যথাযোগ্য শরুপায়ে অসমর্থতা । যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা স্বল্প কবিরী প্রায়শঃ অক্ষমতা ও মধুরাশ্রম শিরোক্ষণ, শব্দ্যব উষ্ণতা বসিলে বিবানম্বা (লাইট), মৃদু সাতর (তাগা) আয়াদ, বাণে জগজ্জোতের জাঘ শরু, উদ্রের স্ফাতিতা ও আটোপ, মজ্জাপ্রবণতা, জলপানকালে শরু কবিরী জলের অবতরণ, গ্রীবাগণের বক্ষ্যতা, জাগ্রত তত্ত্বা :

কফিয়া ক্রুড়া ।

মুহুরবেও অধিবিক্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা থাকিলে ও বেদনায় অসহ্য হইলে,

খন যখন একবার শীত একবার উত্তাপ, বোম্বাঙ্ক, পেট-বেদনা, অস্থিরতা, উত্তাপাবস্থায় অতিশয় মানসিক উত্তেজনা • এবং ঘণ্টাব্যস্ত হৃষা ও তৈদ, এক অঙ্গের উষ্ণতা অথবা শীতলতা, শিবঃপীড়া, শিবোদ্বিগ্ন, কপাল ও চক্ষুর গুরুত্ব, উদর-বেদনা, উত্তপ্ত নখাঙ্গ, এটা ওটা চাওয়া, বাচালতা ও প্রলাপ লক্ষণে প্রায়শঃকাল অবকাশ ব্যবহৃত হয়। ত্র্যাহিক অবস্থা অতিশয় অস্থিরতা, প্রায় সাবানাক্রি আনন্দ ও এখানে ওখানে কব লক্ষণেও এই উদর উপযোগী। ইহা সেবনে প্রথমে স্নানক্রীড়া ও পরিশেষে আবোলাগা ঘন্মে।

কর্ণস ফ্লোরিডা ।

ম্যানোবিবাজনিত জঃসাধ্য সাবধান অবস্থা অবক্রমণেব কয়েকদিন পর হইতে নিদ্রাক্রান্ত, শিবঃপীড়া, বিবনিষা, বমন, কৃপাহীনতা, ঠৈশ্বিক, বা জঃ-ময় উদরাময় প্রভৃতি পূর্বলক্ষণ অবস্থান শীতাবস্থায় শীতের প্রাধান্য এবং তৎসহ গাত্রের শীতলতা ও আঠা আঠা ঘণ্টা, বিবনিষা, বমন ও প্রচুর উদর-বেদনা, তাপাবস্থায় হৃষা, দগদগকব প্রায় শিবঃপীড়া, গাত্র হ্রাসক উষ্ণতা ও আক্রান্ত, তন্ত্রা; মস্তিষ্কে পৃথকতা, নাড়ীবে দ্রুততা ও কঠিনতা, ঘণ্টাব্যস্ত প্রায়ই অবিদ্যমানতা, ঘণ্টা হইলে অতিশয় চক্ষুদগকব ঘণ্টা, বিবনিষাকাল উল্ল-লতা, কৃপামান্দা, ও বেদনাবিশিষ্ট জনবৎ বা ঠৈশ্বিক উদরাময়,—এই সকল লক্ষণে কর্ণস ফ্লোরিডা ব্যবহৃত হয়।

কলচিকম ।

বন্যকালের বক্তৃতিসাধনে ও সংক্রামিক অবস্থা, বিশেষতঃ আহাৰ্য্য-দ্রব্যেব দশনে বা আশ্রমে অতিশয় বিবক্তি লক্ষণে কলচিকম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হলি কেবল এই আহাৰ্য্যে একটি লক্ষণান্তসাবে কলচিকম ব্যবহার করিয়া একজন সপিরাম অবস্থার বোগী আরাগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ডেনহাম বলেন যে কর্ণাচিকমের জ্বরে অল্পপ্রত্যঙ্গের অভাবের দিয়া বা পুষ্টিবে নিম্নদেশে শীতলতা, এবং কখন কখন বিশেষতঃ ব্রাহ্মীতে ঘণ্টাশূ

উদ্ভাপ জন্ম প্রভূত অব দশ্য হয় ! কিন্তু সাধারণতঃ লক্ষণগুলির তত তীব্রতা
বা আদিক থাকে না ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—সর্বশরীরে কম্প, গুঠে
শীতের কারস্তু ও নিয়তিমুখে শীত, গাত্র শীতল । সাধারণ উদ্ভাপ ও চর্ম-
বাব পিপাসা, অন্তরে হস্তপাদ অধিক উদ্ভাপ, অথবা হাত পা শীতল ও
প্রবণ রুদ্ধকম্প । ব্যায়ান্যাস একেবারে অভাব, কিন্তু বাতগ্রস্ত বোগীর
প্রচুব অল্প-গন্ধ ঘন্য । বিচ্ছেদাবস্থা স্পষ্ট নহে ও তখন উদবেব উপসর্গের
বিদ্যমানতা এই উদবেব বাবতাব লক্ষণ । ইহা লক্ষণ ব্যতিতে, বিশেষতঃ
সাধারণ, এবং উদবেগ ও মানসিক গাণিশমে বদ্ধিত ও সূত্রিব থাকিলে উপ-
শমিত হয় । **মুনিপাতজ্বর ।**—অতিশয় সাধারণতঃ অসাদ ; এমাত্তিক
চর্মলতাব জ্বাব দোর্দণ্ড, বেশীকৈ তুমিষা দমাইবে মস্তক পশ্চাদিকে
গতিত, ও নব অতিশয় বিকসিত হইবা পড়ে, সহসা পতিত, ও ততক্ষ
কথা বসিতে বা হাটিতে অশক্তি, মূতবৎ মূত্রাকৃতি ও অত্যন্ত অবসন্নতা ;
শীর্ণ ~~কি~~ চিৎ হইবা পড়িয়া থাকি, তন্দা-দোষ, অচিবিকসিত চক্ষু ; উত্তপ্ত-
দেহ ও শীতলা হস্তপদ, অথবা মধ্যস্থ গাত্র, শীতল সর্বাঙ্গ কপাল ;
ক্ষুদ্র, হাত, পূত্রবৎ, বা অপ্রাণ নাড়া ; অচেতন, শব্দা বহু শূন, প্রমাণিত
কনৌনিক । ও উতাব আঘোপ জ্বানের অসামান্য, শিব্যপীড়া সংযুক্ত
প্রলাপ, বুদ্ধির অপবিচ্ছন্নতা, অথচ জিজ্ঞাসিত কথার প্রকৃত উত্তর প্রদান ;
অথো না জিজ্ঞাসা করিলে নিজেব জ্ঞান বিপন্ন অবস্থা সম্বন্ধ
জ্ঞানশূন্যতা ; নিমগ্ন, কেটিব-গত, একদৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু, নিমগ্ন ও
মূতবৎ মূত্রাকৃতি ; শুষ্ক ও রক্তবর্ণ নাসাদক্ষ, গাত্রকপিশ গোপাবৃত ওষ্ঠ,
দন্ত, ও জিহ্বা, দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ, শুষ্ক, শুষ্ক, ও অদশ জিহ্বা, তুমিষার
পিপাসা, * আস্থান, ও উদবেগদেবে প্রচা যেন অততাবিকা, শবীরেব
অজ্ঞাত হান হইতে উদবেব আনক উত্তপ্ততা, অজ্ঞাতবারে ও বেদনা সহ-
কায়ে চর্মকমল, তবল, শাব্য শাদা যব সংযুক্ত মণিমণিবল, বহুসংখ্যক ওল,
মলিন, চর্মকমল, তীব্র বেদনা সংযুক্ত মল, মলনাশ বা অনিচ্ছা প্রভৃতি
মূত্রাব অনিচ্ছা বা সর্ববিধ প্রভৃতি ।

কলে। সিঙ্কিস ।

বিবক্তি বা শোক জনিত অবে, বিশেষতঃ নৈতিক উপসর্গের আবস্থা থাকিলে কলোসিস্ত বাবস্থা কদা ঘটাত গায়ে। সর্গশবীরে শীতালুভব, বহিবঙ্গে দয়া পবিশ্রুত উত্তাপ, ও মৃদুগাণি নৈশবায় ইহাব প্রদান প্রমোদ-লক্ষণ। অপব, স্মৃতিকাদবেও প্রসবাত্তিক স্রাবের অববোধ, প্রোদাপ, তন্না, প্রাবল উদব বেদনা, ও তজ্জগা দিউদবৎ অবশাণি চইয়া থাকা; এবং মল-বেগ অথচ নানমাত্রি মনানসবণ লক্ষণে এই বাদ উপকারী। কলোসিস্তের লক্ষণ দাযাক্তে, বিশ্রামে, সক্ষাণনে থানিহাবের এবং ও দোদেব উদ্বেকে বিবর্জিত এবং বায়ুনিমেবণে, ককি সেবনে মপানে, অবশাণি চইয়া থাকিলে, ও ঘটন চাপ প্রদানে উপশান্ত হব।

କଳ୍ପିକମ୍ ।

পূবাতন অধে বা বাহু বিচার মা কানন বটিকম বানসত হয়। শ্রেষ্ঠীক
বেদনাদি অস্ত্র কোন পাড়া থাকিলে এবং এর ফলে—এবং অবেল বিধান সময়ে
তাঁহা বিবদ্ধিত হইলে এতে এবং বাবাহয়। উপে ও সম্মানিত অপেক্ষা
শীতাবস্থার পাননা অথবা শীতের পদে উড়াপারহা প্রকাশিত না হইয়া বস্মা
বস্ত্র প্রকাশ এবং বর্ণদিকে শীত উত্তর। বিশেষ প্রয়োগ বক্ষণ। অবস্থ-
কাথে পাশ-দেশের মাংশ, এবং দক্ষিণে অস্ত্রের শীত, শীতের পদ
বস্ম, পরিবেশে তাপ বক্ষণ, ও বটিকম উপযোগী। দক্ষিণের বক্ষণ শীত
বাহুমে ও আনতায় বাক্ত, এবং অগ্রব উত্তরে ও উপাধাতমে উপস্থিত হয়।

কালনাথ।

পূর্ণাঙ্গ বাল্য, একবছর দিব্যাদির্ঘাতিমুখে শীতের অ-বস্ত্রণ (ভিবাটি);
 বাদিতে শীতাবস্থায় সত্যাহে শীত দিব্যাদি, বাদিত্বাঙ্গত শ্রেষ্ঠা বমন;
 বদন, হস্ত, ও পাদব-বাস্তব-বদন, বদন-বাস্তব-প্রশমিত, সঙ্গশব্দ-
 সঙ্গশব্দ-উচ্চাঙ্গ, বঙ্গ-বাদ্য-বঙ্গ, কিছু মঙ্গল-বঙ্গ ও পদেব অঙ্গুলীর
 বঙ্গ-বঙ্গ-বঙ্গ-বঙ্গ (এট-কুড়, মার্ক, ভিবাটি);

কার্বো ভেজিটেবিলিস ।

যুগ্মশুল, হস্ত ও ওষ্ঠের শীতলতা, জ্বরব বিধান কালে অতিবিক্ত ফুস; কোষ্ঠবদ্ধ, ও কঠিন, শুষ্ক, শুট্লে শুট্লে মল নিঃসরণ;—এই সমস্ত লক্ষণে সর্ববাম জবে কাখালাগুয়া ব্যবহৃত হয়। বসন্তকালব জবেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী (জেলস, ব্যাক, মলক) ।

কার্বোএনিমালিস ।

অল্প কোম পোপোব পদ বা তৎসহকারে জব হটল কখন কখন এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীত ও উত্তাপাবস্থা অপেক্ষা দম্যাবস্থার অতিশয় প্রাবল্য ও অবসরকবতা লক্ষণ ইহা ব্যবহৃত। অগ্নিবাক্ত ও আত্মবাক্তে শীত, সাবাহে শীতাত্তে বয়, প্রাতঃকালব পাকালে ও বসন্তামাঞ্জে পবিশমে মাম্মব উদ্বেক, বানিকাল ছন্দকাবেক, ভগদময় ও বয়ে চিহ্নকব বয়্য কান্দো এনিমালিসেব লম্বন ।

কার্বো ভেজিটেবিলিস ।

পূর্বাতন বা 'সোবা'-বোবা জব, অথবা অধিক পনিমাণ কুতনামে, কি 'আসেনিক সেবনে' অবকক জবে কান্দো ভেজিটেবিলিস বসপ্রদ। চৌহকান, পাটক প্রভৃতি অগ্নিসমীদিগেব বোণে এং পাবদ, বরণ, লবণাক্ত বা পচা মংস্ত মাংস; ও বমা সেবন অনিত বোণেও কান্দো বিশেষ উপযোগী। ডাঃ গবেন্সি বলেন যে শীতাবস্থায় অধিক পিপাসা, উত্তাপস্তায় পিপাসাব অভাব বা স্বল্পতা, এবং অধিবত বায়ু সেবনের ইচ্ছা বিদ্যমান হইলে এই ঔষধের প্রদান প্রয়োজনলক্ষণ। ডাঃ বিদ্যাবানমাল বলেন যে টাইফয়েড জ্বরের অপ্রবর্তিত অবস্থায়ই কখন কখন মর্যাপাদীদি গব দিবা বাত্রি দাত্তকগুয়নের অভিযোগ, অম্মবে জ্বাণা ও তত্তত্ত পাখা কবিত্তে ও জানালা খুলিমা দিত্তে বয়া, এই সকল লক্ষণ সহকারে কান্দো ভেজিটেবিলিস জাপক পতনাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—শিবাব বোণেব প্রাবল্য, শীতশীতক্রিয় সৌন্দর্য; অবিলত বায়ু সেবনের ইচ্ছা; পনিমাকাক্রবাব ক্ষণতা, আমাশয় ও অস্ত্র

নায়ুসঞ্চয়; পানাহাবাস্তে পাকস্থলী যেন ফাটিয়া বাইবে এপ্রকার অনুভব : উদগারে ক্ষণিক উপশম, কৈশিকপ্ৰবক্ত-সঞ্চয়নের হাস বশতঃ অনেক বক্ত-শুষ্কতা, নীলাকৃত্য, এবং হস্তপদাদিব শীতলতা; শবাব শুইয় থাকিলেও হাঁটু, বাম বাহ ও পদেব অতিশয় শীতলতা। ক্রাস-বুদ্ধি ।—প্রাতে, গ্রীষ্ম কালের ওচ ও উত্তাপে, উত্তাপেব আকস্মিক পৰিণতনে, বসাদ্রব্য ভোজনে, ও অধিক কুইনাইন সেবনে বুদ্ধি, এবং হাত-পাখাব বাতাসে, শীতল বায়ুতে, উদগারে ও সাধায়ে উপশম। জ্বরের সময় ।—প্রায়ই সাধায়ে, বারি ১০টা। ১১টার সময়, কখন কখন প্রাতঃকালে জ্বৰ। জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক জ্বৰ, ১।২দিন অন্তৰ জ্বৰ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—জ্বাক্রমণেব পূৰ্বে বা জ্বৰকালীন পায়ের শীতলতা, দন্ত-বেদনা ও গাত্র-বেদনা। কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা (ইচ্ছা)। + একপার্শ্বিক শীত; বামবাহ ও পা হঠতে শীতের আগ্রস্ত (দক্ষিণ বাহ হঠতে, নাক)। শব্দ ও নিশ্বাসেব অতিশয় শীতলতা। আগ্নেয়াহিক শীত প্রায়ই বামদিক প্রকাশিত (বঠে, দক্ষিণদিকে, ক্রান্তি)। হাঁটু; বামবাহ ও পদেব অত্যন্ত শীতলতা, হস্তপদেব শীতলতা; নখেব নীলবর্ণ। কখন কখন জ্বৰেব অনিৰ্য্যমিত আক্ৰমণ অথবা প্রথমে স্বপ্ন তৎপবে শীতের প্রকাশ। উত্তাপাবস্থায় উষ্ণাব অবিদ্যমানতা। উদ্বেগ ও জ্বালাকব উত্তাপ অল্পতৰ, শিরঃপীড়া, শিরোবৰ্ণন, বিবৰ্ণিতা, মুখমণ্ডলেব উজ্জলতা, দাহ্যবস্থায় পদেব শিরঃপীড়াব বিদ্যমানতা। উত্তাপাবস্থায় বহুভাষিতা (লাক, শীত ও উত্তাপাবস্থায় বাচালতা, গাড়ে)। সঞ্চয় বায়ু সেবনেব ইচ্ছা, নিশ্বাস প্রধাসে করে। প্রকৃত জ্বৰ স্বপ্ন, আহাব বাণেও ঘৰ্ম্ম; প্রায়ই শবাবেব উদ্ধাংশে স্বপ্ন, সহজই স্বপ্নসাব ও শীতাল্পতৰ। প্রাণাব ক্ষীণতা ও বেদনা, স্বাসে দুগন্ধ। বিদ্যমানকালে জ্বৰলতা, বিনৰ্ণিতা, ও স্মৃতি ক্ষীণতা। + আহাব বা পান বাণে উদব যেন বিদীৰ্ণ হঠাব একপ্র অন্ততৰ। উদবে বায়ুসঞ্চয়। সন্নিপাতজ্বর ।—স্বপ্নমণ্ডল পাণ্ডুৰণ অস্থঃপ্রবিষ্ট, ও শীতল (হাস, কণস)। চক্ষু অস্থঃপ্রাণে, প্রকাশনা, ও জ্যোতিঃজ্ঞানহীন। জিহ্বা শুষ্ক, নরিন, ও বস্পনশীল, অথবা সময়ে সময়ে অদি ও অর্শোণ। কক্ষা ঘোষ বা অনিষ্টা ও চক্ষু বিনাশ। + জ্বীৰ্ণনী কিসাব সম্পূর্ণ শুষ্কতা,

ঈষৎ কপিশ, ঈষৎ ধূসর, বা রক্তময় অতি তুর্গাক্তি, অনৈচ্ছিক, তুর্কলকর আত্মসাব (আর্স) । * অতিশয় অবসন্নতা, অভ্যন্তরে আলা, তচ্ছষ্ঠ বাতাস প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা । নাসিকা হইতে বাবংবাব বক্তপাত । হস্তপদ শীতল ও শীতল ঘর্ষাজ, নিশ্বাস শীতল । নাসী স্তব্ধ ও প্রায় অপ্রাপ্য । আশ্বাস ; পুনঃ পুনঃ প্রবল উদগাধ । বক্ষঃস্থলে শ্বেশ্বাব ঘড়ঘড় শব্দ ; আঠা আঠা শ্বেশ্বা নিঃসরণ । শার্বীণিক নিঃশ্ববেল তুর্গাক্তি । সুপম তপ, ওষ্ঠ, ও জিহ্বাব নীলবর্ণ সহ ফুনফুসের পক্ষপাত । স্তম্ভি, উদ্বা হইতে কেবল গলকালের জন্ত বোগীকে জাগবিত কবিতো পাবা যাব, কিঞ্চ তখন তাহার দৃষ্টিগতি থাকে না ও সেই অস্পষ্ট কাতরোক্তি ধবে ।

কালিডিয়ম ।

জ্বরের লক্ষণ ।—শীত ।—উদর হইতে শীতের আবস্ত এবং পায়ের পাতা ও হাতের অঙ্গুলী পম্যন্ত উহাব দিস্বৃতি । উদ্ভাপ ।—তুই প্রহর বাত্রি পূর্বে । দাকালে শরীরের উত্তপ্ততা ও হস্তের শীতলতা ; তুই প্রহর বাত্রি পবে শরীরের শীতলতা ও পদেব উত্তপ্ততা, অন্তরে তাপ, উদর দপদপ, অতিশয় বম্বক্ষণ । ঘর্ষাজ ।—তুর্গাক্তি, তচ্ছা, ও তুর্কলতা, ঘর্ষে মক্ষিকা পতন, বম্বে জবেল উপসর্গেণ শান্তি । বিরাম ।—দিবসে নিদ্রান্তে তাপ, তাপে তৃষ্ণা, তাপান্তে বম্ব, বাত্রিবেল বাতাসে শীত, বর্গে স্ততার বেদনা, গল-প্রান্তর শীততা, ও কাষ্ঠবন্দ ।

কালী আইণ্ডেটম ।

গঙমালাগ্রস্ত বোগীদিগেদ মবিদান জবে মুখ শোষ, পিপাসা, ও পদে ফোততা লক্ষণে এই ঔষব ব্যবহার করা বাইতে পাবে ।

জ্বরের লক্ষণ ।—শীত ।—পৃষ্ঠ ও নিম্নাঙ্গে শীতের আশ্রস্ত ও সঙ্গশরীবে ব্যাপ্তি, অগ্নির উদ্যোগে শীতের অমুগশম, কিন্তু গাত্রাবরণে উপশান্তি, বাত্রিতে এক সংসতবৎ অমুতব ; তৃষ্ণা ; তচ্ছা, বাবংবাব জাগরণ ; গাত্র কখনও শুষ্ক, কখনওবা প্রচুর ঘর্ষাজ । উদ্ভাপ ।—উদ্ভাপাবস্থায়

অলঙ্কে ঝলকে তাপাবেশ, অতিশয় তৃষ্ণা, সন্দের সন্দের তৎসহ শীত, কখনওবা প্রচুর ঘাম, মস্তকে উত্তপ্ততা, অবসন্নতা এবং একবার উদ্ভাপ একবার ঘাম । ঘাম্য ।—অত্যন্ত বা উদ্ভাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘাম ।

কালী কার্বনিকম ।

কালী-কার্বন নীরক্ততা হয়। স্রুতসং মীরক্ততা জন্মিত দৌর্দল্য ; এবং বক্তদোগ ও ক্ষুদ্রাশয় সংশ্লিষ্ট জীব এই উৎপাদন বলা বাইতে পারে । কালী বাল্য জাপক বোগ্যে অসংখ্য ও উন্নত, প্রাপক, এজন্ত নাড়ীর বৈষম্য বা সপর্মান দেয় ক্ষতিগ্রস্ত, অথবা নাড়ীর দ্রুততা ও অতিশয় দুন্দলতা থাকে । এই প্রকার নাড়া কালী-বাল্য প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ । এই বিশেষ লক্ষণ হ্রাস সমস্ত লক্ষণের মূল । নাড়ীর পৃথক ও গোলায় থাকিলে এই উৎপাদক একেবারেই ব্যবস্থেয় হয় । কালী-বাল্য কালো ভেজিটেবিধিগের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ একটাবাণী সম্যক উপকার না দানের অপবী উপবাসক ও আবেশক । কালিদান বগেন যে সাধারণ বৈকি মিনিট অতিশয় শীত-তাজ্জ্বল্য শূন্য পাণিবাব আবশ্যকতা, তৎপরে বিবসিবা ও বমন এবং মস্ত বাহি বক্ষস্থলে আক্ষেপিক বেদনা, শ্বাস-তৃষ্ণতা, আভ্যন্তরিক উদ্বেগ ও অতিশয় ঘাম ; জীব এই উৎপাদক প্রয়োগ-বসন । ৮% গ্লিসেরিনমাণ শীত ও তাপাবস্থায় শ্বাস কষ্ট, বক্ষস্থলে আকুশন, মাস্ত্র প্রদেশে বেদনা, শীতে পিপাসা আদিকা, প্রবলতঃ উদ্ভাষ ঘাম্য । ও প্রমে সহজে ঘাম্য উদ্বেক লক্ষণে মনিসান জীব কালী কার্বন ব্যবহারের ববি দেন ।

জ্বরের লক্ষণ ।—শীত ।—অজকালহাবী প্রবল শীত, শীত সহকারে প্রগণিতা, অগ্নি উদ্ভাপ ও শব্দে শীতের উপশম, নড়িলে চড়িলে ও গৃহস্থ বাহিরে গেল শীতের বন্ধি, সন্ধ্যাকালে ও আহ্নাস্তে শীতের অতিশয়, বেদনাসহকারে শীত, পশ্চৎ শীতোদ্ভাপ, পর্যায়ক্রমে শীতোদ্ভাপ, অস্তরে উদ্ভাপ ও তাজ্জ্বল্য প্রবল পিপাসা, শীতাবস্থায় বিবসিবা, বমন, বক্ষস্থলে বেদনা, বক্ষস্থলে বেদনা, শ্বাস-তৃষ্ণতা, হস্তের উদ্ভাপ ; আভ্যন্তরিক অপ্রতি, শীতাস্তে পিত্ত বন । **তাপ ।**—অস্তরে তাপ বাহিরে শীত, শীত ও উদ্ভাপে শ্বাস কষ্ট, বদন অপ্রকৃত ও উত্তপ্ত, চব্বৎ বদনবৎ

শীতল (দিপি)। ঘর্ম্ম।—রাগিতে, প্রাতে, নড়িলে চড়িলে, ও মানসিক
 "রিশ্রমে ঘর্ম্মের নিঃসরণ, উদ্ধাঙ্গে ঘর্ম্মের আধিকা, উষ্ণ ও অন্ন-গন্ধ ঘর্ম্ম
 ঘর্ম্মাভাব। বিরাম।—অক্ষিপুট সংযোজন; বক্ষঃস্থলে চাপাছুভব; বক্ষঃদেশে
 বেদনা ও স্পর্শ-দেব, আহ্বাস, বিশেষতঃ কটিতে অপ্রবৃত্তি; অতিশয় তৃষ্ণা;
 উদবেগ বায়ু-পূর্ণতা। হ্রাস-বুদ্ধি।—রাত্রি ছই তিনটাব সময়ে, বিশ্রামে,
 ও শীতলতাবে বুদ্ধি। উত্তাপে, উত্তাপাঘাত, ও উদ্ধাঙ্গে হ্রাস।

কালী বাইক্রমিকম।

কৃষ্ণকাস বাক্তি, বিশেষতঃ হ্রাস শিশুদিগের রোগে এই ওষধ বিশেষ
 উপযোগী। নৈমিষিক শিখার ত্বাচ্ছদা, বায়ু সদন প্রাব, প্রাহা প্রাতঃকালে
 একই সময়ে শিরোপাতা, শনি-বিকল্লমিত বেদনা, এবং রোগ লক্ষণে
 সহসা আদির্ভাব ও ত্রিসোভাব ইহাব বিশেষ লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—শীতের পদে আশ্রয় ও তথা
 হইতে উদ্ধে উত্থান, প্রক্ষাল, পদে পদে পুনঃ পুনঃ সঙ্কোচন অসম্ভব, পৃষ্ঠে
 শীতানুভব সহকারে নিদ্রাত্যাগ, জ্বর, ও অঙ্গমন্দ, শিরোঘর্ষণ, বিবমিষা;
 অনন্তর উত্তাপ সহকারে কম্প ও থাকিয়া থাকিয়া রণের বেদনা। শীতের
 একদণ্ডা পবে মূখ শোণ, তৎকাল বাক্যবান মূখ ভিজাইতে হয়। উত্তাপ।
 —হাতে ও পায়ের পাতায় উত্তাপ, বিবমিষা, উদবোধে বেদনা, থক থক
 কাশ, অনিদ্রা; তৎকালে উষ্ণ ও পায়ের পাতায় ঘর্ম্ম হইয়া যাতনার উপশম;
 দুইঘণ্টা পবে আবার পূঙ্নরূপ উগমর্গ, কোপনতা, উদ্ধাঙ্গে জ্বালা, ও তাপ,
 অন্তরে শীত, অতিশয় পিপাসা তাপের পদ ঘর্ম্ম। ঘর্ম্ম।—একবার ঘর্ম্ম
 একবার উত্তাপ, কচিং ঘর্ম্মাভাব। রাত্রি প্রথমভাগে, বা ব্যক্তিতে, অথবা
 প্রাতে জ্বরের আধিকা। হ্রাস-বুদ্ধি।—প্রাতে, শীতলতাবে, ও আহ্বাসে
 বুদ্ধি। উত্তাপে, ও সঙ্কাল প্রাবলে হ্রাসপ্রাপ্তি।

কিউরেয়ার।

অপরূহ ২৩টাব সময় সমাগত প্রাত্যহিক জবে রোগী ব্যক্তিতে

খ্যাকলে ; এবং আংশিক বা ক্ষণিক শীত সহকারে দাহকর উত্তাপ , অস-
লম্ব বাক্য ; অতিশয় অবসন্নতা ; অনেক সময় দেহ-শাখার অর্থাৎ হস্তপাদাদির
পক্ষাঘাত ; শীতল ও বক্তাক্ত ঘর্ম (বিশেষতঃ রাত্রিতে) ;—এই সকল লক্ষণে
সবিরাম জ্বরে কিউরেয়ার ব্যবস্থা করা যায় । প্রতিদায়িত শীত সংযুক্ত দুর্বিত
সবিরাম জ্বরেও ইহা ব্যবহেয় ।

কুপ্রম ।

প্রবল জ্বর , ফোট-জ্বর ; পদেব ঘর্মাববোধ বশতঃ জ্বর , ও বিলেপী জ্বরে
কুপ্রম ব্যবহৃত হয় । ফোট-জ্বরে উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া আক্ষেপ, মুখ-বিকৃতি,
অস্থিরতা ও প্রলাপাদি উপসর্গে কুপ্রম উপকারী । টাইফস জ্বরেও ইহার
ব্যবহার আছে ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—সর্বশরীরে, বিশেষতঃ
হস্ত ও পদে শীত, অপস্মাবের আবেশেব পরে শীত, শরীরেব বরফবৎ শীতগত,
ও হস্তপদে থলী । অন্তবে ঝলকে ঝলকে দুর্বলকর উত্তাপাবেশ, পদতলে জ্বালা ।
রাত্রিতে শীতল, আঠা আঠা প্রচুব ঘর্ম । সন্নিপাতজ্বর ।—তীব্রজ্বর, ও
অত্যন্ত দুর্বলতা সংযুক্ত টাইফস জ্বর ; রক্তের বিসমাসিত অবস্থা, নাসিকা
হইতে রক্তপাত ও গাত্রে দংশ-পোড়কা (পিটেকি) ; স্নায়বীয় উত্তেজনা সহ
অতিশয় অবসন্নতা ; অস্থিরতা ও পার্শ্ব-পরিবর্তন ; প্রতাপ্ত, অপরিচ্ছন্ন
(ঝাপসা) চক্ষু , প্রতিক্ষীণতা ; জংপিণ্ডের পক্ষাঘাত ।

কোনিয়ম ।

জ্বরের লক্ষণ ।—শীত ।—কম্প, রোদ্র সেবনের ইচ্ছা
(অগ্নি সেবনের ইচ্ছা, ল্যাক) ; পূর্বাঙ্কে শীত, অপরাঙ্কে কম্প, সর্বাঙ্কে
বরফবৎ শীতল ; শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কেব আকুঞ্চন অমুভব ;
মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, বিবমিষা, করতল ও পদতল শীতল ; নখের নীল বর্ণ ;
চিহ্নের নৈরাশ্র ও উদাশ্র । তাপ ।—অতিশয় স্নায়বীয়তা সহকারে দাহ ;
অন্তরে ও বাহিরে অতিশয় তাপ ; তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ঘর্ম । ঘর্ম ।—

দিবাবাত্রি, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে ঘর্ম, এমনকি চক্ষু বুজিলেই ঘর্মের উদ্বেক ।
বিরাম ।—সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ।

ক্যাঙ্কিস ।

প্রাত্যহিক সন্নিবাম অব পূর্নাক্ষ ১১টা, অথবা বাত্রি ১১টার সময় উপস্থিত হইলে, বিরামকাল অস্পষ্ট ও উপদ্রবপূর্ণ থাকিলে ; এবং দীর্ঘস্থায়ী শীত, পৃষ্ঠ ও হস্তদ্বয়ে শীতলতা, আবক্তিম বদন, প্রবল বমন, অস্থিভতা, মূত্রাশয়ে বেদনা, মূত্র রোধ, শীতের পব উত্তাপ, মস্তকে বক্তাধিকা, শিরঃপীড়া, শ্বাসের খর্ব্বতা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, উদরে অসহ্য উত্তাপ, অধিক তৃষ্ণা, ও প্রভূত ঘর্ম (হর্যোত্তাপজনিত জবে ঘর্মভাব) লক্ষণে ক্যাঙ্কিস ব্যবহৃত হয় ।
* হর্যোত্তাপ লাগিয়া অব হইলে অথবা পুনঃ পুনঃ অব প্রত্যাবর্তন করিলে এই ঔষধ উপযোগী । ঠিক একই সময়ে জ্বরের উপস্থিতি, পৃষ্ঠ ও হস্তের শীতলতা, এবং মূত্রাবরোধ ইহাব বিশেষ লক্ষণ । ক্যাঙ্কিসের লক্ষণ নড়িলে চর্ডিল ও স্পর্শে বদ্ধিত এবং বাহিরের বাতাসে উপশমিত হয় । ক্যাঙ্কিস জরে বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না । আবেগিয়া, সিড্রন, ও মিকোনা ইহার সমগুণ ।

ক্যাংস্টেরিস ।

মূত্রত্যাগে আলাঘন্ত্রণা ; শীতাবস্থাব অবসানে হস্তপদের শুষ্কতা ও অধিক-
পিপাসা ; এবং জননেদ্রিয়ে মূত্র-বন্ধি ঘর্ম ক্যাংস্টেরিসের বিশেষ লক্ষণ । জরে কেবল শীত ও কম্প, শীতান্তে পিপাসা, চক্ষু বেদনা ; অর সহকারে উপস্থের শীততা, মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গে বাতনা, কষ্টে মলিনবর্ণ বিন্দু বিন্দু, অথবা রক্তমিশ্রিত মূত্রত্যাগ ; মূত্রত্যাগকালে এবং কংপূর্বে ও পরে অতিশয় কুহন ; মুখ শোষ, তৃষ্ণা, গাত্রবেদনা, ও নড়িতে চড়িতে অশক্তি, বাত্রিতে আলাকর উত্তাপ, কিন্তু বোগিগীর তাহা অনুভব ; পিপাসা সহ উত্তাপ, এইগুলি এই ঔষধ ব্যবহারের প্রধান লক্ষণ । মূত্র-পথ আক্রান্ত হইলেই ইহা বিশেষ উপযোগী ।

ক্যাম্পিকম ।

দীর্ঘস্থায়ী শীতবিশিষ্ট বিষমজ্ববে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । উত্তাপাবস্থার পরে ঘর্ম্মাবস্থা প্রকাশ না পাইয়া একই সময়ে তাপ ও ঘর্ম্ম প্রকাশিত হইলে ক্যাম্পিকম ব্যবহৃত হয় । গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যায় জ্ববে ইহা বিশেষ উপযোগী । পৃষ্ঠে, বাহ্যঙ্গের উর্দ্ধভাগে শীতের আকন্ত ইহাব বিশেষ লক্ষণ । ক্যাম্পিকমেব শীত, তাপ, ও ঘর্ম্ম সকলই নড়িলে চড়িলে উপশমিত হয় । পূর্ক্সে ১০।০টার সময়, অথবা অপরাহ্নে ৫।৩টার সময় ক্যাম্পিকমেব অব প্রকাশিত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সন্ধ্যায় জ্বর ।—শীতের পূর্ক্সে ও শীতাবস্থায় পিপাসা, এবং পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা (অস্থিতে বেদনা—ইউপ-পার্কো) । পৃষ্ঠে, স্কন্ধদ্বয়ের মধ্য হইতে শীতের আবন্ত ও সর্ক শরীবে ব্যাপ্তি (ইউপ) । পিপাসাসংযুক্ত শীত, তদনন্তর পিপাসাশূন্য দাহ । জল পানে শীতের বৃদ্ধি (আর্ম, চায়না, নক্স, ভিরাট) এবং * পৃষ্ঠদেশে উত্তপ্ত দ্রব্যাদি দ্বারা উত্তাপ প্রদানে উহাব হ্রাস । শীতান্তে ঘর্ম্ম । ঘর্ম্মেব সহিত মিশ্রিত, তৃক্ষাপবিশূন্য সামান্য উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায় শিবঃ-পীড়া ও তন্দ্রা । নাড়ী বিষম ও পর্য্যায়শীল (ক্ষণ-বিলম্ব) ।

ক্যাম্ফর ।

শীত প্রধান বিষম জ্ববে শীতাবস্থার প্রায়নো, দূষিত বিষম জ্ববে ; এবং শর্দি জ্ববে প্রাচুর্য্যে ক্যাম্ফর ব্যবহৃত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সন্ধ্যায় জ্বর ।—তৃক্ষাশূন্য শীতাবস্থা, দীর্ঘস্থায়ী কম্প ; সমগ্র শরীরেব তুসানবৎ শীতলতা, বদনেব শ্রাবণ, অল্প মাত্র শীতল বাতাসও সহ কবিত্তে না পাবা, গায়েব তুর্বাবের ত্রায় শীতলতা সবেও বজ্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা, তৃক্ষা পরিশূন্য উত্তাপাবস্থা ; উত্তাপ সহকারে শিরার ক্ষীততা ; নড়িলে চড়িলে উত্তাপেব বৃদ্ধি, তর্কালকর প্রভূত শীতল ঘর্ম্ম, অতিশয় উৎকর্ষ ও দুর্বলতা ক্যাম্ফরেব প্রধান লক্ষণ । সন্ধ্যায় জ্ববে বিসৃ-চিকােব পতনাবস্থা লক্ষণেব ত্রায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর ফলপ্রদ । এপিস, কার্কো, ফেলস, নক্স, ভিরাট লোক প্রভৃতি ঔষদও উপযোগী ।

ক্যাম্ফরের লক্ষণ শীতল বাতাসে, রাত্রিতে, ও নড়িল চড়িলে বৃদ্ধি পায় ; এবং উত্তাপে, উষ্ণ বাতাসে, ও শীতল জল পান হ্রাস পড়ে । সন্নিপাত জ্বর ।—আকস্মিক অবসন্নতা ; সর্পশবীবের তুষাববৎ শীতলতা, মুখমণ্ডলেব মৃতবৎ পাণ্ডুরতা, শীতল আঠা আঠা ঘর্ষ, অথচ আবৃত থাকিতে আঁনছা ; গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ; উত্তপ্ত শ্বাস ; অনৈচ্ছিক অতিসার ; এই সকল লক্ষণে সন্নিপাতজ্ববে ক্যাম্ফর ব্যবহৃত হয় ।

ক্যামোমিলা ।

ক্যামোমিলা জ্ঞাপক অব প্রাদাহিক নহে, কিন্তু ঔপদাহিক । অল্পে অজীর্ণদ্রব্যের সংগ্রহ, অথবা দন্তোদ্বৈদ জনিত উপদাহ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয় এবং বাহাতে স্নায়ুমণ্ডল অতিশয় উত্তেজিত হয়, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত হয়না, যন্ত্রণায় অতিশয় অধীবতা জন্মে এবং অনেকক্ষণ একভাবে থাকিতে পারা যাযনা, উত্তাপে সমগ্ন অবস্থা বিবর্জিত হয়, পেশীব শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে ; এবং কেবল কোন পেশীব স্পন্দন ও উৎক্ষেপ, এবং অবশেষে সর্কাক্সীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অর্থাৎ শিশুদিগেব দন্তোদ্যম জ্বরে, শব্দ জরে, ও অগ্ন্যন্ত প্রকার জরে, এবং ক্রোধ বা বিবর্তিত বশতঃ স্নায়ু ক্রিয়া বিকায জন্মিয়া যে পিত্ত-জ্ব উৎপন্ন হয় তাহাতে ক্যামোমিলা বিশেষ উপযোগী । অনেক সময় ক্রোধ বা বিবর্তিত বশতঃ স্পষ্ট জ্বর না হইয়া তৎপরিবর্তে স্তূতীত্ৰ উদব-বেদনা, পিত্ত-মিশ্রিত তিক্ত বমন বা কাঠবিমি ও উদরাময় জন্মিয়া থাকে ; সে স্থলেও ক্যামোমিলা উপকারী । প্রতীতিব স্মৃতিকা জ্ববে প্রসবাস্তিক স্রাবাববোধ, স্তন-দুগ্ধ বিলোপ, দুগ্ধবৎ শুভ্র ভেদ, প্রসব-বেদনার স্রায় বটি-বেদনা, শিরোবেদনা, ও বক্ষঃস্থলে স্বেদনাদি লক্ষণেও এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

বিশেষ লক্ষণ ।—শিশুখ খিটে খিটে স্বভাব । কোলে করিয়া বেড়াইলে স্থিৰ থাকা বা শাস্ত হওয়া (এতদ্বিপৰীত, তাই) । এক গাল লাল, অগ্ন গাল পাণ্ডুর । হ্রাস বৃদ্ধি ।—প্রাতে (নয়, তাই), দুইপ্রহর রাত্রিব পূর্বে, উত্তাপে ও ক্রোধেব উদ্বেক বৃদ্ধি, সায়াহ্নে (বৃদ্ধি, পলস), অনাহারে, ও আর্জবায়ুতে হ্রাস । জ্বরের সময় ।—পূর্নাক্ষ ১১টা, অপরাহ্ন ৪টা হইতে

রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ; শীত শূন্য জ্বর পূর্বাঙ্ক ৯টা হইতে ১২টা । জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক ; ১।২ দিন অন্তর ; ও প্রত্যাহ দুই ঘণ্টা কবিরী অগ্রগামী জ্বর ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—শীতাবস্থায় তৃষ্ণার অবিদ্যমানতা (কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, কার্কো, ইয়ে) ; উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা । শীতের অন্নতা, উত্তাপ ও ঘর্ম্মের আধিক্য । কোন কোন অঙ্গ শীতল, কোন কোন অঙ্গ উত্তপ্ত ; সর্কাসে শীত, মুখমণ্ডলে উত্তাপ এবং উত্তপ্ত নিশ্বাস । শরীরের সম্মুখভাগে শীত ও পশ্চাৎভাগে তাপ, অথবা সম্মুখভাগে তাপ, পশ্চাৎভাগে শীত । দাহাবস্থায় সময়ে সময়ে শীত । এক গণ্ড আরক্ত ও উত্তপ্ত অপব গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ (একন, নক্স) । জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণ লেপ, জিহ্বাব পার্শ্বদ্বয় শুভ্র, মধ্যভাগ আরক্ত । বিবমিষা, পিত্ত-বমন, উদরাময় । *নিম্নোদরে বেদনা । বারংবার অধিক পরিমাণে জলবৎ মূত্রত্যাগ । বস্ত্রাবৃত দেহাংশে অপর্ঘ্যাপ্ত ঘর্ম্ম । মুখমণ্ডল ও মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম । বিচরণে ঘর্ম্মের বিলোপ, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় পুনরুদ্ধেক (সাধু) । অতিশয় অসহিষ্ণুতা, কেহ'কিছু গিঞ্জাসা করিলে অশিষ্ট উত্তব প্রদান । সন্নিপাত জ্বর ।—^{ফিজীয়} অবস্থায়, অপরাহ্নে মুখমণ্ডলে আবরুতা ও জ্বরের উত্তাপ, তৎসহকাবে কর্ণ-মূলের ক্ষীততা ; মুণের শ্লেথিকঝিল্লীর আরক্ততা ও বসশূন্যতা ; বিদ্যাবিত ও লেপারত জিহ্বা ; মুখে পচা ও তিক্ত আশ্বাদ ; স্বাসে দুর্গন্ধ ; প্রবল পিপাসা, বিমল জল পানিব অতিশয় ইচ্ছা ; বিবমিষা, তিক্ত বমন ; আমাশয়ে ভারবোধ ; উদব-বেদনা ; প্রচাপনে উদবেব অতিশয় স্পর্শাহুতাবকতা ; হরিতাভ পীতবর্ণ, জলবৎ মল ; পীতাভ অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট মূত্র ; শর্দিজনিত স্বরভঙ্গ ; বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাব শব্দ ; কণ্ঠনালী কণ্ঠ্যিত হইয়া কাসেব উদ্বেক ; বক্ষঃস্থলে ভার ; কর্তনবৎ যাতনা ; ও আলা ; নিদ্রাশূন্যতা ; গাত্র-স্পন্দনসহ নিদ্রিতাবস্থা ; প্রলাপ ; ঘর্ম্মশূন্য জ্ববেব উত্তাপ ; উৎকর্থা ; স্নায়বীয় উপদাহ ; দীর্ঘনিশ্বাস ও কোঁকানি ।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা ।

শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু ; গওমালা-ধাতু, দুর্বলতা, উণ্ণবে উঠিতে শিবোঘূর্ণন ও স্বাস্থ্যতা ; স্থূলত্ব-প্রবণতা ; পদদ্বয় আর্দ্রবজ্রাবৃতবৎ অমুভব ; শিশুগণের শিথিল পেশী ; অল্পেই অধিক ঘর্ম ; সহজেই শর্দিলাগা ; অস্থি জন্মিতে, দাঁত উঠিতে, ব্রক্ষরক্ষের অস্থি ছোড়া লাগিতে ও হাঁটিতে শিথিতে কালবিলম্ব ; নিদ্রাবস্থায় মস্তকে ও ঘাড়ে প্রচুর ঘর্ম এবং তজ্জন্ত বালিশ ভিজিয়া যাওয়া ; মাথা ও পেটের বৃহত্ব ; নাবীদিগের অল্প বয়সেই ঋতু আবস্ত হইয়া অধিক দিনব্যাপী ও অধিক পরিমাণ বজ্রাব ; অবশেষে ঋতু ব লুপ্ততা বা স্থলতা , — এই সকল অবস্থাপন্ন ও বিশেষ লক্ষণাবিত বোগীদিগের পক্ষে শর্দি জন্মে, বাতের জন্মে, কুইনাইন আটকান জন্মে, বিলেপী জন্মে, পুণাতন জন্মে, এবং মীহা-যকৃদাদি উপসর্গ সংযুক্ত জন্মে ক্যালকেরিয়া ব্যবহৃত হয় । একাঙ্গীন ঘর্ম ক্যালকেরিয়াব একটী নিশ্চিত লক্ষণ । জলে দাঁড়াইয়া বা ভিজিয়া কাজ করা জন্মের কারণ হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে । ক্যালকেরিয়াব লক্ষণ ঠাণ্ডা বা ভিজা বাতাসে, জলে ভিজায়, উচ্ছে উঠায়, শারীরিক ও মানসিক পারিশ্রমে বর্ধিত ; এবং শুষ্ক উষ্ণ বায়ু সেবনে উপশমিত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—বেলা ২টার সময় জ্বর ।

জ্বরের পূর্বে মস্তক ও শরীরের গোণব, সমস্ত গ্রন্থিতে আকর্ষণ বৈদমনা । শীতাবস্থায় পিপাসা ; আমাশয়প্রদেশে শীতের আবস্ত, ও তথায় শীতলতা ও চাপামুভব ; শীতান্তে উত্তাপ অন্তর্ধান । বাহিরে শীত অন্তরে তাপ, অথবা একবার শীত একবার তাপ (আর্স) । মুখ, দস্ত, চরণাদি এক একটী জ্বরের শীতলতা ; মস্তকে তুষাববৎ শীতলতা অমুভব ; শরীরভাষ্তবে শীতলতা মুভব । * পদদ্বয় আর্দ্রবজ্রাবৃতবৎ অমুভব । শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা । উত্তাপান্তে শীত ও হস্তের শীতলতা । উত্তাপাবস্থায় পিপাসাব অবিদ্যমানতা । ঝলকে ঝলকে বারম্বার উত্তাপাবেশ । মস্তকে বক্তেব প্রধাবন ও অতিশয় উত্তাপ । উত্তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে চেষ্টা (সিক, মল্ফ) । রাত্রিতে অ-স্তবে, বিশেষতঃ হাতে ও পায়ে উত্তাপ । প্রাতঃকালে ও সামান্য পবিশ্রমে ঘর্ম-স্রাব । ঘর্মাবস্থায় তৃষ্ণাব অভাব । ঘর্ম্মান্তে প্রায়ই নিদ্রা । অতিশয়, দ্রব ও শুষ্ক ও অজীর্ণ দ্রব্য সংযুক্ত অপরিপাকের দ্বায় মল, পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও

উদবাসন । জরের বিবাহ সমাক ও স্থল্পষ্ট নহে । সন্নিপাতজ্বর ।—টাইফয়েড জরের প্রারম্ভাবস্থায় অস্থির নিদ্রা ও বিবর্তিজনক স্বপ্ন দেখিয়া জাগরণ ; পুনর্বার নিদ্রা ও পুনরায় সেই বিষয়েই স্বপ্নদর্শন ; চক্ষু রক্ত কবিবামাত্র মল্লম্বা ও দ্রব্যাদির প্রতিক্রিয়া দর্শন, চক্ষু মেলিলে আবার তাহাদের তিরোধান, হৃৎকম্প ; ব্যাকুলতা ; প্রতি-শক্তির ন্যূনতা ; নাসিকা হইতে রক্তপাত ; বক্ষাস্থি বন্ধে অবিরত কণ্ঠ্যন ও তজ্জগৎ শুষ্ক কাদ (রস) । টাইফয়েড অব্যব প্রবর্তিত অবস্থায় উদ্বেদ উৎপন্ন না হওয়াতে বোগীর একপ্রকার অচেতনতা ; উদরের ক্ষীণতা ও আত্মান ; অচেতনতা সত্ত্বেও অস্থিরতা, আকুলতা, ও ক্রিষ্টতা ; চিৎকাব করিয়া উঠা ও শয্যাবস্ত্র খুঁটা ; গাত্রের অতিশয় উত্তাপ কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল ও আঠা আঠা, নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা ও ভীতবৎ চারিদিকে দৃষ্টিপাত ; অতিশয় বা কোষ্ঠবদ্ধ ; প্রাতে, বা সামান্য সকলনে প্রচুব ঘর্ম্ম ।

ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোজা ।

ক্যালকেরিয়াস্থচক গুণমালা ধাতু ও আর্সেনিক জাপক জরের লক্ষণ বিমিশ্রিত থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহ ও গ্রীবাভিমুখে শিড় শিড় কবিয়া শীতের গতি ; ত্বকের সমীপবর্তী স্থানগুলি যেন উষ্ণ হইয়াছে একপ অনুভব । পৃষ্ঠে শিহবণ, গাত্রে বোমাক, রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ; মূত্রে অণ্ডলাল নিঃসরণ, অপবাহে যেন পেট কাঁপিতেছে একপ্রকার অনুভব ও তৎসহ শীতল জলেব তৃষ্ণা ; সন্ধ্যাকালে শীতাবস্থায় ক্ষুধাবিশূন্যতা ; হৃৎকম্প সহ ত্বকের উত্তাপ । বাত্রি তিনটার সময় ঘর্ম্ম । এই ঔষধের লক্ষণ ।

ক্রিয়োজোট ।

জ্বরের লক্ষণ ।—শীত ।—শীতের প্রাধান্য, বিশেষতঃ স্থির ভাবে থাকিলে ; কম্পসহকারে সুগমগলে ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ ; গুণস্থলেব আরক্ততা, পদেব বরফবৎ শীতলতা, প্রত্যুষে নাসিকা হইতে রক্ত-

পাত ; জ্বাল-দৃষ্টি, তজ্জ্বাল বারংবার চক্ষু বর্ষণ, চক্ষুর আকৃতা ও উষ্ণ অশ্রু-
স্রাব ; বাহ্য উপবিভাগে গুরুত্ব অনুভব, কোপন স্রাব । উত্তাপ ।—মুখ-
মণ্ডলে তাপের আতিশয্য, গালের কিষদংশের আবদ্ধতা ও উত্তপ্ততা ।
ঘর্ম্ম ।—গালের উত্তপ্ততা ও আকৃতা সহ প্রাতে অল্প অল্প ঘর্ম্ম ।

চায়না বা সিক্কোনা ।

প্রাদৌহিক জবে একোনাট ও সরিপাত জবে আর্সেনিক বেকপ
উপকারী, বিবেপী জবে (হেক্টিক দিবাব) চায়না সেইকপ ফলপ্রদ । চায়না
পর্যায়-নিবাবক ও ম্যালেরিয়া-নাশক । কানিমান এগেন যে সবিবাম জরে
উষ্ণাবস্থার অব্যবহিত পূর্বে ও পদে পিপাসা, কুৎস্পন্দ, ব্যাকুলতা, বিবমিষা,
দুঃস্থখা, আনাশয়ের উদ্ধদেশে বেদনা ; অথবা শিবোবেদনা ও অতিশয় তৃষ্ণা
সহকারে জবেব আক্রমণের আবস্থ, মস্তকে বক্তের গতি, বাহ্যশিরার প্রসারণ ;
—এইগুলি চায়নার প্রয়োগ লক্ষণ । ডাঃ বেইস বলেন যে শীত, উষ্ণ, ও
ঘর্ম্মাবস্থা যথানিয়মে প্রকাশিত হইলে এবং বিবাম-কাল স্পষ্ট থাকিলে বিষম
জরে চায়না বিশেষ ফলপ্রদ । ডাঃ চার্লি বলেন যে অকৃত শীত ও উষ্ণাব-
স্থায় পিপাসার অভাব চায়নার বিশেষ লক্ষণ । শীত বা উষ্ণাবস্থায় পিপাসা
থাকিলে এবং একেবারে ঘর্ম্ম না হইলে এই ঔষদ ব্যবহৃত নহে । উষ্ণাবস্থার
পব দুঃস্থগকব ঘর্ম্ম থাকিলেই এই ঔষদ বিশেষ উপযোগী । চায়নার জব
কখনও বাত্রিতে হয় না । সজল স্থলের ও ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের জবেই
ইহা ভাল খাটে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—একদিন পব একদিন বোগের বৃদ্ধি । শারীরিক
রসপত্রাদি তবণ বিধানের, বিশেষতঃ বক্তব অগুণ্য জনিত মন্দফল । অন্ন-
মাত্র বায়ু-প্রবাহে শ্রেণীভূত । প্রতিতে ও অস্থিতে ছিন্নকব বেদনা ; বাত্রিতে
আহাবাস্তে, ও স্পর্শে সেই বেদনা বৃদ্ধি এবং পুনঃ পুনঃ অঙ্গ-লঞ্চালনে উহার
উপশম । অতিশয় দুঃস্থতা ও দাবিশ্রমে অপ্রতি । উদরাগ্নান ও উদ্রাবে
উহার অনুপশম । উদরাগ্নান সংকুল, বেদনাশূন্য, অজীর্ণদ্রব্য সংমিশ্রিত মল ।
হ্রাস-বৃদ্ধি ।—একদিন অস্থব একদিন, স্পর্শে, বাত্রে, বাত্রে, দুঃস্থপানে ;

ঠাণ্ডা লাগিলে, কুজ্জ হঠাৎ বসিলে, মানসিক উত্তেজনা, ও নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি। উত্তাপে ও স্থির থাকিলে হ্রাস। জ্বরের সময়।—দিবাভাগে যে কোন সময়, মধ্যাহ্ন, অপবাহ্ন ৫টা ও পূর্নাহ্ন ৫টা। জ্বরের প্রকৃতি। একদিন বা দুইদিন অন্তর; প্রাত্যহিক, একদিন কম, অন্তরদিন অধিক; দ্বৌকালীন; অগ্রগামী, সপ্তাহিক বা পাকাস্তিক অব।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—ক্ষুদ্র ও দ্রুত নাড়ী, আহাবাস্তে নাড়ীর বেগেব হ্রাস। শীতাবস্থার পূর্বে বিবমিষা, ক্ষুধা, উদ্বিগ্ন, দ্বংকম্প, ও অতিশয় পিপাসা; প্রতিবার জলপানান্তে শীতানুভব। সর্বাঙ্গীন শীত, শীতাবস্থায় পিপাসা-শূন্যতা, জলপান শীতের বৃদ্ধি। পর্যায়ক্রমে শীতোদ্ভাপ, ত্বকেব শীতলতা ও নীলবর্ণ। দাহাবস্থায় মুখ ও ওষ্ঠের শোণ ও জ্বালা; আবক্ত মুখদণ্ডল ও শিবঃপীড়া। দাহাবস্থায় পিপাসাব অভাব, অতিশয় ক্ষুধা বা আহাবে অগ্রবৃদ্ধি। দাহাবস্থার পব পিপাসা ও অতিশয় ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসাব বৃদ্ধি। নিদ্রাবস্থায় অথবা শবীর বস্ত্রাবৃত করিলে অতিশয় ঘর্ম্ম। যে পার্শ্বে শয়ন করা যায় সেই পার্শ্বে ঘর্ম্ম। ছর্দ্বলকব প্রভূত ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ বান্ধিতে। অব্যবস্থায় অতিশয় আলস্য ও ছর্দ্বলকব ঘর্ম্ম, কর্ণে শব্দ, শিবোদ্বৃগ্ন, ও মস্তক বিবদ্ধিত অনুভব, বদনের পাপুসতা; গীহা-বক্তৃতা বেদনা ও বৃদ্ধি; প্রস্রাবের অলমতা, নড়িলে চড়িলে বা সামান্য পবিশ্রমে সমস্ত লক্ষণেব বৃদ্ধি। ঘর্ম্মাদিকাদিশিষ্ট তকণ অব। (আর্সেনিক ও চায়নাব প্রভেদ আর্সেনিকে দ্রষ্টব্য)। ছর্দ্বলকব দৈনন্দিন ঘর্ম্মাদিশিষ্ট বিলেপী অব। সন্নিপাত জ্বর।—অধিক বক্তৃতায়েব পব ছর্দ্বলতা।

চিনিম সলফিউরিকম বা কুইনাইন ।

এক্ষণে, অব হইলেই কি ভদ্র, কি ইতব সকলেই কুইনাইন অবের অমোঘ ঔষধ মনে কবিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে উৎসাহেবন কবিয়া থাকেন। নির্বিশেষে ও অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবনে কুইনাইনেব অপব্যবহার হয়। কুইনাইনের অপব্যবহারে অতিশয় অপকাব জন্মে। এজন্য, যথোপযুক্ত অবস্থায়ই কুইনাইন ব্যবহার করা বিহিত। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেবা নিম্ন লিখিত কয়েকটা বিষয়েব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কুইনাইন ব্যবহার করেন। (১) প্রথম

জ্বরের শীত বা দাহাবস্থাব পবে ঘর্ষাবস্থায় অর্থাৎ জ্বরের বিবামকালে কুইনাইন ব্যবস্থেয় । (২) অস্ত্র পবিষ্কার না থাকিলে উহা সেবন কবান বিহিত নহে । (৩) জিহ্বা মলিন ও নাড়ী চঞ্চল থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগ নিষিদ্ধ । (৪) মস্তিষ্কে বক্তাবিক্য, শিবোবোগ, অন্নসহানালীব প্রদাহ, তরুণ জতিসাব, ও বক্রতে বক্তাবিক্য থাকিলেও কুইনাইন ব্যবস্থেয় নহে । (৫) কুইনাইন জরায়ুতে ক্রিয়া কবে, অতএব গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধানে উহা ব্যবহাব কবা উচিত ।

হোগিওপ্যাডি মতে তরুণ ও উপনর্গশৃণ্ড মাল্যেবিয়া জবে বিবামকালে কুইনাইন ব্যবহৃত হয় । মাল্যেবিয়া জবে শীত, তাপ, ও ঘর্ষাবস্থা যথানিয়মে উপস্থিত হইলে কুইনাইন প্রায়ই বার্থ হয় না । ডাঃ হেল বলেন যে জিহ্বা পবিষ্কার, নাড়ী কোমল, এবং স্বক্ আর্দ্র ও শীতল না হইলে (সঙ্কটাপন্ন স্থল ব্যতীত) তৃতীয় দশমিক ক্রমেব নিম্নে কুইনাইন ব্যবহাব কবা বিধেয় নহে । মাবকিউবিয়স, একোনাইট, পডোফিলিন, ময়ভনিকা প্রভৃতি যথায়োগ্য ঔষধ ব্যবহাবে যক্রুং ও পবিপাক-বন্দ্রব ক্রিয়া পবিশোপিত হইয়া জিহ্বা পরিক্রুত হইলে পরে কুইনাইন ব্যবস্থা কবা উচিত ।

জ্বরের শীত বা উত্তাপাবস্থাব পিপাসা না থাকিলে কিম্বা উত্তাপাবস্থাব পবে ঘর্ষ না হইলে কুইনাইন ব্যবহাব কবা বিহিত নহে । তরুণ মলিরাম জবে শীত থাকুক বা না থাকুক, উত্তাপাবস্থা ও উত্তাপেব পবে প্রচুর ঘর্ষ না থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগে উপকাব দর্শে না । কুইনাইন ও সিক্কোনাব লক্ষণে নিম্নক । সাদৃশ্য বক্ষিত হয় । প্রভেদ এই যে কুইনাইনেব জব ঘটকায়ন্দ্রোণ্যাব ঠিক এক সময়ে উপস্থিত হয়, এবং উহা সাধাবগতঃ পূর্বাঙ্ক ১০টা, অপবাঙ্ক ৫টা ও বাব্বি ১০টাব সময় প্রকাশিত হইয়া থাকে । যে জব প্রতি পর্যায়ে অগ্রবর্তী হইবা অর্থাৎ আগুয়াইয়া আগুয়াইয়া আইসে তাহাতেও এই দুই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—দ্যাহিক জ্বেরে ঠিক নির্দ্ধাবিত সময়ে উপস্থিতি ; ঐকাহিক জ্বেরে ২বা ২।০ ঘণ্টা আগুয়াইয়া আগুয়াইয়া আগমন ; জ্বেরে সমাক বিচ্ছেদ, জ্বেরে এব পর্যায় হইতে অত্র পর্যায়েব অন্তর্স্বর্তী সময়ে অতিশয় ত্বর্কণতা ও পিপাসা, প্রীণ ও যক্রুতে বেদনা, কাণে ভাট্টা

শক ; শিবোঘূর্ণন ; মস্তক বৃহত্তর অল্পভব ; জুবেব সকল অবস্থায়ই মেকদ ও (বিশেষতঃ কটিব নিয়ভাগ) টিপিলে ব্যথা ; বেলা ওটার সময় কম্পকর জ্বব ও পিপ্সা , শীতকালীন ওষ্ঠ ও নথের নীলাভা ; দাহ ও অতিশয় পিপাসা ; শিবার ক্ষীততা , উত্তাপাবস্থা প্রলাপ ; অমল উত্তাপ , বাবাংগার জ্বন্তণ ও হাঁচি ; অনন্তর প্রচুব ঘর্ম , ঘর্মাবস্থায় পিপাসাব আধিকা , স্থিব হইয়া বসিয়া থাকিলে ও ঘর্ম , ঘর্ম্মশ্রাবে শিরোবেদনা ব্যতীত অন্ত্যন্ত লক্ষণেব শান্তি , কিন্তু শিবঃপীড়ার বৃদ্ধি , জল ভাল লাগা , এবং জলগানে উপশম অন্তভব ; কটিব তিক্রম্বাদ , বিরামকালে ও অতিশয় কৃষ্ণ , পৃষ্ঠবংশে টিপিলে বেদনা ; প্রীহাব ক্ষীততা , বিচ্ছেদকালেব অলক্ষণস্থায়িত্ব ।

চেলিডোনিয়ম ।

যক্কদ্রোগ সংশ্লিষ্ট জবে চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত হয় । দক্ষিণ স্বক্কাস্থির অভ্যন্তরীণ ও নিম্নতর কোণেব নীচে অবিবত বেদনা যক্কদ্রোগে এই ঔষবি প্রয়োগেব বিশেষ লক্ষণ । চেলিডোনিয়মেব লক্ষণ প্রাতে, ও অপরাহ্ন বর্দ্ধিত , এবং সায়াহ্নে উপশমিত হয় । আসেনিক চেলিডোনিয়মেব অন্তপূবকণ

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—প্রবল শীত ও কম্প ;

হাত পায়ে শীতেব আবস্ত , তথাকাল শিবাব ক্ষীততা ; দক্ষিণ পদেব তুষারবৎ শীতলতা , বিবনিয়া , পৃষ্ঠদিয়া নিম্নাভিমুখে শিহবণ (শিড় শিড় করা) ; পর্যাবক্রমে শীতোত্তাপ । সায়াহ্নে শব্দনাশে অভ্যন্তরিক তাপ ; হস্তেব জ্বালকর উত্তাপ , পবে সর্দশনীবে তাহাব বিস্তার , মস্তক , মুখমণ্ডল , ও বাহুব উর্দ্ধভাগে উত্তাপ । দুইগ্রহব বাহিব পব ও প্রাতঃকালেব প্রাক্কালে নিদ্রাকালে ঘর্ম্ম , জাগ্রত হইলে ঘর্ম্মেব বিবতি । জবেব বিচ্ছেদ স্পষ্ট নহে । যক্কদ্রোশে বেদনা । মল্লিপাতজ্বর ।—অজ্ঞাতসাবে অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ , শুভ্র , বা ধূসরবর্ণ মল নিঃসরণ , কিন্তু বোগীর জ্ঞানেব পবিচ্ছন্নতা , পিত্ত-জ্বাবেব হ্রাস সহেও মূত্রেব পাণ্ডুবর্ণ , স্বাদশূন্য , গাঢ় পীতবর্ণ লেপাবৃত , আবরুপ্রাস্ত , দন্তেব চিক্কে চিক্কে জিহ্বা ; শ্বাসে চর্ণক , আমাশয়ে অসচ্ছন্দতা অন্তভব ; প্রচাপনে কৃণিতে অস্থ অন্তভব , কটিদেশীয় কশেককাল ভিন্নকর বেদনা ,

সেই বেদনার কট্যস্থি পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, ও কশেৰুকা যেন বিচ্ছিন্ন হইল
এরূপ অনুভব; নিদ্রা যাইবাব ইচ্ছা, অথচ নিদ্রা যাইতে অশক্তি; একদিন
জিহ্বার শুষ্কতা, অপর দিন আর্দ্রতা, অল্প উদগার, ক্রান্তি ও আলস্য।

জেলসিমিয়ম ।

রক্ত-সঞ্চলন-বদ্ধে জেলসিমিয়মের কিয়দর্শে। এই ক্রিয়াবশতঃ কাহাব
কাহাব প্রথমে শীত ও তৎপরে দাহ লক্ষণাধিত জ্বর উৎপন্ন হয়। এজন্ত
সামান্য আবক্রজ্বর; জ্বী ও বালকদিগের সামান্য জ্বর, শিশুদিগের স্বল্প-
বিবামজ্বর ও স্বল্পবিবাম প্রকৃতির অগ্রাভ্য জবে, ঘর্ম না হইয়া সন্ধ্যাকালেব
প্রকোপ অবস্থাব অবসান হইলে এবং অজীর্ণের লক্ষণ না থাকিলে এই ঔষধ
ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে ব্যাপ্টিশিয়া দাবা পাকিশায়িক জ্বর ও
একোনাইট দাবা প্রাদাভিক জ্বর যেকণ প্রথম উদ্যমেই ভগ্ন হয় তজ্জ্ব জেল-
সিমিয়ম দাবাও শিশুদিগের স্বল্প-বিবাম জ্বর হীনবল হইয়া থাকে। অল্পেব
বিধান-বিকাববিহীন স্নায়বীয় জ্বর ও আন্তরিক জ্বর, জলবৎ নাসাস্রাব,
স্ববেদ ও শীত সংযুক্ত বোমান্দিব উদ্বেদাবস্থা, জ্বর পীড়কা উথিত হই-
বাব সময় শিশুদিগের আক্ষেপ, অতিশয় অস্থিরতা সহ জ্বর ভাব জেলসি-
মিয়মেব আযত। তীব্রজবে অতিশয় অস্থিরতা ও তুর্নিবাব পিণাসা লক্ষণে
একোনাইট, প্রমাপসংযুক্তদাহ ও শুষ্ক জিহ্বা লক্ষণে ব্যাপ্টিশিয়া ও বেনে-
ডোনা ব্যবহৃত হয়। এই প্রকাব জবে জেলসিমিয়ম যথপ্রদ নহে। জেল-
সিমিয়ম প্রযোগোপযোগী জ্বর অপেক্ষাকৃত মৃদ। শব্দ লাগিবাব পবে ও
হামের পুন্নে যে জ্বর হয় তাহাতে ইহা ব্যবহাব কবিলে সমদিক উপকাব
দর্শে। আলস্য; গাত্র-গোবন; মস্তক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মৃদ বেদনা; মস্ত-
কের বৃহত ও পূর্ণত্ব অনুভব, জিহ্বার শুষ্কতা আর্দ্রলেপ, অনতিদ্রুত, পূর্ণতা-
প্রবণ, কেমিল নাড়ী; জবে জেলসিমিয়মের প্রবান প্রযোগ-লক্ষণ। ফলতঃ
জ্বরের যে অবস্থায় বক্তবহানাড়ীগুলি ওসাবিত ও পবিপূর্ণ থাকে, অথচ পূর্ণ
বিকসিত সবল ওদাহেব স্রাব উহাদের দ্রুততা ও প্রতিঘাত শক্তি থাকে না,
সেই অবস্থায় জেলসিমিয়ম ব্যবস্থা কবা যায়। এই প্রকাব জবে আলস্য,

পেশীর দৌর্বল্য, সম্যক বিশ্রামেচ্ছা ও তজ্জালুতাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ।
এরূপ অবস্থায় ও একোনাইটের ত্রায় ধার্মিক বক্তৃৎসক্য থাকিতে পারে বটে,
কিন্তু উহার তত প্রাবল্য থাকে না । নাড়ী পূর্ণ, প্রবাহিত, ও অকঠিন অমু-
ভূত হয় । অতএব পিত্তজ্বরে ও যকৃৎের অপ্রবল রক্তসঞ্চয় লক্ষণে জেলসিমিয়ম
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্ববেও ইহা অপ্রা-
প্ত্য নহে । কিন্তু বক্তৃৎসহানাতীৰ শিথিলতাৰ আত্মযজ্ঞিক অলসতা ও নিদ্রা-
লুতা এবং তজ্জনিত মস্তিষ্কেৰ অপ্রবল বক্তৃৎসক্য অতিশয় অসম্ভবতায় ও অট্টে-
তত্ত্বে পরিণত হইলে পর শ্রাব এই ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে ।

জেলসিমিয়ম, একোনাইট, ও এপিসের জর-লক্ষণেব প্রভেদ অবগত
থাকা আবশ্যক । তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে এই সকল ঔষধ নির্দোষ
করিতে পাৰা যায় । সংক্ষেপতঃ প্রাদাহিক জ্ববে একোনাইট, স্বল্প বিবান
বা সবিরাম জ্ববে জেলসিমিয়ম ; এবং সবিরাম বা সন্নিপাতজ্ববে এপিস
বিশেষ উপযোগী । (ক) উৎকর্ষা, নিবাশা, জ্ববকালীন অস্থিরতাবশতঃ
পার্শ্ব-পবির্ত্তন, মৃত্যাব আশঙ্কা ; গাত্র-বস্ত্র তুলিয়া ফেলা ; পূর্ণ, কঠিন,
উল্লক্ষনশীল নাড়ী ; উত্তপ্ত ও ঘর্ষশূন্য হস্ত ; এবং প্রভূত ঘর্ষ হইয়া সকল
লক্ষণেব শাস্তি ;—একোনাইটের লক্ষণ । (খ) উপদাহিতা, অমুভবা-
বিক্য, বালকদিগেব কখন কখন নিদ্রাশূন্যতা, স্নায়বীয়তা অথবা আক্ষেপেব
সম্ভাবনা, কিম্বা নিদ্রালুতা, মত্ততাব ত্রায় অক্ষিপুটেব গুরুত্ব, সম্পূর্ণ শাস্ত
থাকিবার ইচ্ছা ; পৃষ্ঠেব উর্দ্ধে ও নিম্নে শীতেব গতাঘাত ; তৎপবে বিব-
র্দ্ধিত নিদ্রালুতা সহ জ্ববেব উদ্ভাপ ; পূর্ণ ও প্রবাহিত নাড়ী, মধ্যম বকম
ক্রমিক, কিন্তু উপশমপ্রদ ঘর্ষ ;—জেলসিমিয়মের লক্ষণ । (গ) থাকিবা
থাকিবা অস্থিরতা, নিদ্রা যাইবার ইচ্ছা কিন্তু স্নায়বীয়তা বশতঃ অনিদ্রা,
অথবা মূহ মূহ বিভবিড়ে প্রলাপ ; প্রগাঢ় নিদ্রা ; হাঁটুতে বা উদবে অপ-
বাকু তিনটাব সময় শীতেব আবস্ত, ঘর্ষশূন্য গাত্র, বা মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী
ঘর্ষজ্বাব সংযুক্ত উদ্ভাপ ; গাত্রোন্মোচন প্রবৃত্তি, বক্ষঃস্থলেব অতিশয় যাতনা
জ্বকেব কোন কোন স্থানের শীতলতা ও কোন কোন স্থানের উষ্ণতা, নাড়ীৰ
ক্ষততা ও সঘলতা, অথবা বোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে নাড়ীৰ ত্বরিততা ও
তারবৎ হৃৎস্পন্দিতা, সবিরামতা ও অপ্রাপ্যতা,—এপিসের লক্ষণ ।

বিশেষ লক্ষণ ।—নির্জনে থাকিবাব ইচ্ছা, কাণের উপবদিয়া মস্তক বেঁঠন করিয়া যেন একটা ফিতা বাঁধা রহিয়াছে একপ অল্পভব, পৃষ্ঠবংশেব নিগ্নদেশ হইতে পৃষ্ঠদিয়া কেরাটী হইয়া জিহ্বার অগ্রভাগে শীতের উপস্থিতি ; কম্পকালে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে বলা ; উত্তাপাবস্থায় নিদ্রা ও বিড়বিড় করিয়া বকা ; শিবোঘ্নর্ন, মস্তকেব পশ্চাদিক হইতে উহার আবস্ত ও তৎকালে একটা বস্ত্র ছইটী বস্ত্র দেখা, একপার্শ্বে বোঁকা ; মস্তকে বেদনা । **হ্রাস-বৃদ্ধি ।**—আর্দ্র বায়ুতে ; ঝড়তুফান আসিবাব পূর্বে, হঃসংবাদ প্রবণে ; আকস্মিক মানসিক উত্তেগে, স্থিতির থাকিলে ও তামাক খাইলে বৃদ্ধি । ঠাণ্ডা ও খোলাবাতাসে উপশম । **জ্বরের সময় ।**—অপরাক্ত ও সায়াক্ত ; শীতশূন্য জব পূর্নাঙ্ক ১০টা (গ্রাট-মিউ, ব্যাপ্ট) । **জ্বরের প্রকৃতি ।**—প্রাত্যহিক, একদিন অন্তব, ঠিক নির্দিষ্ট সময় (আবায়, সিডুন, সাবাদ) ; স্বল্পবিবাম অবের সবিরামে, বা সবিরামেব স্বল্পবিবামে পবির্ণতি (শেষোক্তে ব্যাপ্ট, ইউপ, কুইন ও) ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—পৃষ্ঠ দিয়া উপরের দিকে শীতের প্রধাবন অথবা পদে শীতের আবস্ত ও উচ্চদিকে সম্প্রসারণ । কখন কখন ওবা অবসহকাবে প্রচুর মূত্রস্রাব ও সর্কশবীবে মূত্রবৎ বেদনা । শীতাবস্থায় তৃষ্ণাশূন্যতা । শীতাবসানে নিদ্রালুতা (এপিস) । দীর্ঘস্থায়ী প্রবল তাপ ; মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপের আতিশয়া, স্নায়বীয় অস্থিরতা ; নিদ্রা বা অল্পনিদ্রা ; শিশুর মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠা, এবং যেন পড়িয়া যাইবে এইকপ আতঙ্কে যাহা কাছে পায় তাহাই জড়িয়া ধরা, শিবোঘ্নর্ন, আলোক ও শব্দে বিদ্বেষ (বেল) । প্রচুর ঘর্ম, ঘর্মস্রাবে বেদনাব উপশম ; মণিপূব প্রদেশে সর্সাপেক্ষা অধিক ঘর্ম । অল্পক্ষণস্থায়ী বা নামমাত্র জ্বরের বিরাম অথবা একেবারেই বিচ্ছেদাভাব । বিবামকালে বোগীব পেশীর দুর্বলতা, স্নায়বীয়তা, কোপনতা (খিটু খিটে তাব), শিরঃপীড়া ; তামাকবে ধূমপানে সেই শিরঃপীড়াব বৃদ্ধি (ইগ্নে, ধূমপানে হ্রাস,—আবে-নিয়া) । (জেলসিমিয়ম ও ইগ্নেশিয়ার প্রভেদ ইগ্নেশিয়ায় দ্রষ্টব্য) । **স্বল্পবিরাম জ্বর ।**—রাত্রি ছইপ্রহবেব সময় জ্বরের প্রকোপ ; প্রাতে জ্বরের স্বল্পবিরাম, প্রাবস্ত হইতেই পেশীব দুর্বলতা ও তজ্জন্ত উখান শক্তি-

হীনতা; মস্তকের সম্মুখ বা পশ্চাৎ ভাগে শিবঃপীড়া, মস্তক বৃহত্তর অমু-
ভব, ক্ষীত বা আলোহিত মুখমণ্ডল; মুখে আঠা আঠা বা তিক্ত
আস্বাদ; জিহ্বায় শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপ; পূর্ণ, দ্রুত ও অনতিকটন নাড়ী।
শর্দিজ্বর।—শীতল বা আর্দ্র বায়ু সেবন অথবা উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুর সহসা
আর্দ্র বায়ুতে পরিবর্তন বশতঃ জ্বর; পৃষ্ঠোপবি শীত, জ্বাৰন্তের পূর্বে
মস্তকের উত্তপ্ততা, পিপাসা, উৎকর্ষা ও অস্থিরতা পরিশৃঙ্খতা (পিপাসা,
অস্থিরতা, ও উৎকর্ষা—একন)। সুস্থিরতা ও গাত্র-গোবব; মস্তক শুকতর
ও বহুতর অমুভব; মুখমণ্ডলের আবদ্ধতা, চক্ষুর সজলতা, নাসিকা
হইতে জলবৎ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, অন্ন অন্ন থলা থালা; বৃহৎ, পূর্ণ, দ্রুত, ও
অনতি কঠিন নাড়ী (ক্ষুদ্র, বটিন, দ্রুত, তাবৎ নাড়ী—একন); জ্বরের
স্বল্পবিবাম প্রকৃতি। এবং প্রত্যহ একইসময়ে প্রকোপ। সন্নিপাত জ্বর।
মানসিক শক্তির হ্রাস (ব্যাপ্ট), শারীরিক দৃঢ়তা বশতঃ অঙ্গকম্পন;
শিবোদয়ন ও অববিস্ময় দৃষ্টি, নিদ্রাহীনতা ও শিবোদয়ন, অধিক পরিমাণে
জলবৎ প্রস্রাব নিঃসরণে উদ্বাহ উপশয়, মস্তক, পৃষ্ঠ, ও হস্তপদাদিতে অসহ
বেদনা; মস্তিষ্কে আঘাতিত বৎ বেদনা, অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত (কষ্ট),
জিহ্বা-কম্প, তজ্জন্ত উদ্বাহ সহজে বাহির করিতে পাবা যায়না (বেল, ল্যাক,
সিক), জিহ্বার অসাড়তা ও তজ্জন্ত কথা বলিতে না পাবা; শীতশীত
অভুত, মস্ত পেশীর দুর্বলতা, স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাধান্য। (ব্যাপ্ট দ্রষ্টব্য)।

জিহ্বা ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—সাধারণ পৃষ্ঠে পুনঃ
পুনঃ কাণ; আন্তরিক উত্তাপ সহ অবিরত শীত শীত অমুভব; অপবাহু
হইতে সাধারণ পর্য্যন্ত কম্প, দিবাভাগে ব্যয়কাল শীতামুভবসহ জ্বরের
আক্রমণ, অনন্তর সর্জনভাবে বলকে বলকে তাপের আবেশ; অঙ্গকম্প;
মূর্ছাকল্পতা; বক্তব্য নাড়ীর প্রবল দপদপ; মুখের শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা;
অধিক পিপাসা, ব্যক্তিতে ঘর্ম, কখন কখন ঘর্মে অল্প গন্ধ; দিবাভাগেও
ঘর্ম। মস্তিষ্কে উৎকট বেদনা ও প্রবল ক্রোধ লক্ষণাপন্ন সবিরামজ্বর।

সন্নিপাত জ্বর ।—* মস্তিষ্কেব পক্ষাঘাতেব আশঙ্কা, হস্ত-কম্প ও শীতল হস্তপদ সহকারে টঙ্কার; চৈতন্য পবিশূন্ততা; শব্দার নিম্নদিকে সরিয়া যাওয়া; নিম্ন হনুৰ অবনতি; মোমেব তায় পাণ্ডুৰ্বৰ্ণ মুখাকৃতি; বারংবার অস্ত্র হইতে অজ্ঞাতসাবে বিবেচন, দ্রুত, ক্ষুদ্র, পর্যায়দোষবিশিষ্ট, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী ।

টারাক্সিকম ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সর্বরোগ জ্বর ।—শিথোবেদনা সহকাৰে সৰ্ব্বশরীৰে ঈষৎ, পিচবর্ণে শীতল আদিকা, উপবেশনে হ্রাস। নাসাগ্র ও হস্তদ্বয়েব তুষাবৰ্ণ শীতলতা। সপশরীৰে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাপ; নিদ্রান্তে তাপ। গ্ৰীহা বেদনা ও সমস্ত বাদ্ধি হ্রাসকর প্রচুব ঘৰ্ম্ম, নিদ্রার প্রথমাবস্থায় ঘৰ্ম্মেব আবিধ্য। ঘৰ্ম্মকালে তুষা, ঘৰ্ম্মে গাত্র কুট কুট করা। জ্বর সহকাৰে উদবেব উপসর্গ। জিহ্বাব মানচিত্রেব তায় চিত্রিত আকৃতি। আহাব বা পানান্তে শীতাত্তব। বহুদ্রোগ সংশ্লিষ্ট জ্বর। সন্নিপাত জ্বর ।—অস্থিরতা, স্থির হইয়া থাকিলে নিম্নাঙ্গে অসহ্য ছিন্নকব বেদনা, মস্তকেব পশ্চাঙ্গাগে প্রবল ছিন্নকব বেদনা, অবিবৰ্ত্তন (বিড়বিড়ে) প্রলাপ, আহাব বা পানান্তে অতিশয় শীতাত্তব, মানচিত্রেব তায় চিত্রিত জিহ্বা। বাদ্ধিকালে দুৰ্দ্ধলকর প্রভূত ঘৰ্ম্ম এবং জিহ্বাব চিত্র-বিচিত্রতা এই ঔষধেব বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। চায়নাব ঘৰ্ম্মেব তায় শরীৰ বস্ত্রাবৃত কবিলেই টাবাসিকমেব ঘৰ্ম্ম উদ্ভিক্ত হব না ।

ডলকামারা ।

শীত ও বৰ্ষাকালে আদ্রতাদি জনিত জবে ডলকামাৰা ব্যবহৃত হয়। বায়ু শীতল হইলে রোগেব বৃদ্ধি; সঞ্চরণে হ্রাস, টেন্সিয়াকবিল্লী ও এন্ট্রির আবাবিধ্য; এবং ঘৰ্ম্ম-রোধ ডলকামাৰাব বিশেষ লক্ষণ। আরেণিয়াব সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই যে, আবোণিয়াৰ জব ঠিক নির্ধাবিত সময়ে উপস্থিত হব, ডলকামাৰাব জ্বর নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হব না।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—মৃষ্ট হইতে উত্থিত বা মগ্নসাবিত, উত্তাপপ্রয়োগে অনুপশমিত, বেদনাসংযুক্ত শীত । সর্বোচ্চ ঘর্ষশূন্য জ্বালাকর উত্তাপ (একন, আর্স, ব্রাই), পৃষ্ঠে উত্তাপ ও জ্বালা । তৃষ্ণাবিহীন, প্রলাপ সংযুক্ত উত্তাপ । দুর্গন্ধি ঘর্ম (আর্গ, কার্বো-এন, সিলি) ; ঘর্মাবস্থায় প্রভূত, পবিত্রাব মূত্রস্রাব । ঘর্মাতাব । সূতিকাজ্বর ।—অর্জিতা বা শীতলতা জনিত সূতিকা অব (ডলকা ১দ) ।

ডিজিটেলিস ।

যে সকল বোলে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয় এবং নাড়ীর অসমান বা সবিরাম গতি জন্মে তাহাতেই সাধাবণতঃ ডিজিটেলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধের লক্ষণ উষ্ণ গৃহে, শয়নে, ও সঞ্চালনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । নিবৃত্ত-বজ্রকা-দিগেব যে ঝলকে ঝলকে সহসা তাপাবেশ ও তৎপবে অতিশয় স্নানবীর্য দুর্বলতা ; এবং নড়িলে চড়িলে হৃদক্ৰিয়া যেন বিলুপ্ত হইবে এপ্রকার আশঙ্কা জন্মে (না নড়িলে হৃদক্ৰিয়া বিলুপ্ত হইবে একপ আশঙ্কা, জেলস) তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । ডিজিটেলিসের পবে চায়না ব্যবহৃত হয় না ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—মৃদু ও বিষমগতি নাড়ী । সামান্য সঞ্চালনে নাড়ীর মৃদুগতির ক্রততা প্রাপ্তি । অতিশয় মন্দ-গতি নাড়ী । অন্তবে শীত, বাহিবে তাপ । সহসা উত্তাপাবেশ ও তৎপবে অতিশয় দুর্বলতা । * গাত্রের অতিশয় শীতলতা । * হস্তপদের শীতলতা । শীতল, আঠা আঠা, প্রভূত ঘর্ম । (আর্স, ক্যাম্ফ, ভিবাট) । সন্নিপাত জ্বর । বাতশ্লেষ্মাপ্রধান-ধাতু, প্রসাবিত কনীনিকা, সম্পূর্ণ পবিচ্ছন্ন জিহ্বা, মৃদু ও নিয়মিত নাড়ী, শক্তি-হ্রাস ; উদবোজ্জ্বলিত ও পৃষ্ঠ অল্পতব ; বিরক্তি, বুকজ্বালা, বমন, ভয় বর্ণের অতিসাব ; অগ্নিশূ, অতিশয় নিদ্রালুতা ।

খুজা ।

শরীরে প্রমেহ বা মাষক দোষ থাকিলে জবে খুজা ব্যবহৃত হয় । তৃষ্ণা গহকাবে বা তৃষ্ণা ব্যতীত অন্তরে বাহিরে কম্প সংযুক্ত শীত ; পূর্ববর্তী উত্তা-

পাবনা ভিন্ন কেবল শরীরের অনাবৃত স্থানে ঘর্ম, আবৃত স্থলের উত্তপ্ততা ও ঘর্মশূন্যতা ; এবং তৈলাক্ত দুর্গন্ধি ঘর্ম ;—এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

নক্সভমিকা ।

শীতাবস্থার পূর্বে উত্তাপ, অথবা যুগপৎ শীতোত্তাপ, সর্কদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পৃষ্ঠে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং বিরামকালে আমাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণের প্রাবল্য বিশিষ্ট সবিবাম জ্বর ; নাসিকা অবরুদ্ধতা, সমুদ্র, এবং নাসিকার পবিত্রতা ও স্রাবাভাব লক্ষণাপন্ন শব্দ জ্বর ; স্ত্রীলোকদিগের ঋতু পবিত্রতা জ্বর ; এবং আমাশয়িক ও পৈত্তিক লক্ষণের প্রাবল্যবিশিষ্ট টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতিতে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সবিবাম জ্বরে অনেক সময় লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে পূর্বে ইপিকাক ব্যবহার করিয়া তৎপরে নক্সভমিকা ব্যবহৃত কবিলে, অথবা প্রাতে ইপিকাক ও বৈকালে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অব্যায়াম, অধিক অধ্যয়ন, রাত্রিজাগরণ, দীর্ঘকালব্যাপী আচ্ছাদের দোষ, অধিক মসলা-যুক্ত দ্রব্য আহার, বা উত্তেজক পানীয় পান জনিত বোগে এই ঔষধের বিশেষ অধিকার দৃষ্ট হয়। গুরুদ্রব্য ভোজী, মাদকদ্রব্য সেবী, উগ্রপ্রকৃতি, কোপন স্বভাব, হিংসা-রেষপূর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। নিদ্রা যাইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্বে এই ঔষদ সেবন করিলে দিবসের অগ্রান্ত সময় অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া ভালরূপে নিষ্পন্ন হয়। নিত্যন্ত আবশ্যক না হইলে প্রাতে অল্প অল্প নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয় না। এলোপ্যাথি বা কবিরাজী চিকিৎসায় উষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ ও মিশ্র ঔষদ সেবনের পবে কোন রোগীকে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় প্রথমেই নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ ।—কুশদেহ ; সর্কদা উৎক্ষেপ ; সর্কদার গুরুত্ব ; সায়াহ্নে নিদ্রার আক্রমণ, শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ আবার প্রত্যুষে নিদ্রা, নিদ্রান্তে প্রাতে ক্লান্তি ও দুর্বলতা ; অব্যাহত নিদ্রার পর রোগ-লক্ষণের উপশম ; বিকল মল-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধ ও বাববার অল্পমাত্র মল নিঃসরণ।
হ্রাস-বৃদ্ধি ।—মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে, আহাবান্তে, শব্দে, যত

স্পর্শে, ক্রোশে, অনারত বায়ুতে, ও গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি। বলপূর্বক চাপিলে, সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামে, নিদ্রায়, ও বর্ষাকালে হ্রাসপ্রাপ্তি। জ্বরের সময়।—রাত্রি বা প্রাতঃকাল, পূর্বাঙ্ক ৬টা হইতে ৭টা, ১১টা; ১২টা, অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৯টা, সন্ধ্যা হইতে সাবাবাত্রি, (লাক, পদস, রস, পলিপ); অপরাহ্ন ৬টা হইতে ৭টা (শীতশূত্র অব)। জ্বরের প্রকৃতি।—সর্বপ্রকার অব; একদিনান্তর পর্য্যায় অব; অগ্রগামী প্রাতঃকালীন অব (স্নাট-মিউ, নক্সভমিকাব দ্বায় শীতসহকারে সমাগত অগ্রগামী অব আস, চায়না, কুইনাইন, ব্রাইও, ইপিকাক প্রভৃতিও ব্যবস্থেয় হইতে পারে); অনিয়মিত অবস্থা ও অনির্দ্ধাবিত সময় বিশিষ্ট অব।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—অগ্রগামী প্রাতঃকালীন অব, অনিয়মিত সময়ে শীতের উপস্থিতি; শীতসহ অঙ্গ-বেদনা, জ্বন্তণ, তৃষ্ণাশূন্যতা, নখের নীলবর্ণ; তৎপরে পিপাসা, দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ, ও শঙ্খস্থলে স্ফটী-বেধ, অল্প ঘর্ম; বিরামকালে আমাশয়িক ও পৈতিক লক্ষণের বিদ্যমানতা, জ্ঞানাব হ্রাসলতা ও অবশ্যতা অনুভব; প্রীহা-যুক্তিতে বেদনা। আপরাহ্নিক অব।—অবের অনিয়মিত আবেশ; প্রথমে ঘর্ম, অনন্তর শীত, তৎপরে আবার ঘর্ম, অথবা প্রথমে তাপ, অনন্তর শীত, কিম্বা বাহিবে উত্তাপ অন্তরে শীত, বা বাহিরে শীত অন্তরে উত্তাপ; অবিবত, এমনকি উত্তাপ ও ঘর্মাবস্থায়ও বস্ত্রাবৃত থাকিবার ইচ্ছা; শীতাবস্থায় হস্ত-পদ, স্বক ও মুখ-মণ্ডলের নীলবর্ণ; উত্তাপাবস্থায় হাত জ্বালা, কাণ জ্বালা, লোহিত মুত্র, মাথাধরা, কাণে গুণ্ণুগুণ্ণ শব্দ, বৃকে যাতনা, এবং মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ; শীত ও উত্তাপাবস্থায় গণ্ডগলের আবদ্ধতা, ও পিপাসা; ঘর্মাবস্থায় গাত্রে শীতকার, প্রত্যেক বার নড়নে চড়নে শীত, শীত ও উত্তাপাবস্থায় উত্তমকপে শবীর আরত করিয়া রাখা। কঙ্কেষ্টিত চিল বা দূষিত সবিরাম অব।—শিবোর্ণন, অস্বচ্ছন্দতা; প্রসাপ, উদবেগ ক্ষীততা, পার্শ্বে ও উদবে স্ফটী-বেধ। সন্নিপাত জ্বর।—টাইফয়েড অবের প্রথমাবস্থা; পৈতিক ও আমাশয়িক লক্ষণের প্রাদুর্ভা, যুখে তিক্ত বা লেছবৎ স্বাদ, জিহ্বাব পীতভা, বিবমিষা, ক্লবৎ হৃদযন্ত্র বমন, পৈতিক অতিদার, উদবে জ্বালা, অথবা কেবল আমাশয়ে যাতনা, উদবেদনা ও বাৎসরিক মন-প্রবৃত্তি, অথচ অধিক মন নিঃসারণে

অসামর্থ্য; কুহন ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ আরক্ত ও স্বল্প মূত্র, বাহু ইন্ড্রিয়েব ক্রিয়াতিশয়া; অনাবৃত বায়ুতে অতিশয় অহুত্বাদিক্য, জলে অরুচি সহ পিপাসা; শয়নেব অতিশয় ইচ্ছা ও উহাতে উপশম।

নক্সভমিকায় ও ছাট্‌মিউরিয়োটিকমে প্রভেদঃ—(১) নক্সভমিকার অবের আবেশ ও অবস্থাত্রয় ঠিক নিয়মমত উপস্থিত হয় না; ছাট্‌মিউরিয়োটিকমে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হয়। (২) নক্সভমিকাব জ্বৰ আসিবাব পূর্বে অঙ্গ-দৌর্বল্য, অঙ্গমর্দ, জৃম্বণ, খল্লী, গা কামড়ানি, কখন কখনবা শীতের পূর্বে উত্তাপ ও ঘর্ম লক্ষণ থাকে; ছাট্‌মিউবে শীতো আতঙ্ক, গা মাটিনাটি, গাবমিবিমি, বমন, মথাধবা ও জল পিপাসাদি পূর্বে লক্ষণ থাকে। (৩) নক্সভমিকায় শীতাবস্থায় পিপাসা থাকেনা এবং গাহ আবৃত কবিলে বা উত্তাপ প্রয়োগে শীতের শাস্তি জন্মে না; ছাট্‌মিউব অবে শীতে অধিক পবিমাণে বাবে বাবে জল পান করিতে হয় এবং উষ্ণ গৃহে শীতের উপশম পড়ে। (৪) নক্সভমিকায় ঘর্মাবস্থায় তৃষ্ণা থাকেনা, এবং নড়িলে চড়িলে শীত কবে; ছাট্‌মিউতে ঘর্মাবস্থায় পিপাসা থাকে ও নড়িলে চড়িলে ঘর্ম নিঃসৃত হয়। (৫) নক্সভমিকাব ঘর্ম অল্প ও একাকীন, উহা শবীবের দক্ষিণ পার্শ্বে বা উপবর্দ্ধে জন্মে, এবং ঘর্মে অঙ্গ-বেদনা উপশমিত হয়; ছাট্‌মিউব ঘর্ম অধিক ও সর্বাঙ্গীন, তদ্বাবা অন্ত্রাত্বেদনার উপশম পড়ে বটে কিন্তু প্রবল শিরোবেদনার বিশেষ লাভব জন্মে না। (৬) নক্সভমিকায় বোগীব মুখে তিক্ত বা দুর্গন্ধি আশ্বাদ থাক, তজ্জন্ত বাব বাব মুখ ধুইতে হয়; ছাট্‌মিউর বোগীব মুখেব আশ্বাদ তিক্ত বা লবণাক্ত থাকে।

নক্সমশ্চেটা ।

বোগেব সহিত নিজালুতা ও তজ্জালুতাব বিদ্যমানতা নক্সমশ্চেটার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। গর্ভবতী বা গুহাবাযুগ্রস্তা স্ত্রী ও বালকদিগেব রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। তজ্জালুতা বা মুচ্ছী-প্রবণতা, গাত্রের শীতলতা ও ঘর্মশূন্যতা, অর্জ ও শীতল বায়ুতে বোগেব বৃদ্ধি এবং বাহু উত্তাপে উপশম প্রাপ্তি নক্সমশ্চেটাব বিশেষ লক্ষণ। একদিন বা দুইদিন অন্তর, একদিন

অল্প একদিন অধিক ; দুইদিন অল্প, একদিন বিরাম ; এইসকল প্রকৃতির জরে ইহা ব্যবহৃত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—নিদ্রাতুহতা, জিহ্বাষ শুভ্রলেপ, খাসে বড়বড় শব্দ, কখন কখনবা রক্তাক্ত নিঃস্রাব, উত্তাপাবস্থায় ও যৎসামান্য তৃষ্ণা, তন্দ্রালুতা সংযুক্ত ঘর্ম ও তখন অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা ।
সন্নিপাত জ্বর ।—গাত্রে নীলাভ চিহ্ন ; শিবোঘ্নন সহ পৈশিক অস্থিরতা ; যৎসামান্য শ্রমাস্তে দুর্বলতা ও শয়নেব প্রবৃত্তি ; তন্দ্রালুতা ও অক্ষিপুটের পতন সহ স্বপ্নের জ্বায় অবস্থা ; অচলতা ও নির্দীপকতা বিশিষ্ট প্রগাঢ় তন্দ্রা-দোষ ; প্রলাপ ও হতবুদ্ধিতা ; তৃষ্ণাশূন্যতা সহ মুখ, জিহ্বা ও গলার পরি-শুদ্ধতা ; আমাশয়েব পূর্ণতা ও ক্ষুধাপরিশূন্যতা ; অস্ত্র-কুঞ্জন ; পীতবর্ণ পাতলা অতিমার ; রক্তবর্ণ স্বপ্ন, পরিচ্ছন্ন মূত্র ।

নাইট্রিক এসিড ।

পাবন, উপদংশ, বা গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত ; যক্ষ্মদ্রোগগ্রস্ত ; এবং উদরাময়-গ্রস্ত রোগীদিগের পুণ্যতন জরে এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । নাইট্রিক এসিড জাপক সবিরামজ্বর প্রতিদিন, অথবা একদিন পর একদিন, অপরাহ্নে বা সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয় । ইহার লক্ষণ সাধারণে ও রাত্রিতে, সংস্পর্শে, বায়বীয় পরিবর্তনে, জাগরণে, বিচরণে, উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থানে বিবর্তিত ; এবং শব্দটাবোহণে ও উদগারে উপশমিত হয় । টাইফয়েড জরে পেয়ারাখ্যাগ্রস্থি বন্ধত জন্মিতে আরম্ভ হইলে নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—অপরাহ্নে, অনাবৃত বায়ুতে শীত, তৎপরে শয়িতাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহকারে নিদ্রাহীনতা ও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মনে নানাপ্রকার কল্পনার উদয় ; কেবল প্রাতঃকালের প্রাক্কালে ঘর্ম ও নিদ্রা । **সন্নিপাত জ্বর ।**—* উজ্জল লোহিতবর্ণ সান্নিপাতিক রক্তস্রাব, অসংযত রক্ত ও সংযত অণ্ডলাল ; জিহ্বার প্রগাঢ় আ-রক্ততা, ও মথমলেব জ্বায় একপ্রকার দর্শন ; উদরে স্পর্শ-দেঘ ও রক্তাক্ত অতিমান, দুর্গন্ধি মূত্র ; গাত্র-জ্বালা ; অস্ত্র হইতে রক্তস্রাব ; অস্ত্রে ক্ষত ও

উদরে গড় গড় শব্দ, প্রচণ্ড প্রলাপ ও শয্যা হইতে উঠিয়া যাওয়া, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস ও শ্বাস সহকারে কুমকুসেব প্রাদাহিক রোগ; ঈষৎকণিশ-বর্ণ, রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন ও অনিষমিত নাড়ী, অথবা দ্রুত, কঠিন নাড়ী ও তৎসহ শ্বাস-বোধ; অবসন্নতা, উদাসীনতা; হতবুদ্ধিতা ও তৎসহ চকিত প্রমত্ত দৃষ্টি, বদ্বিবতা, অতিশয় দুর্বলতা, ও কম্পন; সামান্য সঞ্চলনে মুচ্ছা, শীতলপদ।

শ্রাট্‌মিউরিয়োটিকম ।

আমেবিক চিকিৎসকেরা সবিবামজরে শ্রাট্‌মিউরিয়োটিকমের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ডাঃ মিচেল বলেন যে পূর্বে তিনি কেবল পুরাতন জরে ও কুইনাইন সেবনের পববর্তী জ্বরেই এই ঔষধ ব্যবহার কবিতেন, এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস যে তরুণ জ্বরেও এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ঐক্যাহিক জ্বরে শ্রাট্‌মিউরিয়োটিকম তিনি অতিশয় ফলপ্রসূ মনে করেন। অতিশয় ঘর্ম ও শীতাবস্থায় পিপাসা তাঁহার মতে ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে প্রাতে জ্বরের পূর্ণ, প্রবল ও সম্যক আবেশ এবং তীব্র শীত; অনন্তর সমুখ কপালে শিবে:পীড়া, আবদ্ধ মুখমণ্ডল, ও উগ্র উত্তাপাবস্থা; পবিশেষে সন্ধ্যাকালে ঘর্ম শ্রাট্‌-মিউব লক্ষণ। ডাঃ বাব পুরাতন জ্বরে ধূসবাত পীতবর্ণ আকৃতি লক্ষণে এবং প্লীহা ও যকৃতের বিবর্দ্ধনে এই ঔষধ ব্যবহার কবিতে বিধি দেন। ইহা জ্বরের সময় প্রযুক্ত্য নহে, বিবামকালেই ব্যবহৃত্ত্বয়। জ্বরে ইহার ত্রিংশ বা তদূর্দ্ধ ক্রমে যেকুপ উপকার দর্শে, নিয়ক্রমে সেরূপ নহে। পুরাতন জ্বরে এই ঔষধ অল্প অন্তর্বর্তী ঔষধ ব্যতীত সচরাচর পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা বিধেয় নহে। পূর্ক্সাহ ১১টার সময় জ্বব আসিলেই শ্রাট্‌মিউরিয়োটিকম সাধারণতঃ ব্যবহৃত্ত্বয় হয়, কিন্তু অল্প সময়ে জ্বব আসিলে অথচ জ্বরের লক্ষণের সহিত এই ঔষধের সম্যক সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা অব্যবহৃত্ত্বয় নহে। অনুপ স্থানে ও নবকর্ষিত স্থানে বাস জনিত ম্যালেরিয়া জ্বরেই ইহার বিশেষ অধিকার। ডাঃ ফ্যাবিংটন বলেন যে পূর্ক্সাহ ১০। ১১ টার মধ্যে শীতাবস্থার আবির্ভাব; মাজার বা পায় শীতের আরম্ভ; শীতাবস্থায় কখন কখন পিপাসা, এবং সর্কশরীরে বেদনা; কখনও বা শীতপিত্তের প্রকাশ;

সাধারণতঃ উত্তাপাবস্থার প্রাবল্য, উত্তাপ সহকারে পিপাসাব আধিক্য; শিরঃপীড়ার ক্রমশঃ অধিকতর দপদপকবতা; এবং মস্তিষ্কে এই রক্তসঞ্চয়ের উগ্রতাবশতঃ সময়ে সময়ে রোগীর শ্রোণ্য; ক্রমে ক্রমে প্রভূত ঘর্মশ্রাব এবং ঘর্মনিঃসরণে শিরঃপীড়া ও অত্যন্ত লক্ষণেব উপশম; এই সকল লক্ষণে সন্নিবিষ্ট জ্ববে গ্ৰাট-মিউ ফলপ্রদ। বিলেপীজ্বর বা ক্ষয়রোগের আনুষঙ্গিক শীত পূর্নাঙ্ক ১০টার সময় উপস্থিত হইলে ঠানব ব্যাংস্বে, গ্ৰাটমিউরিয়টিকম নহে। কুইনাইন অপব্যবহারেব পববর্তী, গ্লীহাযকৃতাতি উপসর্গ সংযুক্ত পুৰাতন জ্ববে এপিসেব লক্ষণের সহিত গ্ৰাট-মিউর লক্ষণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রভেদ এই যে এপিসেব জ্বর অপরাহ্ন ৩টার সময়, এবং গ্ৰাট-মিউব জ্বব পূর্নাঙ্ক ১০টার সময় প্রকাশ পায়। এপিসের পূর্বে ও পরে গ্ৰাট-মিউ ব্যবহার করিলে ইহার উত্তম ক্রিয়া দর্শে।

বিশেষ লক্ষণ।—অত্যন্ত শীর্ণতা, অশ্রাব, কাসিলে চক্ষুদিয়া জল পড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, মলদ্বার সঙ্কুচিত অনুভব, মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা ও ছিন্নবৎ অনুভব। হাঁটিতে, হাঁটিতে, বা কাসিতে অনিচ্ছায় মুত্র নিঃসরণ, শ্রোণ্যে জাগিবামাত্র অতিশয় শিরঃপীড়া, রুটিতে অকচি ও লবণে স্পৃহা; দম্বাত্তর বিষয়ক স্বপ্ন। হ্রাস-বৃদ্ধি।—পূর্নাঙ্ক ১০। ১১ টার সময়; অগ্নির বা বোদ্ধেব উত্তাপে, শয়নে, শ্রমে, কথনে, লেখনে ও পঠনে বৃদ্ধি; অগ্রগামী জ্ববেব পূর্নাঙ্কে ও দিবসে বৃদ্ধি। বাহিরেব বাতাসে, শীতল জলে নানে; উপবেশনে; ও উপবাসে হাস। জ্বরের সময়।—পূর্নাঙ্ক ১০। ১১ টার সময়; রাত্রি ৩টা হইতে বেলা ১১টা পর্যন্ত। জ্বরের প্রকৃতি।—সকল প্রকৃতির বিষমজ্বব।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—পূর্নাঙ্ক ১০। ১১ টার সময় প্রবল শীত, শীতসহকারে অতিশয় পিপাসা, জ্বরের সকল অবস্থায়ই পিপাসাব বিদ্যমানতা, প্রধানতঃ অন্তবে শীত, হাত পা ববফের ত্রায় শীতল, পায় বা মাজায় শীতেব আবন্ত, তৎসহ নখেব নীলবর্ণ, পিপাসা, বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া, বিবনিষা, কখন কখন অট্টেতজ্ঞ। কখন কখনবা শীতের পূর্বে প্রতিনিয়ত বমন, ও শীতাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, কিন্তু শীতল জল পান নদিবাব অলক্ষণ পবেই বমন ইইয়া উহার পতন। উত্তাপ।—* বিবজ্জিত

শিবঃপীড়া সহ তাপ ও বারম্বার অধিক পরিমাণে জলপানের তৃষ্ণা ; অর্চনাত্মক বা দৃষ্টির অপরিস্ফুটতা, ও মূর্ছাকল্পতা ; অবকালীন ওষ্ঠে মুক্তাব ত্রায় ফোঁসা ; মুখের কোণে ক্ষত । ঘর্ম্ম ।—প্রচুর ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মে শিবঃপীড়া ভিন্ন অস্ত্রাঙ্গ উপসর্গের হ্রাস । বিরাম ।—বিরামকালে বন্ধতে সূচী-বেদ, অতিশয় আলস্য, শীর্ণতা, মলিন মুখাকৃতি ; আবিল মুখ, মূত্রে গোহিতবর্ণ বেণু ; ক্ষুধাহীনতা ; * ওষ্ঠে অব-স্কেটি (অব-চুঁঠা) (ইথে, নক্স, রস) ।

ন্যাট্রিমি উবিয়োটিকম ও আর্সেনিকে প্রভেদ :—(ক) ন্যাট্রিমি মিউ-
রিয়োটিকমের জ্ববে (১) প্রাতে ও দিনে বৃদ্ধি (২) শিবঃ পীড়ার নীচে আবস্ত,
তাপে বৃদ্ধি ও অধিক ঘর্ম্মস্রাবে কিঞ্চিৎ উপশম ; (৩) জ্ববের সকল অবস্থায়ই
পিপাসাব বিদ্যমানতা ; অধিক পরিমাণে বাবে বাবে জলপান ; এবং তাহাতে
পিপাসাব শান্তি, (৪) ক্ষুধামন্দা ; (৫) ওষ্ঠে অব-চুঁঠা ; এই সকল লক্ষণ থাকে ।
(খ) আর্সেনিকের জ্ববে (১) বৈকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি ; (২) অব সহকায়ে
শিবঃপীড়ার আবস্ত, ও ঘর্ম্মস্রাবেব অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত উহাব বিদ্যমানতা ;
(৩) শীত ও উত্তাপাবস্থায় বাবেবাবে কিন্তু অল্প অল্প ; এবং ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক
পরিমাণে জল পান, (৪) ক্ষুধা, (৫) ওষ্ঠেব শুষ্কতা ও ফাটা ; এইসকল
লক্ষণ থাকে ।

যদি শিবোবর্ণন, শিবঃপীড়া, ও চক্ষুরতাদি জ্ববের উপসর্গ ন্যাট্রিমি উবি-
য়োটিকম ব্যবহারেও সম্যক আবেগ্য না হয় তবে নক্সভমিকা সেবনে উপকার
দর্শে । নক্সভমিকা ও ন্যাট্রিমি উবিয়োটিকমেব প্রভেদ নক্সভমিকায় দ্রষ্টব্য ।

পাডফিল্ম ।

ডাঃ উইলিয়ামসন বলেন যে সমাজে বা প্রত্যয়ে শীত, শীতের পূর্বে পৃষ্ঠ-
বেদনা এবং তৎসহ কুক্ষিদেহে প্রচাপন, ও শাপার সন্ধিতে বেদনা, শীত
না বাইতে বাইতে উত্তাপাবস্থায় অগ্নন ; প্রলাপ, বাবদুষ্কতা, প্রবল শিবো-
বেদনা, ও ক্ষুধাহীনতা সহ অতিশয় পিপাসা, এবং ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা,—এই
সকল লক্ষণে সপিরাম, স্নায়ু-বিরাম, ও সন্নিপাত জ্ববে পাডফিল্ম ফলপ্রদ ।

কোষ্ঠবদ্ধ ও দক্ষিণাঙ্গে উপসর্গ সংঘূর্ণ জ্ববে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট

হয়। শীতাবস্থায় ও তাপাবস্থায় কতকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যবদূকতা ও পরে সেই সকল কথা বিস্মরণ পড়ফিল্মের একটি বিশেষ লক্ষণ। উত্তাপাবস্থার চরম সীমায় নিদ্রাবস্ত হইয়া ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রিত থাকে। ইহাবস্থায় একটি ব্যবস্থা-লক্ষণ। এই লক্ষণটী এপিসেও আছে। কিন্তু এপিসে ঘর্ম্মাবস্থায় গাত্রের শীতপিত্ত প্রকাশ পায় এবং পড়ফিল্মের ভায় এত অধিক ঘর্ম্ম থাকেনা। এই ঔষধের সবিরাম জ্বর সাধাবণতঃ পূর্ক্কাৎ ৭টা ব সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাব লক্ষণ প্রত্যুষে ও গ্রীষ্মকালে বর্দ্ধিত, এবং শম্মাকালে, বাহ্যিক উত্তাপে, ও চাপ প্রদানে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—শীতাবস্থায় অতিশয় ব্যবদূকতা এবং উত্তাপাবস্থায় প্রগাঢ় নিদ্রা; * আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য; শীতের পূর্ক্বে কটিতে তীব্র বেদনা, কিন্তু শীতাবস্থায় সেই বেদনার অবিদ্যমানতা, সামান্য শীত, শীতাবস্থায়ই উত্তাপের আবস্ত, শীতাবস্থায় পিপাসাশূন্যতা; উত্তাপাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, উত্তাপাবস্থায় নিদ্রা, ও প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব; জিহ্বার মলিনতা ও শুভ্র বেগাচ্ছন্নতা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ; মুখে বিষাদ; সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা, গথোর গন্ধে পর্য্যন্ত ঘ্রণা উদ্বেক; প্রচুর লালা নিঃসরণ; কোষ্ঠবদ্ধ বা উদবাসা। স্বল্পবিরাম জ্বর।—পৈত্তিক স্বল্পবিরাম জ্বর। শীতের পূর্ক্বে কটিবেদনা; উত্তাপাবস্থায় প্রলাপ, ব্যবদূকতা, ও নিদ্রা, এবং তৎপরে সেই সকল কথা বিস্মরণ, উত্তাপাবস্থায় প্রবণ শিবঃপীড়া, ও অত্যন্ত পিপাসা, ত্বক্বের লাবণ্যশূন্যতা, পর্য্যায়ক্রমে শিবঃপীড়া ও অতিসার; মুখে পচা আশ্বাদ; বহুদেশে পূর্ণতা ও মোচড়ান বেদনা, পৈত্তিক মল।

পলমেটিল।

পলমেটিল প্রয়োগের বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বিনীত স্বভাব ও অশ্রাবপ্রবণ ব্যক্তিদিগের জ্বরে আমাশয়ের ও অস্থির লক্ষণ এবং হরিৎপাণ্ডু বিদ্যমান থাকিলে ও সাবাস্থে জ্বরের আবেশ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহাব পবে কখন কখন ইংলিশিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যকীয় হয়। পলমেটিলের জ্বর-লক্ষণ সচবাচর বিমিশ্রিত থাকে, অর্থাৎ

শীতের পবে অতি শীত উত্তাপাবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ একই সময়ে শীত ও তাপাবস্থা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বা পার্শ্বে প্রকাশ পায়। শীতের পবে উত্তাপ যদি কেন্দ্র বোগীর নিকটই অনুভূত হয়, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না পায় তবে পলসেটিলাব জরে পিপাসা থাকে না; আর অন্তর বাহির উভয়ত্র বিদ্যমান থাকিলে পিপাসা থাকে। পিপাসাহীনতা পলসেটিলাব একটি বিশেষ লক্ষণ বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যতিক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। পলসেটিলাব ঘর্ম প্রায়ই শরীরের একপার্শ্বে হইয়া থাকে। বামপার্শ্বে পলসেটিলাব লক্ষণ সমধিক প্রকাশিত হয়। বামা ও বালকদিগের বোগেই এই ঔষধ বিশেষ ব্যবহৃত হয়। বোগের লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা এই ঔষধের প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ। বোগীর মানসিক লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা; অথবা জরের লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা থাকিলে অর্থাৎ দুই পালাব অবস্ঠিক একরূপ লক্ষণাপন্ন না হইলে পলসেটিলা ব্যবস্থা করা যায়। কুইনাইন অপব্যবহারের পন্থার্তী সর্বদা জরে মুখের তিক্ত আসাদ অথচ জ্বরের পরিচ্ছন্নতা; যৎসামান্য আনন্দশরিক বিশৃঙ্খলায় জ্বরের পুনরাব্রুত; এবং স্ত্রীলোকদিগের রজোবিলোপ বা বজ্রোবৈলম্ব্য লক্ষণে পলসেটিলা উপকারী। ডাঃ ক্যামিংটন বলেন যে কুইনাইন অপব্যবহৃত জবে অপরূহ দুই তিনটাব সময় পিপাসা; তৎপবে তৃষ্ণাশূন্য শীত, এবং বক্ষঃস্থলে শৈবিক বক্তনক্ষয় বশতঃ উৎকর্ষা ও গুরুত্ব অনুভব; নিদ্রার আবল্য অথচ নিদ্রা বাইতে অশক্তি; কখনওবা এক হস্তের উত্তপ্ততা, ও অপর হস্তের শীতলতা পলসেটিলাব লক্ষণ। গর্ভাবস্থার জবে গর্ভাবস্থার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে অথবা স্ত্রীলোক জবে লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। পলসেটিলাব লক্ষণ এক দিন অন্তর, সারাহে ও বাড়িতে, শরনে বা উপবেশনে বৃদ্ধিত; এবং অনানুত বায়ুতে, ও শীতল গৃহে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—জ্বরের আবেশের পূর্বে সমস্তদিন তন্দ্রালুতা, আময়্য অতিসার। অপরূহ চারিটার সময় শীত; শীতাবস্থায় তৃষ্ণাশূন্যতা; উৎকর্ষা, ও স্বাস-কষ্ট; শীত উপস্থিত হইবার সময় শ্লেষ্মা বমন; হেথা সেথা, স্থানে স্থানে শীত, অবশ্যতা সহ একপার্শ্বিক শীত; বদন বা এক হাতের উত্তাপ, অথ হাতের শীতলতা; দেহ উত্তপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

শীতল ; আভ্যন্তরিক শুক উত্তাপ, বাহ্যিক উত্তাপ পরিশূন্যতা ; প্রসব-বেদনার
 জ্বাষ বেদনা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাকর্ষণে চমকিত হইয়া উঠা । একপার্শ্বিক ঘর্ষ,
 কেবল বদন ও মস্তকে ঘর্ষ, বাত্রিতে ও প্রাতে ঘর্ষের আধিক্য, জাগরণান্তে
 সম্ভব ঘর্ষের বিবর্তি । ঘর্ষাবস্থায় ঘুমে কথা বলা । জ্বরের বিচ্ছেদকালে
 শিরঃপীড়া, শীত শীত অনুভব, স্নায়বীৰ্য অতিসাব, বিবর্মিষা, ও ক্ষুধাহীনতা ;
 বিবর্দ্ধিত প্লীহা ; বজ্রোলোপ বা রজ্জোবৈলক্ষণ্য । ত্র্যাহিক জ্বর ।—অনেক
 ক্ষণস্থায়ী শীত, বৎসামাত্র উত্তাপ, ও স্নিপাসাশূন্যতা ; জ্বরের সকল অবস্থা
 স্পষ্ট নহে, প্রায়ই এক অবস্থার সহিত অল্প অবস্থার মিলন, উত্তাপাবস্থার
 প্রাবল্য থাকিলে স্নিপাসাব বিদ্যমানতা । স্নিপাত জ্বর ।—প্রথমাবস্থায়
 শীতের প্রাবল্য ও ক্ষুধাহীনতা পরিশূন্যতা ; মুখেণ বিবসতা, উদ্রজিহ্বা, বিব-
 মিষা, স্লেষ্মাময় বমন, ও আনমন বিবেচন, বিবেচনের পূর্বে অঙ্গকূজন,
 চিমটিকাটাব জ্বাষ বেদনা, ও বাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, এবং খিটখিটে ও বিমর্ষ
 ভাব ; বাহ্য উত্তাপ অসহ, অথচ গাত্রাবরণ ফেলিলে তৎক্ষণাৎ শীতানুভব ;
 শরীরেব কেবল একপার্শ্বে উত্তাপ, অথবা একপার্শ্বে উত্তাপ অন্তপার্শ্বে শীতলতা,
 বা একপার্শ্বে ঘর্ষ ; কথা বলিবার সময় যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে অতিশয়
 আশ্রয় ; একইপ্রকার মনোভাব, শিপোবর্ণন ও আলোকে বিবেচ্য সহকারে
 শিরোগোবব ; কৰ্ম্মানিকা প্রথম সঙ্কুচিত, তৎপরে প্রসারিত, বধিবতা ;
 জিহ্বা দক্ষবৎ পবিশুক অথচ তৃষ্ণাশূন্যতা, মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ ;
 উদ্রালুতা, প্রণাপ, তরঙ্গব অবাস্তব বস্ত্র দর্শন, অস্থিৰতা, শব্দ্যস এপাশ
 ওপাশ করা, এবং উত্তাপবশতঃ আবরণবস্ত্র ফেলিয়া দেওয়া, কম্প, দুর্দ্বগতা
 ও সৰ্কাস্লেব গৌরব ; বাত্রিতে শব্দ্যস অজ্ঞাতসারে পাতলা মল নিঃসরণ ।

পলিপোরস ।

প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন ও অন্যান্য জরদ্র ঔষধ ব্যবহারেব পরবর্তী
 অধিক দিনেব পুৰাতন জ্বরে পলিপোরস বিশেষ ফলপ্রদ । প্রাত্যহিক সবি-
 রাম জ্বরেও ইহা উপকারী ; কিন্তু শবৎকালের জবে এই ঔষধে অধিক ক্রিয়া
 নশে না । বসন্ত, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালের জবেই ইহা সমধিক ফলপ্রদ ।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পৈত্তিক স্বল্প-বিরাম জ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । সবিরাম জ্বরে অতিশয় আলস্য ; মস্তকে রক্তসঞ্চয় ও শিবোঘূর্ণন ; বদনের উত্তপ্ততা, আরক্ততা, ও উহার সর্বত্র কণ্টক-বেধ অনুভব ; পৃষ্ঠে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনাসহকারে শীত ; তীব্র শীতানুভব, উষ্ণ হইতে অশক্তি । উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায় শিবোবেদনা, মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ, নড়িতে চড়িতে অপ্রবৃত্তি, তাপাবেশের অবসানে জড়তা ও অবশতা অনুভব ; সাধাবণতঃ উত্তাপাবস্থার অধিকক্ষণ স্থিতি ও তৎপবে অগ্রচূৰ ঘনজ্বাব ; * কদাচিত্ পিপাসা । বিরামকালে যকৃত ও উদরের অভ্যন্তরস্থ মস্ত্রেব অস্বাধিক ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, ও ত্বকেব পাণ্ডুবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, মূছ শিবঃপীড়া, অতিশয় আলস্য ; ক্ষুধাহীনতা বা কুকুবণ ঘন ঘন ক্ষুধা ; বিরামকালের স্বপ্নতা ;—এই সকল লক্ষণে পলিপোরস ব্যবহৃত হয় ।

পেটোলিয়ম ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—সর্গশরীরেব ত্বকে তীব্র কণ্ডূরন, তৎপবে অতিশয় শীত ও প্রবল কম্প, হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডলের অত্যন্ত শীতলতা ; শীতান্তে সাধাচ্ছে উত্তাপ, তৎসহকারে পদদ্বয়েব শীতলতা ; শীতের অব্যবহিত পরে প্রভূত ঘর্ম ; অথবা বাত্বিতে ঘর্ম । সন্নিপাত জ্বর ।—মূছ প্রলাপ সংযুক্ত টাইফয়েড অব । প্রলাপ কালে রোগী আপনাকে যুগল মনে করে, যথা একখানি পা তাহার নিকট হুইখানি বোধ হয়, অথবা কেহ যেন তাহার সহিত এক শয্যায শুইয়া আছে সে একপ অনুমান করে ।

প্লাটেগো ।

কুইনাইন বা অথ্যা জ্বর ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সবিরাম অব দূরীভূত হয়না ; অথচ পুৰাতন আকার ধারণ করিয়া অনেক দিন থাকে এবং প্রত্যাহ, অথবা দুই, তিন, চাবি, সাত, বা চৌদ্দদিন অন্তব নিয়মিতরূপে দিবাভাগে

উপস্থিত হয়, তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল দিবসে জ্বরের প্রকাশ ও অবকালে মূত্রাশয়ের মুখাবরক-পেশীর শিথিলতা ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

ফসফরিক এসিড ।

চিত্তের ঔদাস্ত এবং শবীর ও মনের নিশ্চেষ্টতা বিশিষ্ট দৌর্বল্য এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। মুখমণ্ডল ও নখনের আরক্ততা থাকিলে এই ঔষধ অব্যবহৃত। অনূৎকট টাইফয়েড অব্বে জ্বরেণ মূলকাষণ যে বিবাক্ত পদার্থ তদ্বারা রক্ত অপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডল অধিক আক্রান্ত হইলে ফসফরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। অতি ঘর্ম্ম বিশিষ্ট বিষম জ্বরেও ইহা আবোগ্যকর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—সর্ব্বশবীরে সৰ্ব্বশীত, হস্তাঙ্গুলীর বরফের ত্রায় শীতলতা, শীতাবস্থায় পিপাসাশূন্যতা। তৎপরে উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায়ও তৃষ্ণাহীনতা; অথবা অচৈতন্যকর অত্যন্ত উত্তাপ। হৃৎকলকর প্রভূত ঘর্ম্ম; কেবল ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা (চায়না, ঘর্ম্মান্তে পিপাসা, লাইকো)। সন্নিপাত জ্বর।—সম্পূর্ণ ঔদাসীন্ত; কথাবলিতে অনিচ্ছা; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ বা না বলিয়া আস্তে আস্তে উত্তরদান, (আলাপ-প্রবৃত্তি হ্রাস); মুহু প্রলাপ; *নাসা-রব-পবিশূন্য, নিদ্রাভিত্তবৎ জ্ঞানশূন্যতা, কিন্তু আগরিত হইলেই আবার সম্যক জ্ঞানের নক্সার; উত্তিয়া বলিলে শিরোগ্রূর্ণন বশতঃ পতন; লাণ্যশূন্য কাচবৎ চক্ষু, চক্ষুর চাগ্রদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল; হিব-দৃষ্টি; হৃৎস্রাণ নাসিকা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাসিকা-রন্ধ্রে অঙ্গুলী-প্রবেশ; ঐতি ক্ষীণতা, অথবা স্নায়বীয় বধিরতা; হত-বুদ্ধিবৎ মুখাকৃতি; জিহ্বা ও ওষ্ঠের পাণ্ডুবর্ণ; মুখে ও জিহ্বায় আঠাআঠা, হৃৎশ্বেদ্য শ্লেষ্মা; উদরাগ্নান ও * অতিশয় অল্প-কুজন; বেদনামূল্য জলবৎ ধূম-রাভ অতিসার, বা অনৈচ্ছিক মলস্রাব; অণ্ডলালময় হৃৎকাকার মূত্র; অতিশয় হৃৎকলতা; পাণ্ডুর, লোলিত স্বক্; কালিমা, যে সকল স্থানে ভরদিয়া শয়ন করায় তথায় নীলাভ লোহিতবর্ণ চিহ্ন, গাত্র-তাপের অল্পগ্রতা, অবিরত আঠাআঠা বা প্রভূত ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডল, হস্ত, ও পাকাশয়ের উপর শীতল ঘর্ম্ম; হৃৎকল, ক্ষুদ্র, দ্রুত, ও পর্য্যায়শীল নাড়ী।

ফসফরাস ।

ফসফরাসের লক্ষণে কোথাও সামর্থ্য বা জীবনীশক্তির বিবর্তনের নিদর্শন অথবা শারীরিক ক্রিয়ার বাস্তবিক উত্তেজনা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কেবল আর্সেনিকের লক্ষণের ছায় উপদাহশীল ছর্ব্বলতাই দেখা যায়। দীর্ঘ ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের বোঁগেই ফসফরাস বিশেষ উপযোগী। সবিরাম অর অবিরাম জবে, অথবা অবিরাম জব সবিরাম জবে পবিণত হইলেও ইহা খাটে। সন্নিপাত-দোষে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের অবসন্নতা লক্ষণে সন্নিপাত জরে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। ইহাব লক্ষণ দুই প্রহব বাত্রিব পূর্বে; ঝড় বৃষ্টিব সময়; বামপার্শ্বে বা চিং হইয়া শয়নে বর্জিত; এবং অন্ধকায়ে; নিদ্রান্তে, শীতল দ্রব্য আহায়ে, ও ঘর্ষণে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর।—বাহিতে উত্তাপ, আমাশয়ে উত্তাপেব আবন্ত, মুর্ছাবৎ ছর্ব্বলতা ও ক্ষুধা; তৎপবে শীত, শীতের পব আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ হাতে, কিন্তু বাহিরে শীতলতা, পিপাসাহীনতা। সন্নিপাত জ্বর।—দ্বিতীয়াবস্থা অবসানের প্রাকালে ফসফরাসের বক্তব্য, অথবা যকৃতের ছায নিবেটতা প্রাপ্তি, এবং তৎসহ যাতনা ও উৎকর্ষা; বক্ষঃস্থলের অশিথিলতা সহ কঠিন, শুষ্ক কাস; অথবা তবল, ঘড় ঘড় শব্দ সংযুক্ত, হৃষ্টেদা, স্বচ্ছ, বা গাঢ়, ঈশং পীত বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস; সন্ধ্যা হইতে দুইপ্রহব বাত্রি পর্যন্ত কাসেব বৃদ্ধি, অবসন্নতা, আঠা আঠা, ঘর্ষ, ক্ষুদ্রনাড়ী, নিমগ্ন মুগ্মণ্ডল ও বায়ুনলীতে ঘড় ঘড় শব্দ সহকারে ফসফরাসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা; সুপ্তি, প্রলাপ, শব্দ-হাতড়ান; মস্তিষ্কেব পক্ষাঘাতের আশঙ্কা ও পতনাবতা; শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, বিশেষতঃ মনুষ্যের শব্দে; নিমগ্ন, গম্ভীর-গত, নীলমণ্ডল-পবিবেষ্টিত চক্ষু; নাসাপার্শ্বের পাখার ছায় সঞ্চলন; নাসিকা হইতে বাবংবাব প্রচুর রক্তপাত; নাসিকা, ওষ্ঠ, মুখ, ও গলাব শুষ্কতা, এবং জলে উহাব অনিবৃতি; দন্ত হইতে মাটী সরিয়া যাওয়া ও উহা হইতে সহজে রক্তপতন; পরিশুদ্ধ, অচল, কৃষ্ণবর্ণ লেপাচ্ছন্ন, বিদারিত, ও চিকুণ জিহ্বা; শীতল পানীয় দ্রব্য পানের আকাজক্ষা, ক্ষুধাশূন্যতা; জলীয়, পটিক, না আঠা আঠা পদার্থ বমন; আগ্রান ও উচ্চ আটোপ সংযুক্ত

বেদনাহীন অতিসার; জলবৎ, দ্রবৎ হবিদগ্ধ, ধূসরাভ, অথবা পিসমাসিত রক্ত জনিত কৃষ্ণবর্ণ বিরেচন; প্রত্যেকবার মলস্রাবের পৰ অতিশয় দুৰ্বলতা; এসোনিয়ার স্থায় তীব্রগন্ধ, ঘোলা, শুভ্রঅধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র; দেহ-কাণ্ডে আরক্ত চিহ্ন, কালিমা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা; দেহের অতিশয় উত্তাপ, কিন্তু মস্তকে ও শরীর-শাখায় শীতল ঘর্ষ।

ফিরম ।

নীবক্রাবস্থায় ছদ্ম বক্তাধিকোব চিহ্ন; যথা, অহুত্বৈজিত ও প্রশান্তভাবে থাকিলে গণ্ডভূলেব পাণ্ডুবর্ণ ও মুখমণ্ডলেব মুদগ্ধ; কিন্তু উত্তেজনায বা উদ্বিগ্ধে উহাব আবক্ত বাগ, নাড়ীৰ পূর্ণতা ও নমনীয়তা, কিন্তু একোনাইটেব স্থায় পূর্ণতা ও উল্লক্ষনশীতলতা নহে; রক্তবহানাডীৰ প্ৰসারণ বশতঃ (প্ৰদাহ বশতঃ নহে) উদর-প্ৰাচীৰে ঘৃষ্টবৎ স্পৰ্শ-দেঘ; এবং দীৰে ধীৰে হাঁটিলে রক্ত-সঞ্চয়, বেদনা ও প্ৰায় অন্তান্ত সমস্ত লক্ষণেৰ উপশম ফিরম প্ৰযোগেব বিশেষ লক্ষণ। ফ্যাৰিংটন বলেন কুইনাইন অপব্যবহাবেব পৰবৰ্ত্তী দীৰ্ঘকালস্থায়ী সবিরাম জবে উত্তাপাবস্থায় রক্তবহা নাড়ীৰ, বিশেষতঃ শঙ্খস্থলেব ও মুখমণ্ডলেব শিৰাব ক্ষীততা, দপদপকব শিরোবেদনা, প্লীহাব বৃদ্ধি; অপিচ, শোণ থাকিলে ফিরম ব্যবহৃত হয়।

ভূরেৰ লক্ষণ ।—নীত উপস্থিত হইবাব সময় বমন, উত্তাপা বস্থায় চক্ষুব চাবিদিকে ক্ষীততা; প্লীহাৰ ক্ষীততা, বক্তহীনতা, অবগ্নতা, ও অতিশয় দুৰ্বলতা সহকাৰে উদরেৰ প্ৰসাৰিততা, মুখমণ্ডলেব অতিশয় পাণ্ডুবতা ও গালেব অভাস্তরেব দৈৰ্ঘ্যক বিল্লীৰ অত্যন্ত নীৰক্ততা ও শুভ্ৰতা : চক্ষুব উপৰে ও নীচে বদনেব. এবং পদবয়েৰ শোণ।

বেলেডোনা ।

বেলেডোনা স্থানবিশেষেব রক্তবহানাডী সঙ্কুচিত ও অত্রতা বিদান-তত্ত্ব উপদাহিত কৰিয়া সেই স্থানে বক্ত-সঞ্চয় জন্মায় ও অধিক রক্ত সঞ্চয়িত কাব। এই প্ৰকাৰে বেলেডোনা দ্বাবা রক্ত-সঞ্চয়ন বিবৰ্দ্ধিত হয় ও অর-লক্ষণ জন্মে। তৰুণ জ্বরে মস্তিষ্ক বা গল-দণ্ডেব প্ৰদাহ থাকিলে বেলেডোনা

উপকারী । মস্তকে বক্তৃৎসব বশতঃ শিবোলক্ষণ থাকিলেও ইহা ব্যবস্থেয় ।
 তবে অল্প শীত, অধিক দাহ ও ঘর্ম্মাবস্থাব অভাব বা অল্পতা থাকিলে বেলে-
 ডোনা ব্যবহৃত হয় । ইহাব লক্ষণে আর্সেনিক জ্ঞাপক অবসন্নতা বা একো-
 নাইস্চক অস্থিৰতা থাকে না । ডাঃ ডনহাম বলেন যে বেলেডোনার লক্ষণে
 পর্যায়শীলতা লক্ষিত হয় না, এবং জ্বরের অবস্থা-বিভাগ স্পষ্ট থাকেনা ।
 অতএব ন্যালেবিয়া জ্বরে সহস্র দাহাবস্থা অবস্থ হইয়া প্রায় অবিবাম থাকিলে
 এবং প্রথম হঠাৎই মস্তকের বক্তৃৎসব বা প্রদাহাদি শিবোলক্ষণ ও তৎসহ
 বেলেডোনা জ্ঞাপক সাধারণ লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকিলে বেলেডোনা ব্যব-
 হৃত হয় । অপর টেহাও টেহাব অভিন্নত যে সন্নিপাতজ্বরে উদ্ভূততা বা
 মস্তিষ্কেব প্রদাহ উপস্থিত হইলেই কেবল অন্তঃকর্ষী প্রবণ স্বরূপ বেলেডোনা
 ব্যবস্থেয় । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে জ্বরে মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশীয় স্নায়ুগুণ্ডল
 আক্রান্ত হইলেই কেবল বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় । শিশুদিগের বোগে অতি
 প্রথমেই এই স্নায়ুগুণ্ডল আক্রান্ত হয় । যুবকদিগের বোগে, প্রাপ্তে
 জ্ব প্রকাশ পাস, তৎপরে মাস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন হয় । তখন বেলেডোনার
 ব্যবহাব হইয়া থাকে । প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, গলদেশেব ধমনীৰ দন্দপঃ
 কঠিন, পূর্ণ, উল্লক্ষনশীল নাড়ী, এবং প্রবল প্রলাপ, অপর, সহসা
 বোগ-লক্ষণেব আবিভাব ও তিবোভাব এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান
 লক্ষণ । এই সকল লক্ষণকে বেলেডোনার সাধারণ লক্ষণ বলে ।
 কাবণ, বেলেডোনা জ্ঞাপক প্রায় সকল বোগেই এই ক'ষকটী লক্ষণ বিদ্যমান
 থাকে । পূর্ণ-বাক্ত, বক্তৃৎসব-পবতন্ত্র, বিশেষতঃ শব্দীবেব অন্তান্ত স্থান হইতে
 মস্তকে সমবিক বক্তৃৎসব-প্রবণ; কতকটা ক্যালকেবিয়াব গ্রাং মাংসল ও
 প্লেগ্মা-প্রধান ব্যক্তিদিগেব পক্ষেই বেলেডোনা সর্স্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী ।
 যাহাবা স্তম্ভ সমবে প্রক্লান্ত থাকে ও প্রমোদ জন্মায়, কিন্তু বোগেব সময়
 কোপন ও অর্দাব হইয়া উঠে তাহাদেব পক্ষেই বেলেডোনা ভাল খাটে ।
 বেলেডোনার লক্ষণ অপবাহ তিনটাব পব, পুনবাব মধ্যবাহেব পব, সঞ্চা-
 লনে, স্পর্শ করিলে, বায়ু-প্রবাহে, আকস্মিক উষ্ণ ঋতুর পবিবর্তনে,
 গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যেব উত্তাপে ও পানি কবিবাব সময় বিবদ্ধিত; এবং উষ্ণ
 গৃহে ভালকপে বস্ত্রাবৃত থাকিলে উপশম প্রাপ্ত হয় ।

জরে একোনাইট ও বেলেডোনা প্রভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ । সহানুভৌতিক স্নায়ুগুণে মুখ্য ক্রিয়া নিবন্ধন একোনাইটের জর জন্মে । মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুণে মুখ্যক্রিয়াবশতঃ বেলেডোনার অব উৎপন্ন হয় । জরের প্রারম্ভাবস্থায় প্রবল মানসিক অস্থচ্ছন্দতা ; অস্থিরতা, পার্শ্ব-পরিবর্তন ; মৃত্যুভয় ; ঘর্ষশূন্য উত্তপ্ত গাত্র ; পূর্ণ, উন্নমনশীল নাড়ী ; ক্লিয়ৎপরিমাণে অবাস্তব দৃষ্টি ; নিদ্রাবস্থায় অন্ন অন্ন ক্রন্দন ; অন্ন অন্ন মূহপ্রণাপ (বিড় বিড় করিয়া বকা) ; এই সকল মাস্তিষ্ক লক্ষণ জ্বরের উত্থাপের আতিশয়্য বশতই উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্কের মুখ্যপ্রদাহ হইতে জন্মে না । একরূপ অবস্থায় একোনাইট বেলেডোনা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী । কিন্তু অব প্রবর্তিত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থ্যয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—প্রবল শিরঃপীড়া, পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, অঙ্গের শীতলতা, মস্তকের উত্তপ্ততা ; পৃষ্ঠেব নিয়মিত কেম্পের প্রধাবন ; অবিরত পরিণত জ্বালাকর উত্তাপ, শীঘ্র উত্তাপাবস্থায় আরম্ভ, উত্তাপকালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও ক্যাবোটাইড ধমনীর দপদপ এবং তৎসহ কেবল মস্তকে ঘর্ষ, শরীবের আবৃত স্থানে ঘর্ষ (অনাবৃত স্থানে ঘর্ষ, একন) ; পিপাসা শূন্যতা অথবা অধিক পিপাসা ; কোপনতা ও নাকে কাঁদা । সন্নিপাত জ্বর ।—অপ্রবর্তিত অবস্থায়, মস্তিকে অতিশয় রক্তসঞ্চয় ; মস্তকেব পশ্চাষ্টাঙ্গে বা শিখরদেশে ছুরিকাঘাতের স্থায় বেদনা, অথবা কপাল যেন ফাটিয়া পড়িবে একরূপ অনুভব, পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ ; প্রদীপ্ত ও স্থির চক্ষু, প্রসারিত কনীনিকা, নিদ্রাবস্থায় গোঁগো শব্দ ও অস্থিরতা ; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, প্রচণ্ড প্রলাপ, অথবা রাত্রিকালে কতিপয় অসংলগ্ন বাক্যবিশিষ্ট প্রলাপ, আবর্ত, শুষ্ক, কম্পিত, ও বিদারিত জিহ্বা, কোষ্ঠবদ্ধ বা বারংবার অন্ন অন্ন আতিসারিক মলনিঃসরণ ; অধক্ষেপ বিশিষ্ট ; অথবা পরিষ্কার প্রভূত মূত্র ; পূর্ণ, পুষ্ট, আয়তন-পরিবর্তন-শীল নাড়ী । তৃতীয় অবস্থায়, রক্ততা, সকলপ্রকার অভিযোগ ও আকাজ্জা পরিশূন্যতা, মধ্যে মধ্যে কেবল পানীয় জ্বব্যের অভিল্য প্রকাশ, গিলিতে কষ্ট ; স্থিৰ, চিক্ণ চক্ষু ; নিম্নহস্ত পেশির শিথিলতাবশতঃ মুখের বিকাশ ; জিহ্বার চর্ম্মাকৃতি, স্তরং উচ্চ বাহির করিতে যোগীর অশক্তি ; বহিরতা ; উদরের

দৃঢ়তা ; অনিচ্ছায় মলমূত্র নিঃসরণ ; শয্যাব পশ্চাদ্ধিকৈ সবিয়া যাওয়া, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেওয়া, জজ্বা প্রক্ষেপ করা ; শয্যা-বস্ত্র উৎক্ষেপণ ; নিদ্রা-শূন্য নিদ্রালুতা ; সবিরাম নাড়ী ; গাত্রেব অতিশয় উত্তাপ সহ ঘর্ম্ম-প্রবণতা ; মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ; প্রতি সঞ্চলনে উপচয় । সূতিকা জ্বর ।— প্রসাবিত উদর, উহাতে সূচী-বেধ ও খননবৎ বেদনা ; সহসা বেদনার আবেশ, বেদনা সত্ত্বর উপস্থিত হয়, এবং অধিকক্ষণ বা অল্পক্ষণ থাকিয়া আবার সত্ত্বর যায় ; * প্রবল আক্ষেপিক উদর-বেদনা, বোধহয় যেন নশী বিক্ষিয়া রহিয়াছে, অথবা সঙ্গমেজ্জিয়ারদিকে যন্ত্রণা প্রদ আবেগ, * উদবে স্পর্শ-দেহ ; শরীরের কোন কোন অংশে শীত, কোন কোন অংশে উত্তাপ, অথবা * গাত্রে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকে জ্বালাকব উত্তাপ, তৎসহ মুখমণ্ডল ও চক্ষু আবদ্ধতা, ক্যারটিড ধমনী বদপদপ সহ কপালে অবিবাম বেদনা ; আবদ্ধ জিহ্বা ও পিপাসাসহ শুষ্ক মুখ, গল-কোষেব আক্ষেপ সহ গিলিতে কষ্ট ; অনিদ্রা ও ছটফট, প্রমত্তপ্রায় প্রসাপ, বা অত্যাধিক মাস্তিক লক্ষণ ; স্বপ্ন, জলবৎ, ও আঠা আঠা, অথবা দুর্গন্ধি, বা সম্পূর্ণ বিস্মৃত প্রসবাস্তিক স্রাব ; জরাযু হইতে দুর্গন্ধময় সংযত রক্তস্রাব ; অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব ; ক্ষীত ও প্রবাহিত, অথবা গোলিত ও দুগ্ধশূন্য স্তন ; কোষ্ঠবদ্ধ, বা অতিসাব । (বেল অপ্রচুর হইলে, হাইওস দিয়া দেখুন) । স্বপ্নবিরাম জ্বর ।—জিহ্বায় পীতাত বা শুভ্রবর্ণ গাঢ় লেপ, পানাহাবে অপ্রবৃতি, অন্ন, তিক্ত বা আঠা আঠা পদার্থের বমন ; আঠা আঠা বিরেচন ; শরীরে, বিশেষতঃ মস্তকে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ পিপাসা, ও একবার উত্তাপ একবার শীত ; আকুলতা, অস্থিরতা, সন্নিদ্ধতা বা খামখেয়ালীভাব, প্রবল শিবঃপীড়া, মস্তকের সমস্ত যেন কপালে পতিত হইবে এ প্রকার অনুভব ; মুখশোণ, গিলিতে কষ্ট ; দিবসে প্রগাঢ় নিদ্রা, বাজিতে নিদ্রাশূন্যতা । (ক্যাম ও মার্কেস সহিত তুলনা করুন) ।

ব্যাপ্তিসিয়া ।

ব্যাপ্তিসিয়া টাইফয়েড জ্বর জন্মায়, স্ততরাং টাইফয়েড জ্বরের প্রথম ও প্রবর্তিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সস্তত জ্বরে (কণ্ঠ-নিউড ফিভার) প্রথম উপক্রমে ইহা ব্যবস্থা করিলে সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত

হয় না। শয়নে অঙ্গ-গ্রহ, ও শরীরের খণ্ডবিখণ্ডতা অনুভব ইহার প্রধান প্রবেগ-লক্ষণ। স্বল্প-বিরাম জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থায়ও পাকাশয়িক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা বা দুর্বলতাবিশিষ্ট সকল প্রকার জ্বরের পূর্বকণ ও প্রথম অবস্থাই ব্যাপ্টিসিয়া অতিশয় ফলপ্রসূ। প্রাদাহিক জ্বরে ইহা অব্যবহ্যে। প্রদাহ অপেক্ষা উপদাহিতাই ইহা উপযোগী। স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাবল্যে টাইফয়েড ও মাস্টিস জ্বরেই এই ঔষধ সমদিক ব্যবহৃত হয়। (ক) অত্যন্ত দুর্বলতা; (খ) মস্তক খণ্ড-বিখণ্ড বা আপনাকে টুইজন অনুভব; (গ) মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, শ্বাসাদি সকল আবেষ্ট অতিশয় দুর্গন্ধ, (ঘ) যে পার্শ্বে ভব দিয়া শয়নকরা যায় সেই পার্শ্বে ঘুটবৎ অনুভব, (ঙ) কণ্ঠাঘাত উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া, এইগুলি ব্যাপ্টিসিয়ার বিশেষলক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—জ্বরের পূর্বে আলস্য ও অস্বচ্ছন্দতা। সমস্তদিন শীত শীত করা ও সন্ধ্যায়ে ঘুটবৎ বেদনা, পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর নীচে উঠা নামা। অনন্তর সমস্ত শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, মধ্যে মধ্যে আবার পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর নীচে উঠা নামা, ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ, কটিদেশ হইতে চাবিদিকে তাপের বিকীর্ণণ। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধময়, অনন্থিক ঘর্ম্ম। বিবানকালে সন্ধ্যাবেশে অবজ্ঞা ঘ্রানি, অস্থিরতা, ও দুর্বলতা।

সূতিকাজ্বর।—সম্মিপাত-লক্ষণবিশিষ্ট বক্ত-দুষ্টিতা, অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত দুর্গন্ধি প্রসবাস্তিক শ্রান, উদরের ক্ষান্ততা, পূর্ণতা, কাঞ্চান, কুঞ্জন, ও বমনে উৎপন্নিত হইবে বলিয়া অনুভব; অল্পে স্ত্রীত্র সঞ্চরমান বেদনা, মলিন আবৃত্ত স্বল্প মূত্র; শয়নে শ্বাস-কষ্ট, কিন্তু বক্ষঃস্থলের অনাকুঞ্জন, অস্থিরতা, অস্বচ্ছন্দতা, ও সন্ধ্যাবেশে অবগম্য অনুভব।

সম্মিপাত জ্বর।—প্রথমাবস্থায় বক্তবর্ণ প্রাস্ত, বা কপিশ কিম্বা পীত-মিশ্রিত কপিশবর্ণ কেন্দ্র বিশিষ্ট শুভ্রজিহ্বা, মুখের তিত্তস্বাদ বা স্বাদশূন্যতা; আহার পবিপাকে অশক্তি, বাবদ্যাব পীতবর্ণ বিবেচন, দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে কুঞ্জন ও অল্প অল্প স্পর্শ-দ্বেষ, নার্ডাব বেগেব ও জ্বরের বৃদ্ধি; শরীরের যে অংশে ভরদিয়া শয়ন করা যায় তাহাতে বেদনা। প্রবর্তিত অবস্থায়* জড়বুদ্ধিবৎ মুখাকৃতি, অত্যন্ত শিথিলতা, নস্তিঃশ্ব বাতনা ও ঘুটবৎ অনুভব,

সমস্ত পেশীব বেদনাসহ অবসন্নতা ; মানসিক শক্তির অভাব , সমস্ত শরীরে, বশেষতঃ মুখমণ্ডলে জ্বালা ও তীব্র উত্তাপ , শুষ্ক, গাঢ় লেপারত জিহ্বা, জিহ্বা স্ফীত, অথবা দৃঢ় ও অবশ অল্পভব, জিহ্বায় ক্ষত ; স্থূল বাক্য ; স্বরভঙ্গ সংযুক্ত কাশ , বাৎসব মূৰ্ছাবেশ সহ উদবোর্ধ্বে অতিশয় শূন্যতা ও ঘৃষ্টবৎ অল্পভব, ত্রিকস্থানে বেদনা ; শরীরে যে অংশে ভবদিয়া শয়ন করা যায় সেই অংশে ঘৃষ্টবৎ অল্পভব ; অতিশয় অস্থিভতা , ভ্রান্তি ; রোগীর বোধ হয় যেন ঠিক তাহাবই স্থায় আব এক ব্যক্তি তাহাব পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে , মাথা যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়ান বহিয়াছে এবং সে সেই খণ্ডগুলি একত্র করিবার নিমিত্ত শয্যায় এগাশ ও পাশ করিতে থাকে ; অশমনকতা, কাহাবও কথা শুনিতে শুনিতে, ও উত্তর দিতে দিতে ঘুমান্ধা পড়া, প্রগাঢ় নিদ্রা, জোরে নাড়িয়া বা নাম দিয়া ডাকিয়া জাগাইতে হয়, স্বাসে পচাপক্ষ ; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ বা মলিন, এবং * অতিশয় দুৰ্গন্ধময় মল ; * দুৰ্গন্ধময় বম্ব ও মূত্র , অতিশয় দুৰ্লভতা ও স্নায়বীয় অবসন্নতা, তৎসহ উত্তেজনা , শয্যা পবিত্রাণ করিয়া যাইবার চেষ্টা , সমস্ত দিন শীত শীত অল্পভব, ব্যক্তিগত উত্তাপ , গাত্রবেদনা সহ শীত ; ক্ষত ।

ব্যাপিটিসিয়া ও জেলসেমিয়মে প্রভেদ ।—টাইফয়েড জ্বরের প্রাবৃত্তাস্থায়, জেলসেমিয়ম ও ব্যাপিটিসিয়ায় লক্ষণে অতিশয় সাদৃশ্য আছে। দুই ঔষধেই (১) পেশীব বেদনা ও অবসন্নতা, (২) অবসন্নতা সহকারে নিদ্রা-লুতা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা, (৩) মস্তক বা অত্র কোন অঙ্গ বৃহত্তর অল্পভব ; এবং (৪) অপবাক্ষে বৃদ্ধি , এই কয়টী লক্ষণ আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে জেলসেমিয়মের ক্রিয়া ব্যাপিটিসিয়া অপেক্ষা মৃদু। এই মৃদু ও তীব্রতাই ইহাদের প্রভেদ ।

—+—

ব্রাইওনিয়া ।

রক্তের পবিত্ববর্তনে অর্থাৎ উহাব পবিমাণ, গুণ, ও সঞ্চালনের বৈলক্ষণ্যে, যথা অব্যাবস্থায় ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পবিত্ববানজবে এই ঔষধ বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না। স্বল্পদ্রিগ্ন জ্বরেই ইহা অধিক প্রয়োগিত হয়।

প্রাদাহিক, আমশাতিক, আমাশয়িক, পৈত্তিক, আতিবাতিক, ও সান্নিপাতিক জ্ববেও সময়ে সময়ে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের বিবদ্ধিত ক্রিয়া ও তজ্জন্ত অনেকটা একোনাইটের জ্ঞায় দ্রুত, কঠিন, অশিথিল নাড়ী ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-শক্তির বাস্তবিক আধিক্য ; ও শরীর সঞ্চালনে উচ্চ বুদ্ধি, স্তব্ধ বোগীর সম্পূর্ণ স্থির থাকিবার আগ্রহ ; জ্বরের সহিত প্রায় সর্বদাই মস্তকে মৃদু মৃদু দপদপকর অথবা তীব্র শলাঘাতবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে প্রায় সতত চক্ষুর অভ্যন্তরে ও উপরে তীব্র বেদনা ; বেদনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া রোগীর মস্তক ও চক্ষু নাড়িতে অগ্রবৃত্তি ; বালিশ হইতে মস্তকোত্তোলনের যৎসামান্য চেষ্টায় বিবমিষা ও মুচ্ছাকল্পতা অনুভব ; প্রাদাহিক জ্বর ও লঘুপ্রকৃতির আমাশয়িক জ্বরাদি মৃদু জ্বরে অতিশয় মুখ-শোথ ও জিহ্বার মলাচ্ছন্নতা, জিহ্বার শুভ্রবর্ণ লেপ ও জিহ্বাব মধ্যস্থলের নিম্নভাগে উহার সমধিক স্পষ্টতা ; জিহ্বা-প্রান্তের সমাক পরিচ্ছন্নতা ; জ্বরের তীব্রতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার সান্নিপাত প্রকৃতি ধাবণ ; পৈত্তিক লক্ষণের প্রাবল্যের উপস্থিতি ; পূর্ণের শুভ্র লেপাবৃত্ত জিহ্বার এক্ষণ দীর্ঘপীতবর্ণ, ও মুখে নিশ্চিত তিক্তাসাদ ; বিদীর্ণকব শিবঃপীড়া ; দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচী-বেধ ও অল্প অল্প বেদনা সহকারে উদরোদ্ধ-দেশে স্পর্শ-বেধ ; সান্নিপাত-লক্ষণ বতই বাড়িতে থাকে ততই জিহ্বার শুভ্রতার আতিশয্য, কিন্তু জিহ্বার লেপের পূর্ববৎ অবস্থা ; সবিবাম জ্বব হইলে শীত ও উত্তাপের বিমিশ্রতা, অর্থাৎ শীতাবস্থায় মস্তকেব উত্তপ্ততা, গওদেশের প্রগাঢ় আরক্ততা এবং পিপাসা, ও অনেক ক্ষণ পর পর একবাবে অধিক পরিমাণে জলপান ; কোন কোন রোগীরবা অবিরত পিপাসা ; নাড়ীর কঠিনতা, দ্রুততা ও অশিথিলতা ; যৎসামান্য শ্রমে শ্বসের উদ্রেক এবং উহার অল্প বা তৈলবৎ গন্ধ ;—এই গুলি ব্রাইওনিয়ার জ্বরের সাধাবণ লক্ষণ ।

কোপনতা ও সহজে ক্রোধের উদ্রেক ব্রাইওনিয়ার বিশেষ মানসিক লক্ষণ । কি পিত্তজনিত রোগ, কি শিবঃপীড়া, কি অগ্নিমান্দ্য, এই সকল রোগেই ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক এই মানসিক লক্ষণ বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে । ব্রাইওনিয়ার লক্ষণগুলি নড়িলে চড়িলে ও স্পর্শে বৃদ্ধি পায় । দুই চারিটা বিশুদ্ধ স্নায়বীয় লক্ষণ ব্যতীত ইহাব সমুদায় লক্ষণেরই এই প্রকৃতি নষ্ট হয় ।

হৃচীবেদন ও বিদ্ধবৎ বেদনা এবং সঞ্চলনে রোগ-লক্ষণেব বৃদ্ধি ব্রাইওনিয়ার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীতের প্রাবল্য ; প্রধানতঃ সায়াহ্নে, সচরাচর কেবল দক্ষিণপার্শ্বে শরীরেব বাহ্যিক শীতলতা সহ শীত ; অনাবৃত বায়ু অপেক্ষা গৃহের অভ্যন্তরে শীতের আধিক্য ; * ওঠে ও অস্থূলীর অগ্রভাগে শীতের আবস্ত । শুষ্ক জ্বালাকর উত্তাপ, প্রধানতঃ অন্তবে তাপ, শিবির অভ্যন্তরে যেন রক্ত জলিতেছে এরূপ অহুভব, তাপাবস্থায় সমুদায় যাতনার বৃদ্ধি ; অল্পক্ষণ পরে পরে কেবল কোন কোন অঙ্গে ঘর্ষ, অবের সকল অবস্থায়ই অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু উত্তাপাবস্থায়ই পিপাসার আধিক্য ; প্রভূত ঘর্ষ, সচরাচর ঘর্ষের অল্পত্ব, যৎসামান্য পরিশ্রমে ঘর্ষের উদ্রেক, এমনকি অনাবৃত বায়ুতে আন্তে আন্তে হাঁটিলেও ঘর্ষস্রাব এবং অধিকক্ষণ ঘর্ষের অবস্থিতি ; পূর্ণ, কঠিন, অশিথিল, দ্রুতনাড়ী ; উত্তাপাবস্থায় বা শীতের পূর্বে শিরোবেদনা ও শিবোগূর্ণন । বিরামকালে উদরের উপসর্গ ; অঙ্গ-বেদনা ; নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা ; মলাচ্ছন্ন জিহ্বা, তিক্ত আস্বাদ, আহারে অরুচি ; বিবমিষা, বমন-প্রবৃত্তি, ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ও শয্যায় গাএ উষ্ণ হইলে বোগীর আরাম অহুভব । স্বল্পবিরাম জ্বর ।—শুষ্ক কপিপাত পীতবর্ণ জিহ্বা ; মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ ; মুখে তিক্ত আস্বাদ, বিশেষতঃ নিদ্রান্তে, অথবা স্বাদশূন্যতা বা বিষাদ ; অন্ন পানীয়, কফি, বা সুবা পানের অতিশয় স্পৃহা, নিরেট খাদ্য দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি, বিবমিষা, আমাশয়ে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, বারংবার বমনের ইচ্ছা, অথবা পিত্ত বমন, বিশেষতঃ পানান্তে ; মস্তকে, আমাশয়-গহ্বরে, অথবা পার্শ্বে, ও শবীর-শাখার হৃচী-বেদ, বিশেষতঃ কাসিবার বা হাঁটিবার সময় ; আমাশয়-গহ্বরে ভার বা অশিথিলতা অহুভব, বিশেষতঃ আহারান্তে ; কোষ্ঠবদ্ধ ; জলবৎ, পবিকার বা জৈবৎ পীতবর্ণ, পীতভ অধঃক্ষেপ সংযুক্ত মূত্র ; জ্বালাকর পিপাসা সহ প্রবল গাত্রোত্তাপ, অথবা সর্কশবীরের কম্প, ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা (এবং উত্তাপ) সহ শীত শীত অহুভব ; প্রচণ্ড শ্রভাব ; অতিশয় দুর্বলতা ; শিবোগূর্ণন সহ মস্তকের জড়তা । (একন, ক্যাম, নক্স-ভম সহকারে তুলনা করুন) । সন্নিপাত জ্বর ।—(১) জ্বরেব প্রারম্ভ হইতে হিমবৎ, দপদপ কর, উৎক্ষেপজনক শিবঃপীড়া, বিবমিষা, ও বিবক্টি, জৈবৎ

শুভ্র জিহ্বা, তিক্ত আশ্বাদ, গল-শোথ, পিপাসা; ওষ্ঠে ও মুখে কোঁকাব ছায়া উদ্ভেদ ;
 আশাশয়ে খল্লী সদৃশ আকৃষ্টতা ; উদবোধে চাপদিলে বেদনা ; উদবেদনা ;
 , আশ্বান, কোষ্ঠবদ্ধ ; মুখেব স্বল্পতা ও আবিলতা ; ভগ্ন বা ক্ষীণ স্বব ; প্রাতে
 কাস ; কাসিলে বা গভীর নিশ্বাস গ্রহণ কবিলে পশুর মধ্যবর্তীস্থানে তীব্র
 বেদনা ; কষ্টপ্রদ অলসতা ; মস্তকে শীতলঘর্ষ ; শুষ্ক ত্বক । (২) দ্বিতীয় অবস্থায়,
 স্নায়বীয় বা মানসিক লক্ষণাবৃত টাইফয়েড জ্ববে, পূর্বদিনেব ঘটনা সম্বন্ধীয় বা
 বিষয়কার্য সম্পর্কীয় প্রবল প্রলাপ, এবং শয্যাহইতে ছুটিয়া যাইবার প্রবৃত্তি ;
 চক্ষু মুদিত কবিবার সময় বিভ্রম দর্শন ; কোপনতা, বিবক্ত চিত্ততা, ক্রত-
 ভাষিতা ; অতীব, স্থচী-বেধবৎ বা ছিন্নকর শিরঃপীড়া , সঞ্চালনে ও চক্ষু
 উন্মীলনে উহাব আধিক্য ; চক্ষু প্রভাশূন্যতা ও সজলতা ; ক্রতিশক্তি
 ক্ষীণতা, জ্ববেব তীব্র উত্তাপ, অনেক ক্ষণ পবে পবে এক একবাবে অধিক
 পরিমাণে জলপান করিবাব প্রবল তৃষ্ণা, মুখেব শুষ্কতা ও উহাব অভ্যন্তরে
 কোঁকাব ছায়া উদ্ভেদ ; স্বাদ-শূন্যতা ; আত্মাবে অরুচি এবং তৎসহকারে বিব-
 মিষা ও বমন কবিবার ইচ্ছা, অথবা আঠা আঠা পিত্তবমন ; উদবোধে প্রচা-
 পনে স্পর্শ-দ্রেষ ; উদবেব ক্ষীততা ; কোষ্ঠবদ্ধ বা প্রাতে ও বাত্রে অতিসাব,
 অতিসাবে প্রায় অটনচ্ছিক দুর্গন্ধময় পচা, পুণাতন পণিবেব গন্ধবিশিষ্ট মল
 নিঃসবণ, ভাবী মূত্র ; কাসিবাব বা গভীর নিশ্বাস গ্রহণ কবিবার সময়
 বক্ষঃস্থলেব পার্শ্বে ব্যথা, দিবসে নিদ্রা রাত্রিতে ছটকটি ; ক্ষুদ্র ও কোমল
 নাড়ী ; আঠা আঠা ঘর্ষ , হস্ত-কম্প । (৩) তৃতীয় অবস্থায় :—অতিশয়
 অলসতা ও দুর্বলতা , চুপকরিয়া থাকিবাব ইচ্ছা ; নড়িলে চড়িলে সর্বদা
 বেদনা ; মুখে ও গলায় সাবানেব ফেণাব ছায়া ফেণা লালাসঞ্চয়, সময়ে
 সময়ে তন্দ্রাবা বোগীব প্রায় গল-বোদ , শুষ্ক, বজ্রর, বিদারিত, ও সচরাচর
 মলিন কপিশবর্ণ জিহ্বা ; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, গোঁগো ও কোঁকো করা ,
 মুখেব চর্কণবৎ সঞ্চালন সহকারে অস্থির নিদ্রা, হৃদ-প্রদেশে যাতনা ও গৌবব ;
 প্রলাপ সহ মানসিক অবসাদ , স্বপ্নশূন্য নিদ্রা , গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা ;
 অনিচ্ছায় মল-মূত্রেব নিঃসবণ , যন্ম সহকারে বা ঘন্মব্যতীত শবীরেব এক
 প্রকার বিশেষ অন্ন গন্ধ , সংযত প্রকৃতি, কিন্তু সহজে ক্রোধের উদ্দীপনা ।

ভিরেটম এল্‌বম্ ।

ডাঃ ডনহাম বলেন যে ভিরেটমের প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় লক্ষণেব সহিতই (যেখানে কেন সেই লক্ষণ প্রকাশিত না হউক) “কপালে শীতল ঘর্ষ” এই বিশেষ লক্ষণটি বর্তমান দৃষ্ট হয়। ভিরেটমজ্ঞাপক শীতলতা জ্বর-রোগে এই ঔষধি প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। সবিরাম জ্বর, দূষিত সবিরাম জ্বর, ও সন্নিপাত জ্বরাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভিরেটমের লক্ষণ পানাস্তে; মলত্যাগের পূর্বে ও মলত্যাগকালে, ও উত্থানে বিবর্তিত; এবং উপবেশনে ও শয়নে উপশমিত হয়। সহসা বলক্ষয়, শবীবের শীতলতা, কপালে শীতল ঘর্ষ, বৎসামাত্র শ্রমে মূর্ছাব আক্রমণ, ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীতের প্রাধান্ত; শীত সহকারে পিপাসা; শীত, আভ্যন্তরিক হইলে উষ্ণাভিমুখে নয় কিন্তু নিম্নাভিমুখে গতি। নীলবর্ণ, শীতল, অস্থিহ্রাসক ত্বক্, হস্তের নীলবর্ণ; মুখ-মণ্ডল, মুখ, ও জিহ্বাব শীতলতা; আঘাসিত শ্বাস; হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা। উত্তাপে অল্পপণম; শীতল, আঠা আঠা ঘর্ম, কপালে ঘর্মের আধিক্য; দূষিত সবিরাম জ্বর ।—(কজেটিভ্‌চিল)। ওলাউঠাব ত্রায় লক্ষণাপন্ন দূষিত বিষম জ্বর। প্রধানতঃ বাহিবে শীত ও শীতলতা, তৎসহ অন্তরে তাপ ও গাত্রে শীতল আঠা আঠা ঘর্ম, শীতের নিম্নাভিমুখে গতি, কম্পকব শীত, তৎসহ ঘর্ম, অনন্তর শীঘ্র উহাব মন্দ্রাঙ্গীন শীতলতায় পরিণতি; জগপানে শীতের বৃদ্ধি; প্রধানতঃ অন্তরে তাপ, তৎসহ পিপাসা, কিন্তু জলপানে অনিচ্ছা, উত্তাপের উর্দ্ধগতি; প্রভূত, শীতল, আঠা আঠা, দুর্গন্ধ ঘর্ম, ও তৎসহকারে মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ; জীবনীশক্তির অতিশয় অবসাদন। সন্নিপাত জ্বর ।—বমন, বিবেচন, শীতল ঘর্ম ও অজ্ঞেব শীতলতা সহকারে রোগের আরম্ভ; নাড়ীর প্রায় অপ্রাপ্যতা, উদবেব আকুঞ্চিতবৎ অতিশয় ব্যথিততা, অজ্ঞাতসাবে মূনত্বাব, শবীব-শাখার তুহারবৎ শীতলতা ও উহাতে বেণুগিরসেব গীড়কা, জ্বাগ্রত তন্দ্রা, এবং ভয়প্রাপ্তির ত্রায় বারবাহ চমকিয়া উঠা; মৃতবৎ মুখাকৃতি; অতিশয় অবসন্নতা।

ভিরেট্রম ভিরিডি ।

বিষমজ্বরের উত্তাপাবস্থায় যুবকদিগের মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়, প্রলাপ, জ্বপিত্তের প্রবলক্রিয়া, কঠিন ও দ্রুতনাড়ী ; এবং বালকদিগেব প্রবল আক্ষেপ লক্ষণে এই ঔষধ একোনাইট ও বেলেডোনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এতদ্বারা জ্বরের আবেশের তীব্রতা এবং আক্ষেপের আশঙ্কা সম্ভব প্রতিরুদ্ধ হয় । স্বপ্ন-বিরাম বা পিত্তজ্ব ম্যালেরিয়া জনিত না হইলে সময়ে দময়ে এই ঔষধে উপকাব দর্শে । মস্তিষ্কেব উত্তেজনা সংযুক্ত জবে ইহা বিশেষ উপযোগী । পাকশায়িক উপসর্গ সম্বলিত প্রাদাহিক অবস্থা অর্থাৎ বিব-মিষাদি বিশিষ্ট কক্ষজবে ভিরেট্রম ভিরিডি একোনাইট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বুখা বমন-বেগ, বমন, পথ্য উল্লীষণ, শিরোবেদনা, প্রলাপ, অচৈতন্য ও অবসন্নতা লক্ষণাগ্নয় সন্নিপাত জব প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবহ্যেয় । স্মৃতিকা জ্বের প্রাবস্তাবস্থায় ; সহসা দুষ্ক ও প্রসবাস্তিক স্রাবের বিলোপ ; তীব্র জ্বর, অস্থিরতা ; অত্যন্ত বেদনা, কুহ্নন, আধান, শীতল ও আঠা আঠা গাত্র-ত্বক্ ; দ্রুত, দুর্বলনাড়ী লক্ষণেও এই ঔষধ উপযোগী । জবে নিউ-মোনিয়াব সূচনা উপস্থিত হইলে, ধামনিক বক্তসঞ্চলনের অতিশয় উত্তেজনা থাকিলে ; এবং আয়ানিত ও কষ্টকব শ্বাস লক্ষণে একোনাইটের স্থলে ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহৃত হয় । ডাঃ হেল বলেন যে পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত, ও উল্লক্ষনশীল নাড়ী ; এবং জিহ্বাব প্রান্তভাগে পীতবর্ণ ও মধ্যস্থলে প্রশস্ত বা অপ্ৰশস্ত লোহিত রেখা জরবোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিশেষ লক্ষণ । উথানে ; বিচরণে ; মায়াছে ; ও সকলনে ইহাব লক্ষণ বিবর্জিত হয় । রক্ত-প্রধান ধাতুতেই ইহা ভাল খাটে । একদ্বাবা উপকার দর্শিলে সম্ভবই উপকার দর্শে । শ্বেদ নিঃসরণে একোনাইটেব জায় ইহারও উপকারিতা জ্ঞাত হওয়া যায় ।

ভেলেরিয়ানা ।

সবিরাম জ্বর ।—* শীতের অভাব বা অলক্ষণস্থায়ী শীত, ষাড়ে শীতের আবস্ত হইয়া পৃষ্ঠদিয়া নামা, শীতাবস্থায় মুচ্ছা ; শীতের পরে * অনেক

ক্ষণস্থায়ী উত্তাপ ; প্রবল উত্তাপ সহ প্রভূত ঘর্ম, রাত্রিতে ও পরিশ্রমে ঘর্মের আধিক্য ।

ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা ।

আমাশয় ও অন্ত্রেই ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে । এই ক্রিয়া বশতই ইহার প্রায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । অসহিষ্ণু বিবক্তিত্তি বালকদিগেব বোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা ক্যামোমিলাব অনুরূপক । সাধাবণতঃ শরীরেব একদিক আক্রান্ত হইলে এই ঔষধে বিশিষ্টরূপে উপকাব করে । ইহাব লক্ষণ, শীতলতায়, বায়ু-প্রবাহে, স্পর্শে, ও প্রতি ২১দিন অন্তব বৃদ্ধিত, এবং উষ্ণ বায়ুতে উপশমিত হয়, কিন্তু শয্যার উত্তাপে ও সূর্যোত্তাপে বৃদ্ধি পায় । সাধারণে ও শয়নান্তে শীত ও কম্প, পাতের পাতায় শীতের আরম্ভ, পিঠদিয়া শীত নামা, গৃহের বাহিবে পরিশ্রমে শীতের উপশম, শরীরে শীতল জল স্পর্শেব ত্রায় শীতানু-ভব । সাধারণে শীতান্তে তাপ, মস্তকে ঘর্মসহকারে পূর্ক্সহে তাপ, বাড়িতে অস্থিরতা, ও অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা সহ তাপ ; পূর্ক্সহে কেবল একদিকে (দক্ষিণ দিকে) তাপ, ও তৃষ্ণা । তৈলবৎ ও অল্পগন্ধি ঘর্ম, রাত্রি ১২টা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত ঘর্ম । এই সকল লক্ষণে প্রত্যহ বা ২১ দিন অন্তর উপস্থিত দরিদ্রাম জরে ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকাব ব্যবহাব হয় । সলফেট-অব-ম্যাগ্নিসিয়া ।—পূর্ক্সহে ১টা হইতে ১০টা পর্যন্ত শীত, শরীরের একাংশে উত্তাপ ও অত্যাংশে শীত ম্যাগ্নিসিয়া সলফের প্রবান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা ।

স্ত্রীলোক ও শিশুদিগেব বোগে, বিশেষতঃ গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও গুল্মমালাগ্রস্ত বালক বালিকাদিগেব পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । যকৃদ্ভোগ ও দস্তোভেদ সংস্রষ্টে অব্যেই ইহাব সমধিক অধিকার দৃষ্ট হয় । কোষ্ঠ-কাটিত্ব, কঠে খণ্ড খণ্ড শক্ত মল নিঃসরণ, অথবা মলেব অধিক শুষ্কতা বশতঃ মলদাব অতিক্রমের পর গুড়া গুড়া হইবা পতন ইহাব একটা বিশেষ লক্ষণ ।

জ্বিহ্বা থাকিলে বিবন্ধিত ও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে হ্রাসপ্রাপ্ত হৃৎকম্প, জ্বী বা পুরুষদিগের বোগে ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকাব আর একটা বিশেষ লক্ষণ । ইহাব অধিকাংশ লক্ষণ বসিয়া থাকিলে বাদ্যতঃ ; এবং নড়িলে চড়িলে, পরি-
শ্রমে, ও অনারত বায়ুতে উপশমিত হয় । অগ্নিব নিকটেও শীত, অপরাহ্ন
৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শীতের আধিক্য ; অনারত বায়ুতে, ও শয্যা
শয়নে শীতের লাঘব, সাধ্যাহ্নে উত্তাপ, পিপাসা ; কেবল মস্তকে ঘর্ম্ম ;
অনারত হইতে অনিচ্ছা, —এই সকল লক্ষণে সুবিরাম অবস্থে ম্যাগ্নিসিয়া
মিউরিয়েটিকা ব্যবহৃত হয় ।

—*—

মার্কিউরিয়স ।

রাত্রিতে ও শয্যাব উত্তাপে বোগের বৃদ্ধি পাবদেব প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ ।
জ্বর ও প্রদাহিত অবস্থায় ঘণ্টাতার একোনাইট ও বেলেডোনা জ্ঞাপক । কিন্তু
ঘর্ম্মশ্রাব হইলেও সেই ঘর্ম্মে বোগীর উপশম না জন্মিলে মার্কিউরিয়স ব্যব-
স্থেয় । অবিবাম বা স্বপ্ন-বিরাম জবে, বিশেষতঃ যন্ত্রণেব বিরুদ্ধি বা অপ্রবল
প্রদাহ থাকিলে, লক্ষণান্তসাবে মার্কিউরিয়স ব্যবহৃত হইতে পারে ।
প্রাতিজ্ঞায়িক বা আমাশয়িক (ক্যাটারাল বা গ্যাস্ট্রিক) জবে বদনের
ক্ষীততা, গলার অভ্যন্তরবেব ও বাহ্যিকের ক্ষীততা, সন্ধিস্থানের অবিরাম
বেদনা ও শয্যাব উষ্ণতায তাহাব আতিশয়া এবং ঘর্ম্ম নিঃসরণে অল্পপণম
লক্ষণে মার্কিউরিয়স ব্যবহৃত কবা যায় । অপব, এই সকল লক্ষণের সহিত
প্রায় সর্বদাই রোগীর অস্ত্রের প্রতিজ্ঞায়-প্রবণতা দৃষ্ট হব এবং তজ্জন্তু আতিশয়
কুহ্নন সহকায়ে আমরক্তময় মল নির্গত হইয়া থাকে । মলনিঃসরণেব পবেও
সেই কুহ্ননের বিবতি জন্মে না । এত্বেলেও বেলেডোনাব পরে মার্কিউরিয়স
উপযোগী হয় । সন্নিপাত জবেব প্রথমাবস্থায় ষাত্ত্রেয়া ধাতুব বোগীদিগের
বোগে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে মার্ক-সল ; এবং দ্বিতীয় অবস্থায় মার্ক-
ডলসিস ব্যবহৃত হয় । জিহ্বা শুষ্ক ও প্রগাপ প্রকাশিত হইবামাত্র তখন
মার্ক-ডল, বহিত কবা বিহিত । বাহাবা পূর্বে অতিমাত্রায় ও অনেক দিন
পর্য্যন্ত পাবদ গমন কবিয়াছে তাহাদেব পক্ষে এই ঔষদ প্রশস্ত নহে ।

সাধারণতঃ পুষ্কবের পক্ষে মার্ক-কর, দ্বীলোকের পক্ষে মার্ক-মল, ও শিশুর পক্ষে মার্ক-ভাইভস অধিক উপযোগী হয় । মার্কিউরিয়সের লক্ষণ সাধারণে ও রাত্রিতে ; শয্যার উত্তাপে ; বর্ষনিঃসরণ সময়ে ; বর্ষাকালে ; শীতল সাক্ষ্য বায়ুতে ; উষ্ণ দিবস ও শীতল রাত্রিবিশিষ্ট শবৎকালে , ব্যায়ামকালে ; ও দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে বিবদ্ধিত , এবং দিবাভাগে , ও বিশ্রাম সময়ে উপশমিত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—সাধারণে শীত, উত্তাপ ও প্রবল পিপাসা, অথবা প্রাতঃকালের প্রাক্কালে পিপাসা ; ঘর্ম্মাবস্থার হ্রস্কম্প ও বিবমিষা ; দুর্গন্ধি বা অন্ন ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মাবস্থার অস্থখের বৃদ্ধি । স্নানবিরামজ্বর । আত্রে জিহ্বা, জিহ্বায় শুভ্র বা পীতভ লেপ ; শুষ্ক, জ্বালাকর ওষ্ঠ ; মুখে বিবমিষাজনক, মন্দ, বা তিক্ত আপাদ , বমনপ্রবৃত্তিসহ বিবমিষা বা গ্লেয়া ও তিক্ত পদার্থ বমন , কুক্ষি, আমাশয়-গহ্বর, বা নাভির চারিদিকে ব্যথিততা, বিশেষতঃ তৎসহ রাত্রিকালে অতিশয় অস্থিবতা ও উৎকর্ষা ; দিবসে নিদ্রালুতা, * রাত্রিতে জাগততা , ক্ষণবাগিতা , পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, সন্ধ্যাকালে প্রবল জ্বর, দুইপ্রহর রাত্রির সময় মেই জ্বরেব অতিশয় বৃদ্ধি ; * জ্বালাকর পিপাসা, সময়ে সময়ে পানীয় দ্রব্যে অরুচি । আম ও পিত্তময় মল, বক্তাকৃতি গাঢ় লোহিতবর্ণ মূত্র । সন্নিপাত জ্বর ।—মার্ক-মল ।—পাণ্ডুর, বিবর্ণ, পীতভ বদন , পচা ও বগশূন্য আশাদ ; জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ, উদবোদ্ধ ও যকৃদ্দেশে স্পর্শে বেদনা , প্রতুত, তবল, পিচ্ছিল, কখনওবা অল্প অল্প রক্তাক্ত মল ; বাবস্থান মূত্র-প্রবৃত্তি , অস্থিবতা, উৎকর্ষা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, কিস্ত প্রলাপাতার, আঠা আঠা, দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম , গাত্র-স্বকের ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ ; বায়ুনলীর উপদাহ । মার্ক-ডা ।—দ্বিতীয় অবস্থায় অনিচ্ছিত আমাশয়িক উপদ্রব, সমগ্র উদরে স্পর্শ-বেদন ; জলবৎ, বর্ণশূন্য, অথবা উর্ণা স্তবকেণ স্রায় শুভ্র আম মিশ্রিত, কিস্তা মাংসদোত জলেব স্রায় মল, রাত্রিকালে মলস্রাবের আধিক্য ।

—*—

মার্কিউরিয়ালিস ।

দক্ষিণ বাহু ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণদিকে শীতের আবস্ত এই ঔষধেব বিশেষ লক্ষণ । বাম হস্ত ও বামবাহুতে শীতের আরম্ভ কাসোভেজিটেবিলিসের

লক্ষণ । জ্বরের লক্ষণ ।—সমস্ত শরীরে শীত, শীতাবস্থায় মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, ও নিদ্রা, অনন্তর উত্তাপ, পরিশেষে ঘর্ম্ম । আমাশয়ে, দক্ষিণ বাহুতে বা বক্ষঃস্থলের দক্ষিণদিকে শীতের আবদ্ধ, কম্প, দুর্বলতা, অঙ্গ-বেদনা, ও সর্বদা নিদ্রা বাইবার ইচ্ছা, আমাশয় ও উদরে বেদনা, স্পর্শে সেই বেদনার বৃদ্ধি; বক্ষঃস্থলে ভারবোধ ও শ্বাস-কষ্ট । জ্বালাকবউত্তাপ, করতল ও পদ-তলের উষ্ণতা, পুনঃ পুনঃ হস্তেব জ্বালা; হস্তেব শিরার ক্ষীততা । শীতশূন্য ও প্রায় ঘর্ম্মশূন্য উত্তাপ । শেষ রাত্রিতে, নিদ্রাব পরে ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক পিপাসা ।

—o—

মিউরিয়োটিক এসিড ।

টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরেই মিউরিয়োটিক এসিড সমধিক ব্যবহৃত হয় । সবিরাম জ্ববে ইহার তেমন ব্যবহাব নাই; তবে অস্থিবেষ্টে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দণে । বিগলিত ক্ষতাদি সংযুক্ত জ্বরের জ্বায় ক্ষীণ ও দুর্বলাবস্থা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—শীতের প্রা-
ধাত, শীত ও কম্প, মুখমণ্ডলের জ্বালা, গণ্ডস্থলের উষ্ণতা, পৃষ্ঠের শীতলতা,
হস্তের শীতলতা, বাহ্যিক তাপ, যুগপৎ শীতোত্তাপ । উত্তাপ ।—আভ্যন্তরিক
উত্তাপ; গাত্রাবরণ পবিত্যাগেব প্রবৃত্তি; অস্থিরতা; রাত্রিতে উত্তাপসহ
ক্লম্প, কবতল ও পদতলে জ্বালা । প্রথম নিদ্রায় রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত
ঘর্ম্ম; সায়াহ্নে শয়নকালে পদে শীতল ঘর্ম্ম; মস্তক ও পৃষ্ঠে ঘর্ম্মের আধিক্য;
ঘর্ম্মকালীন মৌনতা । সন্নিপাত জ্বর ।—প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়;—
ক্রমাগত প্রলাপ, তজ্জন্ত বিশ্রাম ও নিদ্রা পরিশূন্যতা, অতীত ও বর্তমান
বিষয় সম্বন্ধে অবিরত নিবিষ্টতা, স্মৃতবাং দেশকাল সম্বন্ধে বিস্মৃতি । ইন্দ্রিয়েব
ক্রিয়াতিশয়া, জ্যোতিতে নেত্রের আকুঞ্চন, শব্দে কর্ণের অন্তত্বাধিক্য,
আত্মাণ ও আত্মদান শক্তির অতিশয় প্রার্থ্যা, চক্ষুর প্রদীপ্ততা, কনীনিকার
সঙ্কুচিততা, গণ্ডের সীমাবদ্ধ আরক্ততা; নাসিকা, ওষ্ঠ, ও জিহ্বাব পরিণুক্ততা,
জিহ্বায় যৎসামান্য লেপ বা লেপশূন্যতা; অগ্ননালীর অতি মৃৎ উপদ্রব

কখন কখন সান্নিধ্যাতিক মল নিঃসরণ অথবা কোষ্ঠবদ্ধ ; পরিহার অসম্ভব ;
 হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দনের আধিক্য, উত্তেজনশীলতা, অথচ শক্তিশূন্যতা ;
 শ্বাসের দ্রুততা, স্বকের পরিশুদ্ধতা, ও গাত্রতাপের বৃদ্ধি ; নিদ্রার অতিশয়
 প্রয়োজন অথচ নিদ্রা যাইতে অপারগতা ; পেশীর শক্তির অনধিক লাঘব ;
 অন্ন অন্ন দুর্বলতা ও মানি (ব্রাইওনিয়াব পরে) । তৃতীয় অবস্থায় ;—
 অতিশয় অবসন্নতা ; মস্তিষ্ক ঘুটবৎ শিরঃপীড়া, নিদ্রাবস্থায় গোঁগো ও
 কৌকৌ শব্দ করা, এবং অবিরত শয্যার নিম্নাভিমুখে সরিয়া সরিয়া যাওয়া,
 জাগ্রতাবস্থায় মূহুপ্রলাপ ও অচেতন্ত্ব ; হ্রস্কতা ; মুখ ও জিহ্বাব অতিশয়
 পবিশুদ্ধতা ; জিহ্বার শুষ্কতা ও শুষ্কতা, সজ্ঞান অবস্থায়ও রোগী উহা ইচ্ছা
 কবিয়া নাড়িতে চাড়িতে পারে না ; প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে নাড়ীর সবিরাম-
 দোষ (একটু থামা) ; জলবৎ প্রভূত মূত্র নিঃসরণ ; জলবৎ অতিসাব ;
 অনিচ্ছায় মল-মূত্র নিঃসরণ, মূত্রত্যাগকালে অজ্ঞাতসারে মলস্রাব ; শিব-মেন্ত্র ,
 নিম্ন-হস্ত বুলিয়া পড়া ; দ্বিহ্বা ও মলদ্বাবেব পক্ষাঘাত ; মলদ্বাব হইতে
 রক্তপাত ।

মেনিয়াস্টিস ।

অনিয়মিত সবিরাম জবে প্রধানতঃ শীতাবস্থা প্রাপ্ত থাকিলে এবং
 শীত অসম্যাকরূপে প্রকাশিত হইলে অর্থাৎ হস্ত, বা হস্তাঙ্গুলী প্রান্তভাগে,
 অথবা পদাঙ্গুলী ও পদে শীত জন্মিলে কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগ তুষারবৎ
 শীতল হইলে, অথবা কেবল উদবে শীত ও কম্প জন্মিলে এই ঔষধ ব্যব-
 হেয় । নাসিকার ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগেব তুষারবৎ শীতলতা ; এবং চাতু-
 র্থক জরে জাহ্নুর নিম্ন হইতে জজ্বার শীতলতা ; এই ঔষধেব বিশেষ লক্ষণ ।
 ফ্যারিংটন বলেন যে সবিরাম জরে নাসাগ্র, কর্ণ-প্রান্ত, ও অঙ্গুলীর অগ্র-
 ভাগেব শীতলতা ; জাহ্নুপর্যন্ত পদের তুষারবৎ শীতলতা ; হস্তপদের তুষারবৎ
 শীতলতা ও শরীরের অন্তঃস্থানের উষ্ণতা লক্ষণাপন্ন জরে ল্যাকেসিসও ব্যব-
 হেয় হইতে পারে, কিন্তু ল্যাকেসিসেব লক্ষণে গাত্রের নীলবর্ণ ও অতিশয়
 দুর্বলতা এবং তজ্জন্ত নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা থাকে ; মেনিয়াস্টিসে থাকে না ।

মেনিয়াস্থিসের অবের সময় ও প্রকৃতির স্থিতি থাকে না। জ্বরের লক্ষণ।
—বায়সবৎ দুর্নিবাব ক্ষুধা; মাংসাহারে অতিশয় স্পৃহা, তৃষ্ণাশূন্য শীত;
অগ্নির উত্তাপে শীতের লাঘব (রুদ্ধি, ইপি); হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীর
শীতাবিক্য; জালুপর্ষাস্ত পদদ্বয়েব শীতলতা, যেন শীতল জলে ডুবান রহি-
য়াছে এরূপ অনুভব, হস্তপদেব তুষাববৎ শীতলতা, শরীরের অত্যাশ্র স্থানের
উষ্ণতা। তৃষ্ণাশূন্য সর্বাঙ্গীন উত্তাপ; মস্তকে উত্তাপেব আধিক্য; উত্তাপের
বর্দ্ধিত অবস্থায় প্রলাপ; বলকে বলকে উত্তাপেব আবেশ। সন্ধ্যা হইতে
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। ভ্রূয়াক্রান্তবৎ শিবঃপীড়া।

রসটক্সিকোডেগুন।

আর্দ্রগৃহে বা আর্দ্র শয্যায শয়ন, আর্দ্রবায়ু সেবন, শীতল জলে স্নান, হিম
ভোগ, বৃষ্টিতে ভিজা,অধিকক্ষণ জলে বা আর্দ্রবস্ত্রে থাকা, গুরুদ্রব্যাদি তোলা,
অঙ্গ মচকাইয়া যাওয়া, এবং বাত-দোষ প্রভৃতি কাৰণে বোগ জন্মিলে সাধা-
রণতঃ রসটক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসটক্সেব লক্ষণ বিশ্রাম সময়ে উপস্থিত
ও বিবর্দ্ধিত এবং সঞ্চালনে উপশমিত হয়। কিন্তু পক্ষাঘাত ও অবসন্নতা
বিশ্রামে উপশমিত ও অধিক সঞ্চালনে বিবর্দ্ধিত হয়। রসটক্সেব লক্ষণে পর্য্যায়-
শীলতা লক্ষিত হয় না। বিশ্রামে বোগেব লক্ষণেব বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে উপশম
রসটক্সেব প্রধান প্রযোগ-লক্ষণ। বিশ্রামে বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে হ্রাস ব্রাইওনিয়ার
বিশেষ লক্ষণ। তান্তব-বিধানে রসটক্সেব ও মাস্তক-বিধানে ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়া
দর্শে। ব্রাইওনিয়া রসটক্সেব অনুপূর্বক। এজন্ত টাইকস অবৈ পর্য্যায়ক্রমে এই
ছই ঔষধের বহুল ব্যবহাব দৃষ্ট হয়। রসটক্সেব বিব-ক্রিয়া বশতঃ অতিসার ও
অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন একপ্রকাব মুহুম্মায়বায়ু অব উৎপন্ন হয়, অতএব পূর্বে
সান্নিপাতিক লক্ষণবিশিষ্ট অবৈ এই ঔষব বিস্তব ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণ
উহার পবিবর্ত্ত সাধারণতঃ ব্যাপ্টিসিয়া প্রযোজিত হইয়া থাকে। কিন্তু
সান্নিপাত অবৈ ও অত্যাশ্র প্রকাব অবৈ বাত-লক্ষণ থাকিলে রসটক্স দ্বারা
অত্যন্ত উপকার দর্শে; অপিচ, জরগ্রস্ত বোগী যখন পৃষ্ঠের ও অঙ্গের
বেদনা উপশমার্থে ক্রমাগত অবস্থান পবিবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন এই

ঔষধি বিশেষ ফলোপকারক হইবে । ডাঃ ওয়াবন্স বলেন যে সরিষাপাত জ্বরে সংক্ষেপতঃ অতিশয় উপদাহিতা ও উত্তেজনার লক্ষণে রসটক্স ; এবং অম্লশ্লে-
জনা, নিশ্চেষ্টতা ও পতনাবস্থাব লক্ষণে ফসফরিক এসিড ব্যবহার্য্য । বোগ
বিবর্তিত হইবা উপদাহিতাব অবস্থা উগ্রতর হইলে রসটক্সের পরিবর্তে
আর্সেনিক ; এবং নিক্রিয়তার অবস্থাব অত্যন্ত আধিক্য জন্মিলে ফসফরিক
এসিডের পরিবর্তে কার্বোভেজিটেবিলিস প্রয়োজ্য । জিহ্বাব অগ্রভাগে
রক্তবর্ণ ত্রিকোণ চিহ্ন সরিষাপাতবস্থায় রসটক্স প্রযোগেব একটী বিশেষ লক্ষণ ।
ডাঃ ফারিংটন বলেন যে এক জজ্বায়, সাধারণতঃ উষ্ণতর শীতের আরম্ভ ;
কাহাব ও কাহাব ওবা স্ফুটনবিশেষের মধ্যভাগে শীতের আবম্ভ ; শীতাবস্থাব
বিবর্তিকর শুষ্ককাস (সিক্ক, মলক) ; বাহিবে শীত, অন্তরে তাপ ; পিসাসা-
ভাব ; সচরাচর শীতপিত্ত ও মুখেব সিকট অব-ফোট (গ্ৰাট-মিউ) ; এবং
মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরেব অন্তান্তস্থানে ঘর্ম্ম (মিলিশিয়াব বিপরীত) ; এই
মকল লক্ষণে সবিবানভাবে রসটক্স ব্যবস্থেয় । ডাঃ ডনহাম “শীতাবস্থাব
শুষ্ককাস” কেবল এই লক্ষণটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবা রসটক্স দ্বারা নিস্তর নিবম
জবেব বোগী আবেগ্য কবিয়াছেন । স্বর-বিবাম জবেও ওপিয়ম অপেক্ষা
অপ্রগাঢ় মোহ-লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয় । ওলাউঠার পরবর্তী জ্বরে হানিমাম
ব্রাইওনিয়া সহকায়ে পর্যায়ক্রমে রসটক্স ব্যবহাব করিতে বলেন । পৌনঃ-
পুনিক জ্বরে ও ডেঙ্গুজবেও এই ঔষধ উপকারী । গল-গহ্বরেব শোথ,
গল-কোষে ফোট, এবং গল-কোষ ও স্বরযন্ত্রে অসহ্য অবদরন ও বন্ধুত্বতা ;
এবং অতিশয় দুর্বলতা লক্ষণাপন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা জবেও রসটক্স উপকারী ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—জব আসিবা পূর্বে
অঙ্গমর্দ, জ্বন্তগ, চক্ষু-জ্বালা, মুখে শ্বেদা সঞ্চয়, শীতের পূর্বে ও শীতাবস্থাব বির-
ক্তিকর শুষ্ককাস (সিক্ক, মলক ; উত্তাপাবস্থায় কাস, একন) ও অঙ্গের ক্রান্তি, সাধা-
রণতঃ দিবসের শেষভাগে অর্থাৎ অপরাহ্ন ৫, ৬, ৭, ও ৮টার সময় জ্বরের প্রকাশ ।
শীত ।—অবিরত শীতানুভব, বোধ হয় যেন গাত্রে শীতল জল পতিত হই-
তেছে, অথবা শিবার অভাস্তব দিয়া শীতল রক্তপ্রবাহিত হইতেছে ; অপরাহ্ন
৭টার সময় নড়িলে চড়িলে শীতানুভব ; পৃষ্ঠোপরি শীত, জলপানান্তে উহার

আধিক্য ; উদরে বেদনা বা অতিসার । উত্তাপ ।—উত্তাপাবস্থায় শীত-
 পিত্তের প্রকাশ, আমাশয়-গহ্বরে চাপ ও ক্ষীততা, শিরার অভ্যন্তর দিয়া
 উত্পন্ন রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থায় সর্বাঙ্গীন উত্তাপ ; উত্তাপাবস্থায় পিপাসা
 ও বারে বারে অল্প অল্প জলপান, অথবা পিপাসা পরিশূন্য অতিশয় উত্তাপ ।
 ঘর্ম্ম ।—উত্তাপাবস্থায় ও ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মের অভাব, ঘর্ম্মকালীন উদ্বেদ-
 গুলির প্রবল কণ্ডুয়ন, ঘর্ম্মেব অল্প বা ভাপনা গন্ধ, ঘর্ম্মকালে পিপাসা বা
 পিপাসাশূন্যতা, ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা । শীতান্তে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, অথবা কোন
 কোন অঙ্গে শীত কোন কোন অঙ্গে তাপ (বেল) কিম্বা যুগপৎ শীতোত্তাপ ;
 প্রধানতঃ রাত্রিতে মুখেব শুষ্কতা বশতঃ পিপাসা ; অবিরত অস্থিবেতা, স্থির
 হইয়া বসিয়া থাকিতে পাবা যায় না, শয্যায় অবিবত এপাশ ওপাশ করিতে
 হয় ; কেবল অবিশ্রান্ত নড়িলে চড়িলে শান্তি জন্মে । স্বপ্নবিরাম জ্বর ।
 —মোহ, প্রলাপ, অতিশয় দুর্বলতা, দ্রুত অতিসাব, শুষ্ক জিহ্বা, পিপাসা,
 ও সন্নিপাত-লক্ষণ । সন্নিপাত জ্বর ।—অবিশ্রান্ত সঞ্চলন-প্রবৃত্তি, ও
 তাহাতে ক্ষণস্থায়ী উপশম ; ঘূর্ণবৎ অনুভব সহ অবসন্নতা ও অবিবত বসিয়া
 বা শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা ; মস্তিষ্কে বেদনা সহ মস্তিষ্কে জড়তা অনুভব ; শুষ্ক,
 জ্বালাকর উত্তাপ, অত্যন্ত মাথাধরা, এবং ঘাড়ের স্তম্ভতা ও অকুণ্ঠতা, সন্ধ্যা-
 কালে ও নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি, রোগেব প্রথম সময়ে অত্যন্ত তরুণ
 অবস্থায় ঘাড় ও বৃককে সঞ্চবমান বেদনা, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্রান্তি ও
 আলস্ত, এবং তৎকালে জিহ্বাব মলাচ্ছন্নতা ও অস্ত্র-কুজন সম্বলিত অতিসার ;
 শীত শীত অনুভব, অক্ষিপুটেব সংরোধ সহ শিবোদ্বৃণন, মুখমণ্ডলের বর্ণের
 বৈলক্ষণ্য, গল-শোথ, ভুক্তদ্রব্য বমন, জ্বরণ ; চক্ষুপরি মৃদু ও শুষ্ক চাপ,
 আলোক ও শব্দে বিবেদ ; তন্দ্রাদোষ ; স্মৃতিহীনতা ; প্রলাপ-প্রবণতা ; নিম্ন
 ওষ্ঠ ও জিহ্বার কৃষ্ণাভা । দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থাব অচৈতন্য ও অবসন্নতার
 প্রাবল্য, তৎসহ অত্যন্ত শ্রান্তি, তজ্জগ্ন একেবারেই নড়িতে চড়িতে অশক্তি ;
 ধীরে ধীরে ও আয়ালে মানসিক ক্রিয়াসম্পাদন, ধীরে ধীরে, কখনও বা
 তাড়াতাড়ি, কিন্তু পরিশুদ্ধ কপে জিজ্ঞাসিত বিষয়েব উত্তর প্রদান, আপনা-
 পনি (স্বগত) অসংলগ্ন আলাপন, বিশেষতঃ দুইপ্রহর রাত্রিব পরে, নাসিকা
 হইতে রক্তপাত ; শুষ্ক, ও কপিণ চিপটিকাচ্ছন্ন ওষ্ঠ ; জিহ্বা পরিশুদ্ধ অনুভব,

অথবা পরিশুদ্ধতা অনুভূত না হইলে চৰ্ম্মাবৃত্তবৎ অনুভব ; শুষ্ক, সৰ্ম্মত্র আৱৰ্ত্ত জিহ্বা, নিদানপক্ষে জিহ্বাব অগ্রভাগে শুষ্ক, আবৰ্ত্ত, ত্ৰিভুজাকাৰ চিহ্ন, ও তৎসহ পানেন প্রবৃত্তি ; সৰ্ম্মপ্রকাৰ আহাৰে অপ্রবৃত্তি ; তীব্র চিমটি কাটায় জ্বায় বেদনা সহকাৰে উদরের ক্ষীততা ; অতিশয় হৰ্গন্ধময় অপান, অতিসাব, রাত্রিতে অতিসারেব আধিক্য, নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতমাবে মল নিঃসৰণ, উদর-বেদনা সম্বলিত রাত্রিকালীন অতিসার, মলপ্রাবাস্তে উদর বেদনার বিরতি তৎসহ শিৰঃপীড়া ও সমস্ত অঙ্গে বেদনা ; দুঃখেদা রক্তাক্ত নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস ; বায়ুনলীভূজ-প্ৰদাহ, ফুসফুসেব নিয়ন্তব অংশে ফুসফুস প্ৰদাহ জনিত বস-প্ৰসেক ; অঙ্গে বাতেব তীব্র বেদনা, বিশ্রামকালে উহাব আধিক্য ; অস্থিৰতা ; ব্ৰহ্মব স্বপ্ন সংযুক্ত অস্থিৰ উৎকণ্ঠিত নিদ্রা, বারবাব জাগৰণ, অথবা তদ্ভাবৎ নিদ্রা, ও তৎসহ-কাৰে নাসাবব, মুছপ্রলাপ, শয্যাবস্ত থুঁটন ; ঘৰ্ম্মশূন্ত উত্তাপ বা ঘৰ্ম্ম, তৎকালে বোগীর আবৃত থাকিবাব ইচ্ছা ; মস্তিষ্কেব গুরুতব আক্রান্ততা এবং হস্ত-পদের দেশীয় অনৈচ্ছিক সঞ্চলন ; রক্তবর্ণ উদ্বেদ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ, অতি-শয় অবসন্নতা ; বিনৰ্ঘ, উৎসাহহীন, সাহনশূন্ত, নিবাস প্রকৃতি। সূতিকা জ্বর ।—দূষিত ও হৰ্গন্ধি, দীৰ্ঘকাল স্থায়ী, অথবা বাবংবাব প্রত্যায়ুত প্ৰদবা-ত্তিকপ্রাব, সৰ্ম্মাস্মীন উত্তাপ সহ স্তম্ভ-বিলোপ ; অস্থিৰতা, স্তম্ভিবভাবে শয়ন কৰিয়া থাকিতে পাবা যায় না, অবিবত অবস্থান পৰিবৰ্ত্তন কৰিতে হয়, তাহাতে ক্ষণকাল উপশম জন্মে, মণ্ড মন্দ জব, শুষ্ক জিহ্বা, নিয়্যাস্তর শক্তিশূন্ততা।

—*—

লাইকোপোডিয়ম ।

প্ৰতিদিন বা একদিন অন্তৰ একদিন অপেক্ষা তিন চাৰিটাৰ সময় শীতের সময়গম, ও মধ্যবৰ্ত্তী দাহাবস্থা ব্যতীত শীতেব পরেই ঘমেব প্রকাশ ; অথবা অল্প বয়নবিশিষ্ট পূৰ্ণোক্ত সময়ে উপাস্ত কেবল শীত, কিম্বা শীতোত্তাপ বিশিষ্ট সবিরাম জরে লাইকোপোডিয়মেব ব্যবহার আছে। টাইফয়েড জরেব প্ৰায়স্তাবস্থায় লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু চিকিৎসা সঙ্কেও রোগ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিলে এই ঔষব ব্যবস্থা কবা যাইতে পাবে। টাইফয়েড জবে চতুৰ্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে উক্ত জবেব স্বভাবসিক পীড়কা প্রকাশিত

না হইয়া রোগীর সংজ্ঞাহীনতা, মুহুপ্রলাপ, শয্যাবস্ত্র খুঁটন, উদবের ক্ষীততা, অতিশয় অঙ্গ-কুঞ্জন, কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে আকস্মিক উৎক্ষেপ, অনিচ্ছায় মূত্রনিঃসরণ বা মূত্রস্ফুট, শয্যায় মূত্র পরিত্যক্ত হইলে শয্যাবস্ত্রে ক্রীষৎ লোহিতবর্ণ রেণুর জায় অধঃক্ষেপ নিপতন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থেয়। টাইফয়েড জ্বরে ইহা অপেক্ষা মন্দাবস্থারও লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বরের উদ্ভাপ বশতঃ যখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা উপস্থিত হয় ; রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে ; চক্ষুর জ্যোতি জ্ঞান থাকে না, এবং উহাদিগকে মৎস্তের চক্ষুর জায় দেখায় ; নিম্ন হস্ত ব্রীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে ; খাসে নাসারব ও ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে ; ফুসফুসে বায়ু গমনাগমন সময়ে শ্লেষ্মাব ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যায় ; মূত্র অজ্ঞাতমাবে নিঃসৃত হয় বা বিলুপ্ত থাকে এবং নাকী বৈষম্য-দোষবিশিষ্ট ও দ্রুত হইয়া উঠে তখনও লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার অবস্থায় যদি ঔষধে কোন উপকার দর্শে তবে লাইকোপোডিয়ম দ্বারা বোগীব প্রাণরক্ষা পাইতে পাবে। এই সকল সন্নিপাতাবস্থায় জিহ্বা দৃষ্টেও লাইকোপোডিয়ম নির্দ্ধাচিত হইয়া থাকে। বোগীব জিহ্বা ক্ষীত বোধ হইলে এবং সে উহা বাহির করিতে না পারিলে, অথবা বাহির করিলেও জিহ্বা ঘটিকায়ন্ত্রেব পবিদোলকেব জায় আন্দোলিত হইলে ; অধিকন্তু প্রায় সর্বদা পরিণুক্ত ও ফোকাবিশিষ্ট থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যায়। অপর, টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে এক পায়েব শীতলতা ওঅত্র পায়েব উষ্ণতা লাইকোপোডিয়মের একটী বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। ফুসফুসেব পুরোৎপত্তি জনিত বিলেপী-জ্বরে, বিশেষতঃ বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস সমন্বিক আক্রান্ত থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহাব করা যাইতে পারে।

শরীরেব উদ্ধাংশের শীর্ণতা ও নিম্নাংশেব ক্ষীততা ; একাকী থাকিতে অতিশয় ভয় ; সর্বদা উদবে পবিতৃপ্তি অথবা নিয়োদবে পূর্ণতা অনুভব ; অপবাহু চারি ঘটিকাব সময় রোগেব বৃদ্ধি ও সায়াফে হ্রাস প্রাপ্তি , মূত্রে রক্তবর্ণ বেণু ; অস্ত্রে বায়ু উৎপত্তি,—এই গুলি লাইকোপোডিয়মেব বিশেষ লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ ।—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হস্ত-
পদের অবশতা সহকারে শীত ; অপরাহ্ন ৭টার সময় স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হইতে
জাগরণান্তে শরীরের তুষারবৎ শীতলতা ও অন্ন ঘর্ষাকৃততা ; তৎপরে প্রবল
পিপাসা । বিবমিষা ও বমন, তৎপরে শীতের পরেই অন্তর্কর্ষণী উত্তাপাবস্থা
ব্যতীত ঘর্ষ ; শীত ও তাপাবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে একপ্রকার অন্ন বমন ;
শীতের পরে মুখমণ্ডল ও হস্তের ক্ষীততা ; সমগ্র শরীরে, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকা-
লের প্রাক্কালে, ঝলক ঝলকে উত্তাপের আবেশ, ও এক একবার একটু
একটু করিয়া বারম্বার জল পান , কোষ্ঠবদ্ধ ও ঘন ঘন মূত্রতাগ । সন্ধি-
পাত জ্বর ।—হতবুদ্ধিতা, মূঢ়প্রলাপ, কণ্ডু-স্পন্দন, অন্তকুঞ্জন, ও কোষ্ঠ-
বদ্ধ লক্ষণাপন্ন টাইফসজ্বর । ক্যালকেব্রিয়ার পরে, পীড়কা ধীবে ধীবে বা স্বল্প
পরিমাণে প্রকাশ পাইলে, তজ্জাদোষ সংযুক্ত হতবুদ্ধিতা, মূঢ়প্রলাপ, অস্পষ্ট-
বাক্য, শঙ্কোচ্চাবণে ভুল, মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ, নিমগ্ন মুখাকৃতি, নিম্ন হৃষ্য-
অধঃপতন, বিকশিত মুখ ও নাসা রক্তেব পাথার ত্রায় সঞ্চালন সহকারে মন্দ-
শ্বাস ; প্রভৃতি লক্ষণ ; জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা সমগ্র
শরীরেব উৎক্ষেপ ; শয্যা-হাতড়ান ; তির্ঘ্যাকৃ দৃষ্টি ; কম্পন ; আটোপ
ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ উদবেগ ক্ষীততা ; মূত্রকুচ্ছ বা খটিকাব জলেব ত্রায় মূত্র ;
মলিন আঠা আঠা জিহ্বা ; তরল, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস, শীতল হস্তপদ,
অথবা এক পা শীতল অপর পা উত্তপ্ত, অস্থি নিদ্রা, সকল প্রকার
অবস্থানেই অশাস্তি, উৎকর্ষাপূর্ণ স্বপ্ন ও অস্বোৎক্ষেপ ; জাগ্রত হইবাব
সময় কোপনতা, বিবক্ষিত ও তিরস্কান, অথবা যেন স্বপ্ন দেখিয়া ভীতবৎ
জাগরণ ; অতিশয় শীর্ণতা ও আভ্যন্তরিক দুর্বলতা, এমন কি পক্ষাঘাত,
উদ্ধাসের শীর্ণতা, নিম্নাঙ্গের ক্ষীততা ।

লেপ্টাণ্ডা ।

জ্বরের লক্ষণ ।—স্বল্পবিরামজ্বর ।—নাড়ীবেগেব লাঘব ;
কোমল ও পূর্ণ নাড়ী ; আলকাতরার ত্রায় কাল, অথবা দুর্গন্ধি শাদা মল
লক্ষণাবিত শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর । অতিশয় আলস্ত ; কম্প প্রবণতা,

তৎসহ গাত্র-স্পর্শ-দেহ ও খঞ্জতা অমুভব ; স্থিতি, গাত্র-ত্বকের উত্তাপ ও রক্ষতা ; মলিন, দুর্গন্ধি, আলকাতবাব জ্বায় বা জলবৎ, বস্ত্রাক্ত আমিশ্রিত মল, এবং পাণ্ডু লক্ষণাপন্ন পিত্তজ্বর । সন্নিপাতজ্বর ।—পৈতিক টাইফয়েড জ্বর ; অতিশয় অবসন্নতা, স্থিতি, ত্বকের উত্তাপ ও রক্ষতা ; দেহ-শাখার শীতলতা ; মলিন, দুর্গন্ধি, আলকাতবাব জ্বায়, অথবা জলবৎ, বস্ত্রাক্ত আম-মিশ্রিত মল, আমাশয়-গহবরে দুর্বলতা ও শূন্যতা অমুভব ; উদরোর্দ্ধ ও কুক্ষিদেশে বেদনা, পাণ্ডু, শিরোঘূর্ণন ও তক্তালুতাসহ শারীরিক ও মান-সিক অবসাদ ।

লোবিলিয়া ।

সবিরামজ্বর ।—শীতের পূর্বে পিপাসা, জলপানান্তে কম্পকব শীত ও শীতলতার বৃদ্ধি ; পৃষ্ঠেব নিম্নভাগে শীত, আমাশয়ে উত্তাপ, সর্দঙ্গীন শীত ; পিপাসা ও ঘর্ম্ম সহ উত্তাপ । মধ্যাহ্ন সময়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী কম্প সংযুক্ত প্রাত্যহিক জ্বব, তৎপরে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্মের অবস্থিতি । জ্ববে স্বাৎ-কষ্ট উপসর্গ ।

ল্যাকনাহিস ।

জ্বরেরলক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—শীতাবস্থায়*চক্ষু প্রদী-প্ততা, ও শরীরের ত্বাববৎ শীতলতা এবং উষ্ণ প্রয়োগে শীতের শাস্তি । সন্নিপাত জ্বর ।—গালের সীমাবদ্ধ আরক্ততা ও * প্রদীপ্ত চক্ষু সহকারে জ্বর ; জ্বালকর উত্তাপ, দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তাপের আধিক্য ; রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা, তৎসহ ক্রমাগত বিবর্দ্ধিত গল-শোথ, ও তজ্জন্ত রাত্রিতে অনিদ্রা ; রাত্রিতে স্বপ্নপূর্ণ অস্থির নিদ্রা, তৎপরে ঘর্ম্ম ; বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে উত্তা-পামুভবসহ শিরোঘূর্ণন ; শিরোবেদনা বশতঃ নাকেকাঁদা ; অতিশয় বহুভাষিতা, তৎপরে হতবুদ্ধিতা ও কোপনতা ; শরীরেব ত্বাববৎ শীতলতা, বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে তাহার উপশম ; শীতল, আর্দ্র, ও আঠা আঠা গাত্র-ত্বক্ ; পর্যায়ক্রমে শীত ও ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ ; * সান্নিপাতিক ফুসফুস-প্রদাহ ।

ল্যাকেসিস ।

(১) গাত্র-ত্বকের সবিশেষ স্পর্শাশুভাবকতা; (২) বামদিকে রোগের অধিকতর প্রভাব; এবং (৩) নিদ্রাব পবে রোগের সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি; এই তিনটি ল্যাকেসিসের সার্বভৌমিক লক্ষণ। এই ঔষধ জ্ঞাপক প্রায় সমস্ত রোগেই এই সার্বভৌমিক লক্ষণগুলির বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। ল্যাকেসিসের ক্রিয়ায় বহুভাষিতা জন্মে। এই বহুভাষিতায় বোগী শীঘ্র শীঘ্র এক বিষয়, পরিভাগ করিয়া বিষয়াস্তবে উপনীত হয়। ঈদৃশ বাবদুক তা ল্যাকেসিসের একটা বিশেষ লক্ষণ। সন্নিপাত জ্বরে ও অন্ত্রান্ত্র রোগের সন্নিপাতাবস্থায় উল্লিখিত বাবদুকতা ল্যাকেসিস প্রয়োগের একটা বিশেষ লক্ষণ। মলের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ল্যাকেসিসেব আব একটা বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে, পেশীর শক্তিব অভাব, মাড়ীর মন্দতা ও কোমলতা, এবং বুদ্ধিশূন্য প্রলাপবাক্য প্রভৃতি ল্যাকেসিসেব লক্ষণ দ্বারা অতিশয় অবসন্নতা প্রতিপন্ন হয়। এই অবসন্নতার সহিত ধামনিক বা মায়বীয় উত্তেজনা বিদ্যমান থাকিলে আর্সেনিক, ও শক্তিহীনতার অত্যন্ত আধিক্য থাকিলে কার্বোভে-জিটেবিলিস, এবং এই ঔষধদ্বয়ের মধাবস্তী অবস্থাব অবসন্নতায়ই ল্যাকেসিস উপযোগী। এই প্রকাব অবস্থায়ই টাইফয়েড জ্বরেও ইহা উপকারী। ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে, ল্যাকেসিসেব মানসিক লক্ষণানুসাবে সন্নিপাত জ্বরে ল্যাকেসিস পবমোপকারী ঔষধ। টাইফয়েড জ্বরের প্রবদ্ধিত অবস্থায় যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে তাহার নিম্ন হস্ত ঝুলিবা পড়ে, ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনাব অন্ত্রান্ত্র লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনও ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যায়। শরৎকালেব জবে কুইন্সইন ব্যবহার সম্বন্ধেও যে জ্বর বসন্ত কালে প্রত্যাবৃত্ত হয় তাহাতেই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরূহ একটা বা দুইটার সময় শীত; * উষ্ণ থাকিবার ক্ষমতা তখন নথ, কিন্তু স্থির থাকিবার ক্ষমতা শীতাবস্থায় গাত্রে রাশীকৃত বস্ত্রপ্রদানের প্রয়োজন অল্পতব (এইটী ল্যাকেসিসেব বিশেষ লক্ষণ। চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার অভিলাষ জেগসিমিষমেও লক্ষণ); উত্তাপাবস্থায় তীব্র দাহ; বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ডে গোবব, এবং তৎসংস্রকারে তন্ত্রালুতা বা বহুভাষিতা এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। জন্ম বা অধিক লবণাক্ত দ্রব্য আহাশ বশতঃ জ্বরের প্রকাশ বা পুনরাগমন;

পারদ বা অধিক কুইনাইন সেবনেব পববর্তী পুৰাতন সবিবাম জ্বব; নিবৃত্ত-
রজ্জ্বা, ও মদ্যপাথীদিগের তৃতীয়ক জ্বরে ল্যাকেসিস উপকার কবে ।
ল্যাকেসিস ও লাইকোপোডিষম অনেক সময় পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়;
ল্যাকেসিসের পবে নাটম মিউবিষেটকম ভাল খাটে ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীতের পূর্বে পিপাসা ;
দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ ও বাহ্যিক উত্তাপ প্রাপ্তিব ইচ্ছা সহকাৰে সৰ্ব্বাঙ্গীন শীত ;
কম্পকর, অবশতাজনক শীত, পৃষ্ঠদিয়া মস্তকে শীতের উত্থান (তৃতীয়ক জ্বর) ;
* একবাব শীত, একবাব তাপ এবং শীতোক্তাপের স্থান-বিকল্পতা ; অপবাহে
শীত, তৎসহ অঙ্গে প্রবল বেদনা ও ফুসফুস-বেঠে হৃদী-বেধ, বক্ষঃস্থলে যাতনা,
এবং আক্ষেপিক অঙ্গ-সঞ্চলন । উত্তাপাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলেব
নীলবর্ণ, হ্রস্বলতা ; রাত্রিতে বিশিষ্টরূপে হস্ত-পদেব উত্তাপ ; * শীতল পদ
সহকারে অন্তবে উত্তাপ অনুভব । প্রভূত ঘৰ্ম্ম ; অতিশয় ঘৰ্ম্ম প্রবণতা ;
পীতবর্ণ ও শীতল ঘৰ্ম্ম, অথবা রক্তাক্ত ও বস্ত্রবস্ত্রবর্ণকর ঘৰ্ম্ম । * বসন্ত-
কালের সবিবাম জ্বব, অথবা শবৎকালে কুইনাইন দ্বাবা অবরুদ্ধ বসন্তকালে
প্রত্যাবৃত্ত জ্বব, অপরাহ্নের প্রথমভাগে জ্বরের বৃদ্ধি ; উত্তাপাবস্থায় বহুতাবিতা ।
সন্নিপাত জ্বর ।—মৃদুপ্রলাপ সংযুক্ত স্তম্ভি ; সম্যক ইঞ্জিয়-জ্ঞান পরিশৃঙ্খতা ;
অতিশয় বাচালতা সংযুক্ত প্রলাপ, অনবরত এককিষয় হইতে বিষয়াস্তরে
পরিভ্রমণ ; যেন মৃত্যু হইয়াছে এবং অস্ত্রোষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন চাইতেছে
বোগিলীর একপ অনুভব ; নিমগ্ন মুখমণ্ডল ; মুখ বিক্ষারিত : করিয়া অধিক
নিদ্রা ; পরিশুদ্ধ, আরক্ত, বা কৃষ্ণবর্ণ, বিদাবিতাগ্র, বাহির করিলে প্রাক্ষিপিত
বা নিম্নের দন্তে আবদ্ধ জিহ্বা ; নাসিকা হইতে মলিনবর্ণ রক্তপাত ; ক্ষীণ,
প্রভাশূন্য, বা বিকৃত চক্ষু ; আলোকে বিদেষ ; বধিরতা, কর্ণে সপ্‌সপ্‌ বা
গুড়্‌গুড়্‌ ধ্বনি ; মুখেব পবিশুদ্ধতা ও অবিবত পান-প্রবৃত্তি ; বধিবতা
সহকাৰে গলা-বেদনা ; উদবেব ক্ষীণতা, এবং অতিসাবেব পূর্বে অল্প-
কুজন । বাঁধাই হউক বা পাতলাই হউক মলে অতিশয় দুৰ্গন্ধ ; আরক্ত-কপিশ
ও প্রভূত মূত্র ; অস্পষ্ট অনুমানিক বাক্য ; শ্বাসকৃচ্ছ, কাস, ও আঠা আঠা
বক্তাক্ত নিম্নীবন ; * শয্যাগত, প্রদাহিত ক্ষত, ক্ষতে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্কুব ; বস্ত্রশ্রাব,
রক্তের দগ্ধত্বের শ্রাব আকৃতি, প্রতিনিষত অনিদ্রা, অথবা সৰ্ব্বদা নিদ্রাস্থে

ইক্ষি। সূতিক। জ্বর।—দুর্গন্ধি প্রসবাস্তিক শ্রাব, মূত্রনাশ, অচেতনতা ; উদরেব স্ফীততা, জবাযু প্রদেশে অল্পমাত্র প্রচাপন, এমন কি কাপড়ের চাপ পর্য্যন্তও সহ্য কবিত্তে পাবা যাব না ; মল বেন বক্ষঃস্থলে উঠিতেছে এপ্রকাব অনুভব, বক্তৃপাতে জবাযুব যাতনার সেই সময় একটু শান্তি কিন্তু পরক্ষণেই প্রত্যাবৃদ্ধি, নিজাব পবে বৃদ্ধি।

ফাভিসেগ্রিয়া ।

শীতাদ অর্থাৎ দশমুলাদি হইতে সহজে বক্তৃশ্রাব লক্ষণ সংযুক্ত তৃতীয়ক অব ; * শীত ও শীতলতা প্রাধান্ত ; অপবাহু তটাব সময় শীত, ষাড় হইতে মস্তকে শীতের উত্থান অথবা পৃষ্ঠ দিয়া অবতরণ, উষ্ণগৃহে শীতের আধিক্য, ও অনাবত বায়ুতে পবিশ্রমে হাস ; বাত্রিকালীন উত্তাপ, গাত্রেব আবরণ-বস্ত্র ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা ; পিপাসা, তৎপরে প্রাতঃকালের প্রাক্কালে শীত, প্রভূত ঘণ্ম, অনাবত হইবাব ইচ্ছা, কপালে ও পাবে শীতল ঘণ্ম। কম্প-জরেব পূর্বে ও পবে বায়সবৎ ক্ষুধা।

ফ্রোমোনিয়ম ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—সমস্ত শরীরের, * বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা ; শীতাবশাব মস্তকেব উত্তপ্ততা ; আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা। উত্তপ্ত, আরক্ত মুখমণ্ডল ও শীতল পদ। প্রবলজ্বর ; সমুদয় গাত্রেব, * বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকেব আলাকব উত্তাপ (বেল)। সমস্ত শরীরে শীতল ঘণ্ম। (এন্ট টাট, আর্স, কুপ, ডিজি, তিরিট)। সম্মিপাত জ্বর।—জ্ঞানশূন্যতা, নৃদ্ধিভ্রংসতা, ইন্দ্রিয় সকলের স্থপ্তি ; প্রবল শরীরবান্দোলন সহ প্রলাপ, বিভীষিকা দর্শন এবং দৃষ্টি ও শ্রতিরভ্রম, গানকরা, সীস দেওয়া, এবং অনিচ্ছাব অবিবত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহেব বিকৃত মঞ্চলন ; ঘালিশ হইতে বারংবার মস্তকের উত্তোলন বা উৎক্ষেপণ ; আক্ষেপিক

মুখ-ভঙ্গি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রুতি শক্তি, ও বাক্শক্তির বিলোপ; সকল বস্তুই তিৰ্য্যাক্ দৃষ্ট হয়, প্রসারিত ও আলোকজ্ঞান পরিশূন্য চক্ষুর তারা; শশক স্বাস সহ তন্দ্রা দোষ (কোমা); অভিব্যক্তকর তপ্ত বর্ষা, কিন্তু বর্ষা নিঃসরণে শাস্তির অভাব, বক্ষঃস্থলে লোহিত বর্ণ পীডকা, সমগ্র মুখের অভ্যন্তর ভাগ অবদীর্ণবৎ; মুখের শুষ্কতা, তজ্জন্ত সকল দ্রব্যেবই তৃণব ভায় স্বাদ; জিহ্বার পক্ষাঘাত, ও বাহির কবিরে উহাৰ কম্পিত গতি, গলাব পনি-শুষ্কতা বশতঃ গিলিতে সম্পূর্ণ অশক্তি, মল বা মূত্র বোধ, অথবা ঘণ্টায় ঘণ্টায় জৈবৎ কৃষ্ণবর্ণ, পচামাংসগন্ধা অতিসার, অপযাপ্ত অনৈজিক সূত্র-স্রাব।

সলফার ।

ডাঃ ফারিংটন বলেন যে, সলফারের সহিত প্রায় সকল ঔষধেবই কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। এজন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ কবিয়া ভালরূপে প্রতিক্রিয়া না জন্মিলে সলফার ব্যবহৃত হইবা থাকে। ঔষধেব ঐদৃশ প্রতিক্রিয়াব অসম্যকতায যে কেবল সলফারই ব্যবহৃত হয় এমন নহে সোবিগম ও কুপ্র-মাদিরও ব্যবহার আছে। তকণ বোগে সলফার ও পুরাতন বোগে সোবি-গম অধিক ব্যবহৃত হয়। আবার এলোপ্যাথি বা কবিবাজি নতে উষ্ণবীৰ্য্য ও বিনিশ্র ঔষধ-সেবিত বোগাদিগেব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে হইলেও প্রথমে তকণ বোগে দুই একমাত্রা নন্দভমিকা, ও পুরাতন বোগে দুই একমাত্রা সলফার প্রয়োগ কবিয়া কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কবাব রীতি আছে। তৎপরে এতদ্বারা বোগেব ক্রিয়ণ পবিবর্তন ঘটে তাহা দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

সলফার প্রয়োগোপযোগী বোগে প্রাচই রক্ত-সঞ্চলনেব বিশৃঙ্খলা থাকে। শৈবিক রক্ত সঞ্চলনেই প্রধানতঃ সলফারের ক্রিয়া দর্শে বলিয়া বোধ হয়, এবং ইহাব ক্রিয়াব এক প্রকাব বক্তাধিক্য জন্মে। কিন্তু এই বক্তাধিক্য বাস্ত-বিক সর্ববঙ্গীন বক্তাধিকা নহে; বক্তঃ-সঞ্চলনেব অসামঞ্জস্ত বশতঃ শরী-বেব কোন কোন স্থানে বক্তঃ-সঞ্চয় মাত্র। যক্ণৎ-শিবাব রক্ত-পূর্ণতা জন্ত সচরাচর এই সকল বক্তঃসঞ্চয় সমুৎপন্ন হয়। সলফারেব ক্রিয়াজনিত বক্তঃসঞ্চ-

মনেব বৈষম্যের একটা দৃষ্টান্ত স্থল জব। সন্নিপাত স্বব বা পূর্ব-দৃষ্ট বক্তৃ জনিত জবে এই ঔষধের বিশেষ ব্যবহার নাই। ক্লোরিটিনা, টাইফয়েডজব ও পারিমিকজবে সাধারণতঃ শোণিতের যে প্রকার বিধান বিকাব জন্মে, সলফারে রক্তের তদ্রূপ পরিবর্তন যে সাধিত হয় তাহাব কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। স্বল্প-বিবাম বা অবিবাম জবে সলফাব ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিস্তৃত প্রাদাহিক জবে একোনাইট ব্যবহার কবিয়াও বোগীর গাত্রেব উত্তাপ ও পবিস্তৃপতা থাকিযাগেলে এবং প্রতিক্রিয়া বা জ্ব-বিচ্ছেদকৰ ঘৰ্ষ না হইলে একোনাইটের পব সলফাব ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জ্বের একেবাবে বিবাম হয় না বলিয়া উহাকে অবিবাম বা স্ত জ্বর; অথবা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ও প্রাতঃকালে একটু ক্রাস পড়ে বলিয়া সন্ত-সার্ববাম বা স্বল্পবিবামজব বলে। ঈদৃশ জ্বের সন্নিপাতাবস্থা উপস্থিত হইবাব উপক্রম জন্মিলে অর্থাৎ তন্দ্রা-দোষ, জিহ্বাব পবিস্তৃপতা এবং উহাব শিথল ও প্রান্তভাগেব আব-ক্ততা, জিহ্বাসিত প্রেরে যীবে দীর্ঘ উত্তবদান, ও অতিশয দাহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবহার করা যায়। সাববাম জ্বের ও সলফাব প্রয়ো-জিত হইয়া থাকে। রোগীর নিশ্চেষ্টতা ও বাবে বোদে জিহ্বাসিত কথাব উত্তব-দান, স্নানক্রীড়াত ঔষধ প্রয়োগেও জ্বের অনিয়ন্ত্রিত, বিশেষতঃ সবিদ্রাম জ্বের স্বল্পবিবাম জবে অথবা স্বল্পবিবাম জ্বের সাববাম জব পরিণতি;— এই সকল লক্ষণে সলফাব ব্যবহৃত হয়।

ম্যালোরিয়া জনিত পুণাতন জবে ডাঃ কুপাব সলফাবেব অতিশা প্রশংসা করেন এবং এই প্রকার জবে তিনি ইহাব মূল অবিষ্ট ব্যবস্থা কবিয়া থাকেন। ফলতঃ তদ্রূপ জবে ইপিভাক যেকপে ব্যবহৃত হয়, পুণাতন জবে সলফাব সেইরূপে সমবিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোগীর লক্ষণগুলব অপরিষ্কৃততা নিবন্ধন বধন প্রকৃত ঔষধ নিকপণ করা যায় না তখণি সলফাব প্রয়োগ কারণে অপ্রকাশিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া বোগের প্রকৃত প্রকৃতি পবিস্কৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে সলফাব দ্বারা অস্ত্র ঔষধ নিস্রাচনে সাহায্য হয়। এবং কখন কখন কেবল সলফাব সেবনেও বোগ আবোগা হইয়া থাকে। (ইপি-কাক দ্রষ্টব্য)। চক্ষু বোগ সহসা কিলোপেব পববর্তী জর, কুইনাইন সেবনে অবক্ক জব, ও দোষ-বাতৃ দৃষ্ট ব্যক্তিদিগেব জপেই এই ঔষধ বিশেষ ফল-

প্রদ । সবিরাম জরে কুইনাইন অপেক্ষা সলফার অধিকতর ব্যবহৃত হইলে নিরীক্সে আৰোগ্য লাভের অধিকতর সম্ভাবনা ।

বিশেষ লক্ষণ ।—মুখমণ্ডলের বর্ণের অপ্রগাঢ়তা ও সহজে ক্রোধের উদ্দীপনা; ক্ষীণদেহ ও কুজভাবে হাঁটা; ত্বকের ধবস্পর্শতা ও চর্ম্মবোগ-প্রবণতা; গাত্রে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ, দেহ-তত্ত্ব ও কেশের স্থলত্ব; প্রাকালন ও স্নানে অস্থগেব বৃদ্ধি; মস্তক-শিথবে (মাথাব টাঁদি) সর্কদা উত্তাপ, পা শীতল, কিছু পদতলে জ্বালা; শেষ রাত্রিতে বা অতি প্রত্যবে মল-বেগ, শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব সহ হয় না । হ্রাস-বৃদ্ধি ।—সাবাহে বা দুইপ্রহর বাত্রি পবে, শয্যাব উত্তাপে; বিশ্রামকালে, দণ্ডায়মান সময়ে, স্পর্শে, প্রক্ষালনে বা স্নানে; ও অনাবৃত বাবুতে বৃদ্ধি । সঞ্চালনে; ও বিচরণে উপশম ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—পিপাসা-শূন্য আভ্যন্তরিক শীত, অথবা একই সময়ে বাহ্যিক শীত আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও আরক্ত মুখমণ্ডল, অনন্তব পিপাসা; পদাঙ্গুী হইতে শীতের সম্প্রসারণ, এবং পৃষ্ঠের উর্দ্ধদিকে প্রসাধন, প্রলাপ । উত্তাপ ।—অপবাহে বা সায়াছে উত্তাপ, ত্বক শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, অভ্যন্তবে স্নানি অহুভব; পদতলে উত্তাপ, অথবা পদের শীতলতা ও পদতলের জ্বালা, শীতল স্থানে বা শয্যার বাহিবে পা বাহিব কবিয়া রাখা । ঘর্ম্ম ।—বাত্রিতে বা বাত্রির শেষভাগে ঘর্ম্ম, কখন কখন ঘর্ম্মাবস্থায় বমন । বিরাম ।—জ্বের আবেশান্তে অতি-শয় অবসন্নতা । সন্নিপাত জ্বর ।—জ্বের শুকপ্রকৃতি, কিছু বলিলে বোগীর অতি দীবে দীবে তাহা বোধগম্য হওয়া, অনেকক্ষণ পবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান; বাত্রিতে অনিদ্রা; মস্তকেব উত্তাপ ও পূর্ণতা; প্রাচীন চক্ষু প্রদাহ; কর্ণের অতিশয় পবিশুদ্ধতা; মুখাকৃতির রুগ্নতা ও পাণ্ডুবতা; ওষ্ঠের সমুজ্জল আবদ্ধতা; জিহ্বাব অগ্রভাগেব পোহিতবর্ণ; নাসিকা ও দন্ত-মূল হইতে বক্তপাত; নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, অবিবত পবিবর্ত্তনশীল পুনীষ-জ্বাৰী, বেদনাগ্রহীন বা কুহন সংযুক্ত অতিশয়, মলত্যাগান্তে বোগীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা, অতি প্রত্যবে অতিশয়ের বৃদ্ধি, স্বল্প, দুর্গন্ধ, মলিন-

লোহিত, সঙ্কর অধঃক্ষেপপ্রাপ্তী মূত্র ; ফুসফুসের প্রতিশ্রাব্য ও প্রদাহ, (বিশেষতঃ বস-প্রসেকের প্রারম্ভ সময়ে), ঘর্ম্মশূন্য পরিপাক্ত খবম্পর্শ ত্বক্ ; ত্বকের, বিশেষতঃ পদের ত্বকেব অতিশয় উত্তপ্ততা ।

সাইকিউটা ।

সবিরাম জ্বর ।—বক্ষঃস্থলে শীতের আবস্ত এবং তথা হইতে বাহ ও জজ্বায় সম্প্রসারণ, উষ্ণতা প্রাপ্তিব ও অগ্নি সেবনেব ইচ্ছা ; কেবল আভ্যন্তরিক যৎসামান্য উত্তাপ, বাহ্মিতে ও বাহ্মিব শেষভাগে প্রধানতঃ উদরে ঘর্ম্ম ।

সাইমেক্স ।

অনিয়মিত প্রকৃতির সবিরাম জ্ববে আর্সেনিক বা ইপিকাকে উপকাব না দশিলে সাইমেক্স ব্যবহার করা যাইতে পাবে ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—মুষ্ণষ্ট শীত ও তৎপবে পিপাসা, কিন্তু তাপাভাব ; -জলপান কালে শ্বাস কষ্ট ও শ্বাস-রোধক কাসি, শীতের পূর্বে পিপাসা ও জজ্বার শুরুত্ব, মুষ্টিবদ্ধ হস্ত ও প্রবল ক্রোধানবেশ সহকারে শীতের আবস্ত, শীতাবস্থায় সমস্ত সন্ধিতে বেদনা ; কণ্ঠ-রাশুলি অতিরিক্ত হ্রস্ব অম্লভব ; সাধারণতঃ জাহ্নু-সন্ধিব আকুঞ্চন, তজ্জগ্ন জজ্বা প্রসাবণে অশক্তি , বক্ষঃস্থলে শীতের অম্লভব, তন্নিমিত্ত বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন, ছর্নিবার নিদ্রালুতা ; হস্ত-পদ অবশবৎ অম্লভব । শীতাবস্থানে জজ্বার একপ্রকাব শ্রান্তি অম্লভব, ও তজ্জগ্ন অবিরত অবস্থানের পবিবর্তন । শীতান্তে পিপাসা , কিন্তু জলপানে প্রবল শিরো-বেদনাব উৎপত্তি ; স্বঘেষ্ট্রে কণ্ঠয়ন, তন্নিবন্ধন শুষ্ক অবিরাম কাসি, উত্তাপাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত সেই কাসেব অবস্থিতি ; শ্বাস-কষ্ট ; বক্ষঃস্থলের মধ্য-ভাগে গোৰব ও উৎকর্ষা ; জলপানে পিবত থাকিলে এই সকল উপসর্গের লাঘব । উত্তাপ ।—শ্বাসবোধ সহ উত্তাপ, গুল-নলী আকৃষ্ট অম্লভব ।

ঘর্ম্ম ।—প্রধানতঃ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে ঘর্ম্ম, বর্ষ্যাবস্থায় ক্ষুধা, ও অন্ত্রাংশ লক্ষণের অনেকটা শাস্তি ।

সিড্রণ ।

ডাঃ ফ্যাবিংটন বলেন যে শারীরী ও উত্তেজনশীল ব্যক্তিদিগের বোগে, বিশেষতঃ স্রীলোকদিগের পক্ষে সিড্রণের বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয় । এই ঔষধ জ্বাপক জ্বর ও শ্বাস-শূলের লক্ষণাটিক নিব্বাণিত সময়ে প্রত্যাহৃত হয় । উষ্ণ-প্রধান দেশে, বা নিম্ন সজল স্থানে সন্মুপন্ন সর্বিবাম জ্ববে সিড্রণ ব্যবহৃত হয় । অনুপস্থলের জ্ববে আবেশিয়াব সহিত সিড্রণের কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । প্রভেদ এই যে, উষ্ণপ্রধান স্থানের জ্ববেই সিড্রণের বিশেষ উপকাৰিতা এবং শীতল ও আর্দ্র স্থলের শীত-প্রধান জ্ববে আবেশিয়াব উৎকৃষ্ট ফলবন্তা দেখা যায় । অপর, আবেশিয়াব জ্ববে শীতের প্রাবল্য ও উত্তাপের স্বল্পতা বা অভাব থাকে । পক্ষান্তরে সিড্রণের জ্বরে মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, পর্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেশ ও শীত, এবং পূর্ণ ও দ্রুত নাতী সহকাৰে পৰিভ্রম উত্তাপ থাকে । সিঙ্কোনাব সহিতও সিড্রণের কোন কোন দিববে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সিঙ্কোনাব জ্ববে জ্ববেদ অবস্থাত্রয় স্পষ্ট ও বিভিন্ন থাকে কিন্তু সিড্রণের জ্ববে এক অবস্থাব সহিত অল্প অবস্থা মিশ্রিত দৃষ্ট হয়, যথা শীতের সহিত উত্তাপ, উত্তাপের সহিত শীত, এবং বর্ষের সহিত শীতোত্তাপ মিশ্রিত দেখা যায় । ডাঃ হেল বলেন যে সর্বিবাম জ্ববে মস্তকে রক্তসঞ্চয় সিড্রণ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ । ডাঃ রডক বলেন যে সিড্রণ প্রকৃত পর্যায়-নিবাবক ও সানাত্ত বিষম জ্ববে অব্যর্থ । যদি প্রতি-দিন ঠিক একই সময়ে একই প্রকার জ্বর উপস্থিত হয় তবে ইহা ব্যবহেয় । ডাঃ লিগিয়াস্তান নিম্ন সজল স্থানের গ্রীষ্মকালের ম্যালেরিয়া জ্ববে, ঘটিকা বস্ত্রানুগত ঠিক একই সময় জ্বর উপস্থিত হইলে ও অন্ত্রাংশ লক্ষণের সহিত ঐক্য থাকিলে ইহা ব্যব্যবহেয় মনে কবেন । সিড্রণের শীত নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধিত ; এবং উষ্ণগৃহে ও উষ্ণ পানীয় পানে উপশান্ত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—জ্বরের পূর্বে অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা ও তৎপবে স্নায়বীয় অবসাদন । শীত ।—মস্তকে রক্ত সঞ্চয় সহ শীত ; পৃষ্ঠে শীতের আবৃত্ত, হস্ত, পদ, ও নাসিকাব ত্বরাবৎ শীত-লতা । তাপ ।—সর্ব শবীবে উত্তাপ ; প্রাত্যহিক বা দ্যাহিক জ্ব, জ্বরের পূর্বে চিত্তেব অবসাদ, ইচ্ছায়েব অপ্রথরতা, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে শিরঃ-গীড়া, খল্লী, অনন্তর উদ্ধ ও অবঃশাখ্য আকুঞ্চন ও ছিন্নবৎ বেদনা, এবং হস্তপদে শীতগতা অনুভব ; মুখেব শুষ্কতা, শীতলজলেব অতিশয় পিপাসা, হৃৎস্পন্দন ও ক্রতঃশ্বাস, হৃক্ল ও প্রচাপিত নাড়ী ; তৎপবে শুষ্ক উত্তাপ অনুভব, অনন্তর * প্রভূত ঘর্ষ, ক্রত ও পূর্ণ নাড়ী, এবং আবৃত্ত মুখমণ্ডল । বিরাম কালে মুখমণ্ডলের শীতলতা ও পাণ্ডুবতা ।

সিনা ।

সিনা ক্রিয়ায় মুখমণ্ডলেব পাণ্ডুবর্ণ জন্মে এবং জ্ব হইলেও এই পাণ্ডু-রতা বায না । ইপিকাক ও ব্রাইওনিয়ায়ও বদনের এই পাণ্ডুবর্ণ লক্ষণ আংশিক দৃষ্ট হয় । কিন্তু সিনাব পাণ্ডুব (ফেকাসে) বদন সহকাবে প্রায়ই চক্ষুব চারিদিকে ব্লকবর্ণ মণ্ডল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । নয়নতাবা প্রসারিত হয় । বালক নিদ্রাকালে দন্ত কড় মড় কবে । নাসিকা খুঁটে বা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করে । সে অস্থিভ ভাবে নিদ্রা যাইতে পাবে না, ও নিদ্রাব-স্থায় চিৎকার কবিবা উঠে । তাহার জিহ্বা পবিস্কাব থাকে । ইপিকাকেব লক্ষণেও কখন কখন জিহ্বাব পবিস্চ্ন্নতা দৃ হয় বটে কিন্তু ইপিকাকে বম-নেব অধিকতর প্রাবল্য থাকে । পূর্ববর্ণিত লক্ষণ কয়টি সিনার সাধাবণ লক্ষণ অর্থাৎ সিনাক্ষাপক প্রায় সকল বোগেই উহাবা বর্ত্তমান থাকে । সিনার লক্ষণের সহিত বোগীব সিনাসূচক প্রকৃতিও বিদ্যমান থাকে । যে সকল বালকেরা উত্তেজনশীল, স্নায়বীয়, খিটখিটে ও অবাধ্য এবং কাহা-কেও কাছে আসিতে দিতে চায়না, তাহাদেব পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী । সিনাক্ষাপক বোগী নড়িমা চড়িয়া বেড়াইলে ভাল থাকে । এণ্টিমোনিয়ম

ক্রুডম ও সিনাব লক্ষণে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সিনাব জাথ এন্টি-ক্রুডের জিহ্বা পবিচ্ছন্ন থাকেনা চূর্ণকামকবার জাথ শুভ্র লেপারত থাকে। সবিবাম ও স্বল্পবিবাম জ্ববে, বিশেষতঃ ক্রমি উপসর্গে সিনা বা স্যাণ্টোনিম ব্যবহৃত হয়। শীতাবস্থায় পিপাসা, এবং কখন কখন বা দাহ্য-বস্থায় পিপাসা, জ্ববে উত্তাপাবস্থায়ও মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ; অপিচ বমন, ও অতিবিক্তি ক্ষুধা এবং পরিষ্কার জিহ্বা সিনাব প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিবামজ্বর ।—শীত ।—সকল্প শীত,

উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের নিকটেও শীত, শরীরের উর্দ্ধাংশ হঠাতে মস্তকে শীতের উত্তিতি; মুখমণ্ডলে * পাণ্ডুবতা ও শীতলতা; হস্তের উষ্ণতা। উত্তাপ ।—সমগ্র মুখমণ্ডলে জ্বালাকব উত্তাপ, ও শীতল পানীয় দ্রব্যের পিপাসা। ঘর্ম্ম। কপালে, নাসিকার চতুর্দ্ভিমে, ও হস্তে, সাধারণতঃ * শীতল ঘর্ম্ম। ঘর্ম্মান্তে ভূক্ৰদ্রব্য * বমন, ও সেই সময় অতিরিক্ত ক্ষুধা। ঐকাহিক জ্ব।

সিপিয়া ।

গর্ভাবস্থা বা স্মৃতিকাবস্থায় সবিবামজ্ববে, এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ার বোগ বা যকৃতের বোগ গ্রস্তা দিগেব পুণাতন জবে সিপিয়া ব্যবহৃত হয়। ডাঃ মেয়াব বলেন যে সংক্ষেপতঃ সিপিয়ার মুখ্য-ক্রিয়া বশতঃ শৈবিক রক্তসঞ্চয় উৎপন্ন হয় এবং এই মুখ্য ক্রিয়ার উপবই ইহাব অন্ত্যান্ত স্থানিক ক্রিয়া নির্ভব কবে। পীত-ঘর্ণ চিহ্ন বিশিষ্ট, মস্তিকা বা নোমের জাথ মুখাকৃতি; শরীরের কোমলাংশেব শীততা, মানসিক অবসাদ ও ওদাসিহ্ম সিপিয়ার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। সিপিয়ার লক্ষণ অপবাহে, ও বিশ্রামে বর্দ্ধিত; এবং উত্তাপ প্রয়োগ, ও প্রবল ব্যায়ামে উপশমিত হয়।

সবিরাম জ্বর ।—শীতাবস্থায় পিপাসা, অথবা একেবারেই পিপাসা-
ভাব ; হস্তের অবশতা, অনাবৃত বায়ুতে ও সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি ; উত্তাপা-
বস্থায় তাপের উর্দ্ধে উত্থান, কিম্বা তপ্তজল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়ার স্থায় অমু-
ভব ; কপিশ ও দুর্গন্ধি মুত্র ; দুর্গন্ধি অম্ল নৈশঘর্ম ।

সিলিসিয়া ।

একাদশী হইতে অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় জরের পুনরুৎপত্তি ; পদ-তলের
ঘর্ষাবরোধ জনিত জ্বর ; বিলেপীজ্বর, ক্রিমি-জ্বর ; এবং দৌকালীন জরে
সিলিসিয়া ব্যবহৃত হয় । সিলিসিয়ার সমস্ত লক্ষণই শীতলতায় বদ্ধিত ও
উষ্ণতায় উপশমিত হয় । কেবল উষ্ণ আহার্য্য দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি ও শীতলদ্রব্যে
প্রবৃত্তি লক্ষণে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় । কেবল মস্তকে ঘর্ম সিলিসিয়ার
একটী বিশেষ লক্ষণ ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—অধিক শীত,
গাত্রবস্ত্র খুলিলে ও নড়িলে চড়িলে শীতের বৃদ্ধি, আভ্যন্তরিক শীত, গানের
শীতলতা, বিশেষতঃ নাসিকা, বাহ, এবং জাম্বু হইতে চরণ পর্য্যন্ত তুষারবৎ
শীতল ; পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর হইতে নীচে অবতরণ ; পবে প্রচণ্ড উত্তাপ ও
উদরের ক্ষীণতা ; শীতাবস্থায় অতিশয় ক্ষুধা, ও আমাশয়ে বেদনা ; শীতের
মধ্যে মধ্যে তাপাবেশ । উত্তাপ ।—তৃষ্ণা, শীতামুভব, ও শ্বাস-হ্রস্বতা সহ
সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ ; মস্তকে প্রবল উত্তাপ ; দিবসে বলকে বলকে উত্তাপাবেশ,
অনন্তর অল্পঘর্ম ; সারারাত্রি অতিশয় উত্তাপ ও শ্বাস-কষ্ট । ঘর্ম্ম ।—রাত্রিতে
সর্ব্বশরীরে প্রভূত ঘর্ম্ম ; কেবল মাত্র মস্তকে ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম ; অম্ল বা
দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম, সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিঃসরণ ; অথবা একেবারে ঘর্ম্মের
অভাব । বিলেপীজ্বর ।—মলিন মুখাকৃতি ; শুষ্ক হ্রস্বকাস ; শীর্ণতা ;
ক্ষুধাহীনতা ; সায়াহ্নে বা প্রাতে জ্বরের উত্তাপ, শ্বাস-হ্রস্বতা ; দুর্ব্বলতা, বিশে-
ষতঃ সন্ধিস্থানে ; দীর্ঘকাল স্থায়ী পুষ্প্রাব ; নৈশঘর্ম্ম । সন্নিপাত জ্বর ।—
অতিশয় দুর্ব্বলতা, প্রভূতঘর্ম্ম, ত্যাগিত প্রয়োগের প্রবল-ইচ্ছা ও তদ্বারা দুর্ব্ব-
লতার উপশম ; ধীরে ধীরে আরোগ্যোন্মুখতা, ব্রণ-শোধ ও স্ফোটকের

উৎপত্তি এবং তদ্বারা আভ্যন্তরিক বিষের বহির্গমন ও ক্রমে ক্রমে রোগের মোচন ।

শ্রাবাডিল ।

শ্রাবাডিলার ক্রিয়ায় ঐশ্বরিক ঝিল্লীই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয় । কুমির লক্ষণ ও কুমিজনিত স্নায়বীয় লক্ষণে ; ও অসম্পূর্ণ বিষমজবে অর্থাৎ অরের অবস্থাত্তয় যথানিয়মে প্রকাশিত না হইলে, এবং নক্সভমিকা ও পলসেটিলার স্নায়ু আমাশয়ের বিশৃঙ্খলার লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে শ্রাবাডিল ব্যবহৃত হয় । প্রথমে দক্ষিণপার্শ্বে, পরে বামপার্শ্বে রোগ-লক্ষণের প্রকাশও এই ঔষধের একটা লক্ষণ ।

জ্বরের লক্ষণ । —নবিরাম জ্বর ।—কেবল তীব্র শীত, অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা তৃষ্ণার অভাব, শুষ্ক আক্সেপিক কাস, শীতাবস্থায় অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা, প্রলাপ, নিদ্রা ; বদনে বলকে বলকে উত্তাপাবেশ, শরীরের অবশিষ্টাংশে শীত, হস্ত-পদ শীতল, উত্তাপাবস্থায় অঙ্গ-মর্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা) । ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে অবের উপস্থিতি (সিড, আবেণ) । বিবাম-কালেও অবি-রত শীত শীত অনুভব ।

শ্ৰামুকস ।

শ্রামুকসেব ক্রিয়ায় প্রতিশ্রায় ও দুর্বলকর প্রভূত ঘর্ম উৎপন্ন হয় । এজন্ত ঘর্ম-প্রধান সবিরাম জবে ইহা প্রয়োজিত হয় । ডাঃ সারল বলেন যে নিদ্রা-কালে আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, সর্বশরীরেব ঘর্মশূন্য উত্তাপ, হস্ত-পদের শীতলতা ; নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবামাত্র মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম, অনন্তর সর্বশরীরে ঘর্মোৎপত্তি ; জাগ্রতাবস্থায় অল্প বা অধিক ঘর্মজ্বাব ; এবং পুন-রায় নিদ্রাকালীন ঘর্মপরিশূন্য উত্তাপ এই ঔষধের বিশেষ নির্দ্যচন-লক্ষণ । চায়নার জরেও প্রচুর ঘর্মজ্বাব লক্ষণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু চায়নার ঘর্মে রোগীই অতিশয় দৌর্বল্য জন্মে, শ্রামুকসেব ঘর্মে তত দুর্বলতা উৎপন্ন হয় না ; অধিকন্তু চায়নার লক্ষণে ঘর্মাবস্থায় পিপাসা বিদ্যমান থাকে, শ্রামুকসে

থাকেন। শীতের পূর্বে বিবমিষা ও তৃষ্ণা সহকারে গভীর শুষ্ককাস শ্বাস-কসের আর একটা বিশেষ ব্যবস্থা-লক্ষণ। শীতের পূর্বে ও শীতাবস্থার বির-ক্রিকর শুষ্ককাসে সাধারণতঃ রসটক্স ব্যবহৃত হয়। সিঙ্কোনা, ও সলফারেও রসটক্স জ্ঞাপক এই কাস লক্ষণ আছে। শ্বাসকসের কাস শীতের পূর্বে উপ-স্থিত না হইলে শীত ও উত্তাপাবস্থায়ও প্রকাশ পায়। এই ঔষধের লক্ষণ বিশ্রামকালে বিবদ্ধিত; এবং সঞ্চলনে; ও শয্যায় উঠিয়া বসিলে উপশমিত হয়।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—শীতের পূর্বে বিবমিষা ও পিপাসা সহ অল্প ঘণ্টাব্যাপী শুষ্ক কাস; ঘর্ম্ম। অনন্তর সর্বশরীরে শীত এবং স্থানে স্থানে স্ফুটস্ফুটি অনুভব, পিপাসাশূন্য শুষ্ক (ঘর্ম্মহীন) উত্তাপ; উত্তাপাবস্থায় শয়নান্তে গাত্রাবরণ খুলিতে অপ্রবৃত্তি; দিবাবাত্রি * প্রভূত, দুর্বলকর ঘর্ম্ম, বিবামাবস্থায়ও ঘর্ম্ম। শর্দিজ্বর ।—শিউদিগেব প্রতিশ্রায়ে শ্বাস যেন বন্ধ হইতেছে একপভাবে শিশু যদি সহসা চমকিত হইয়া উঠে তবে শ্বাসকাস ব্যবহৃত হয়। বিলেপীজ্বর ।—কাশি, লবণাক্ত বা মিষ্ট নিম্বেবন, বক্ষঃস্থলে বেদনা; নৈশঘর্ম্ম ।

হাইওসায়েমাস ।

স্বায়মীয়া উত্তেজনা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াধিক্য হাইওসায়েমাসের প্রকৃতি-গত প্রধান লক্ষণ। এই ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি এই যে এতজ্ঞাত আক্ষেপ, উন্মাদ, প্রলাপ, কাস, ও নিদ্রাশূন্যতার সহিত প্রায়ই অব থাকে না। বেলে-ডোনায়ে অর থাকে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকাবেই হাইওসায়েমাস অধিক প্রয়োজিত হয়। হাইওসায়েমাসে বেলেডোনার শ্রায় গ্রীবার ধমনীর প্রবল দপদপ এবং বদন ও নয়নের রক্তপূর্ণতার তত ভীষণতা থাকে না। বেলেডোনা অপেক্ষা নিস্তেজ প্রকৃতির বোগেই হাইওসায়েমাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগের প্রাবল্যাবস্থায় প্রলাপের প্রমত্ততা ও প্রচণ্ডতা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রোগের প্রবর্তিত অবস্থায় যখন অচৈতন্যের সমধিক প্রাবল্য জন্মে, রোগী শয্যা-বস্ত্র বা হস্তাঙ্গুলী গুলি একপ্রকার নিজাববিশ্চের শ্রায় খুঁটিতে থাকে, এবং কখন কখন কিছু যেন

ধরিতেছে, একপভাবে শূন্য হস্ত প্রসারণ কবে তখন হাইওসায়েনামাসই উপ-
যোগী । হাইওসায়েনামাসের রোগীর আলোকে বিশেষ বিদ্যেয় ; এবং কেহ
দ্বিধা ঋণ্যাইবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে বলিয়া অতিশয় অশঙ্কা থাকে ।
শরীরের পেশী, চক্ষু, অক্ষিপুট, এবং মুখমণ্ডলের স্পন্দন ও আক্ষেপ ; আক্ষে-
পিক শুষ্ককাস, শয়ন করিলে সর্কদাই উহার বৃদ্ধি, এবং উঠিয়া বোজা হইয়া
বসিলে উপশম, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা ; শুষ্টাঙ্গের বস্ত্রোন্মোচন, প্রভৃতি
এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ । ইহার লক্ষণগুলি সন্ধ্যাকালে, স্নানাহারান্তে,
উষ্ণগৃহে, ও শূন্যকালে বিবর্তিত, এবং অদনত হইলে, ও তামাক খাইলে
উপশমিত হয় ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—পা হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত,

বক্ত-সঞ্চয় জনিত শীত (কজেষ্টিভ চিল) ; শয্যায় শবীর উত্তপ্ত হয় না ; এক
দিন পব একদিন পূর্বাঙ্ক ১১টাব সময় শীত, কাহারও কথা ভাল লাগেনা ।
অথবা সামান্য গোলমাল শুনিতে পাবা যায় না ; পণ্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ ;
জলপানে অনিচ্ছা ; সমস্ত রাত্রি জ্বালাকব উত্তাপ, তৎসহ ছিন্নকব কাস ;
মুখে শ্লেষ্মা ও ছবিত আশ্বাদের বৃদ্ধি ; প্রধানতঃ জজ্বায় ঘর্ষ ; * অপম্মা-
রের ত্রায় আক্ষেপ ; * চাতুর্থক জ্বর । সন্নিপাত জ্বর ।—ভয়বশতঃ
ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা সহকারে গুণ্যবায়ুৎ ও দুর্বলতা জনিত প্রলাপ ;
সম্পূর্ণ চৈতন্যহীনতা, ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানপাবিশূন্যতা ; বহির্জগত সম্প্রদে বোগীব
সম্যক জ্ঞানশূন্যতা, যেন অন্তর্জগতেই বাস কবিতেছে তাহার একপ কল্পনা
ও ভ্রম-দৃষ্টি-পূর্ণতা, কিছু জিজ্ঞাসা কবিলে প্রকৃত উত্তরদান, কিন্তু
পুনবায় তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য ও প্রলাপ, জাগ্রত অবস্থায়ও প্রলাপ, এবং
অবর্তমান ব্যক্তিদিগকে দর্শন ; অস্পষ্ট ও মূঢ় বাবদুকতা, শয্যাবস্ত্র খুঁটন
সহকাবে মূঢ়প্রলাপ ; দৃশ্যমান সম্পূর্ণ আশ্র-বিস্মৃতি সহকারে চতুর্পার্শ্বস্থ বস্তুর
প্রতি অবিবত একদৃষ্টিপাত, অথবা অতিশয় অস্থিরতা সহ ছুটিয়া ছুটিয়া
যাইবার বা লুক্কায়িত থাকিবাব ইচ্ছা ; আবক্ত ও প্রদীপ্ত স্থির-দৃষ্টি বিশিষ্ট,
ঘূর্ণিত চক্ষু ; ত্রিঘ্যগুদৃষ্টি ; বধিরতা, বিকৃতবদন, হতবুদ্ধিৎ মুখাকৃতি :
গোহিত বা কণিশ, পরিশুদ্ধ ও বিদাবিত, শুস্তিত জিহবা, নির্বাকতা বা

অস্পষ্ট বাক্য ; মুখ হইতে শ্বিতদেহের স্রাব দুর্গন্ধ নির্গমন ; শ্বাস্য অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মলস্রাব ; মূত্রনাশ বা মূত্র-রোধ ; অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব ; বারম্বার মূত্র-প্রবৃত্তি, কিন্তু মূত্রত্যাগে অশক্তি ; মলম্বার ও মূত্রাশয়ের মুখাবরক-শেষীর পক্ষাঘাত ; আক্ষেপিক গতি ; দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ ; উৎক্ষেপণ , কণ্ঠবা-স্পন্দন ; কস্পন ; মুহুঃপ্রলম্বসহ অনিদ্রা বা অবিরত নিদ্রা ; জাগ্রত তন্দ্রা (কোমাহিজিল) ; বুক 'ও উদরের উপর গোলাপী-রঙ্গের পীড়কা । সমগ্র শরীর যন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা । সূতিকাজ্বর । — ভাব-বৃত্তির উত্তমতা বশতঃ রোগেব বিকাশ ; * আক্ষেপিক লক্ষণ, দেহ-শাখা, বদন, চক্ষু পাভাদির উৎক্ষেপণ ; সপ্রলাপ সন্নিপাতাবস্থা ; পাক্রবস্ত্র উন্মোচন, বিবস্ত্র হইবার ইচ্ছা ।

হিপার সলফার ।

সায়ুমণ্ডলে হিপারের কতকটা ক্রিয়া দর্শে । সেই ক্রিয়া বশতঃ স্বায়ুব অতিরিক্ত অম্লভাবাদিক্য জন্মে । স্নাতবাং বোগীর বেদনামূলক হয়না এবং কখন কখন বেদনায় মুচ্ছাও জন্মে । প্রদাহিত স্থান ঘূর্ণবৎ অম্লভূত হয় এবং উহাতে এমনই স্পর্শ-দ্রব্য বিদ্যমান থাকে যে রোগী হস্ত বা পরিচ্ছদের স্পর্শ পর্যাঙ্ক সহ করিতে পারে না । এই অতিরিক্ত অম্লভবাদিক্য হিপারের সার্বভৌমিক বিশেষ লক্ষণ । হিপার জ্বাপক সকল রোগেই এই লক্ষণটী বর্তমান থাকে । ধাতু-দ্রব্যের বিষ নাশে হিপারের প্রধান অধিকার ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—সাধারণতঃ সায়াক্ষেপীত, শীতের পূর্বে মুখে তিক্ত আস্বাদ ; অনাবৃত বায়ুতে অশিশয় শীত ; * শীতের পূর্বে ও শীতাবস্থায় কণ্ঠ্যন ও হলবেধ বিশিষ্ট শীতপিত্ত, তখন অবিরত আবৃত থাকিবার ইচ্ছা ; ঘর্ম্ম এবং অল্পমাত্র অনাবৃত হইলেই পুনরায় শীত ; বদনের আরক্তিমা ও সারায়াত্রি প্রবল পিশাসা সহকারে শুষ্ক উত্তাপ ; ঘর্ম্ম সহকারে ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ ; মুখের চতুর্দিকে অর-ফোট ; * দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত শান্তিশূন্য ঘর্ম্ম ; দিবান্ত্রাঘে সামান্য

মানসিক পরিশ্রমে বা শারীরিক সকলনের পর সহজে ঘর্ম্মশ্রাব ; শীতল,
আঠা আঠা, অনেক সময় অগ্ন বা দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম ; জিহ্বা-পৃষ্ঠে শুষ্ক কৰ্ম্মমেন্স
ভায় লেপ ।

